









16058/A

~~11 n 626.~~



HISTOIRE  
NATURELLE,  
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE  
AVEC LA DESCRIPTION  
DU CABINET DU ROI.

*Tome Vingt-cinquième.*



PARIS,  
L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLXVI.



77610  
HISTOIRE  
NATURELLE,  
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,  
AVEC LA DESCRIPTION  
DU CABINET DU ROI.

---

*Tome Vingt-cinquième.*

---



A PARIS,  
E L'IMPRIMERIE ROYALE.

---

M. DCCLXVI.



HISTOIRE

NATURELLE,

GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE,

AVEC LA DESCRIPTION

DU CABINET DU ROI.



A PARIS,

IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCC. LXXI.

---

# T A B L E

De ce qui est contenu dans ce  
Volume.

<i>LE Bubale &amp; les autres animaux qui ont rapport aux Gazelles &amp; aux Chèvres.....</i>	<i>page 59</i>
<i>Le Condoma.....</i>	<i>69</i>
<i>Le Guib.....</i>	<i>75</i>
<i>La Grimme.....</i>	<i>78</i>
<i>Les Chevrotains.....</i>	<i>82</i>
<i>Les Mazames.....</i>	<i>92</i>
<i>Le Coudous.....</i>	<i>146</i>
<i>Le Musc.....</i>	<i>151</i>
<i>Le Baboroussa.....</i>	<i>176</i>
<i>Le Cabiai.....</i>	<i>183</i>
<i>Le Porc-épic.....</i>	<i>207</i>
<i>Le Coendou.....</i>	<i>229</i>
<i>L'Urson.....</i>	<i>239</i>
<i>Le Tanrec &amp; le Tondrac.....</i>	<i>253</i>

---

Par M. DE BUFFON.

---

<i>Description de la Gazelle.....</i>	<i>page 1</i>
<i>Description du Kevel.....</i>	<i>13</i>
<i>Description de la Corine.....</i>	<i>17</i>
<i>Description de la tête &amp; des cornes du Koba.....</i>	<i>25</i>
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle du Saiga, de la Gazelle, du Kevel, de la Corine, du Tzeiran, de l'Algazelle, du Pasan &amp; de l'Antilope.....</i>	<i>27</i>
<i>Description des Bézards orientaux &amp; occidentaux.....</i>	<i>39</i>
<i>Description du Guib.....</i>	<i>106</i>
<i>Description de la Grimme.....</i>	<i>109</i>
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire naturelle du Bubale, du Condoma &amp; du Guib.</i>	<i>112</i>
<i>Description du Chevrotain.....</i>	<i>125</i>
<i>Description du Cariacou.....</i>	<i>133</i>
<i>Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire naturelle des Chevrotains, du Cariacou, du Coudous &amp; du Musc.....</i>	<i>171</i>
<i>Description du Cabiai.....</i>	<i>187</i>



Description du Porc-épic.....	217
Description du Coendou.....	237
Description de l'Urfon.....	243
Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle du Babirouffa, du Cabiai, du Porc-épic, du Coendou & de l'Urfon.....	245
Description du Tendrac & du Tanrec.	256
Suite de la description du Caracal..	258
Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle du Tan- rec, du Tendrac & du Caracal...	268

---

Par M. DAUBENTON.

---

in 1811, the first year of the  
reign of the Emperor, the  
14th day of the 1st month of  
the year of the壬子 (1812), the  
Emperor issued a decree  
to the effect that the  
14th day of the 1st month  
of the year of the壬子 (1812)  
should be a day of public  
holiday.

On the 14th day of the 1st  
month of the year of the  
壬子 (1812), the Emperor  
issued a decree to the  
effect that the 14th day  
of the 1st month of the  
year of the壬子 (1812)  
should be a day of public  
holiday.

On the 14th day of the 1st  
month of the year of the  
壬子 (1812), the Emperor  
issued a decree to the  
effect that the 14th day  
of the 1st month of the  
year of the壬子 (1812)  
should be a day of public  
holiday.

HISTOIRE

# HISTOIRE NATURELLE.

---

## DESCRIPTION DE LA GAZELLE.

**L**A Gazelle (*pl. XXIII*) est un animal ruminant, de la grandeur du Chevreuil, elle lui ressemble aussi beaucoup par les proportions du corps, mais elle en diffère entièrement par les cornes (*pl. XXXI, fig. 1*): au lieu d'être solides comme le bois du Cerf, du Renne, du Chevreuil, &c; elles ont une cavité comme les cornes du Taureau, du Bélier, du Bouc, &c; elles sont noirâtres, placées à une petite distance au-dessus des yeux & courbées en arrière & en bas, à l'exception de leur extrémité, qui se recourbe obliquement en avant & en dedans; elles ont treize ou quatorze anneaux saillans, les premiers font tout le tour de la corne & ne laissent que peu de distance entr'eux, les autres sont plus éloignés & ne s'étendent pas sur le côté postérieur, ils sont obliques, se

Tome XXV.

A



trouvant posés plus bas sur le devant que sur les côtés de la corne ; quelques-uns de ces anneaux composent une spirale , elle aboutit par ces deux extrémités à des anneaux réguliers , qui par cette réunion semblent être fourchus ; le bout de la corne est lisse , il y a sur le reste de son étendue de petites stries longitudinales ; ces cornes ont à peu près la même longueur que la tête sur deux squelettes de gazelles qui sont au Cabinet du Roi dont l'un a été fait en Syrie.

La peau de la gazelle , dont ce squelette a été tiré , a aussi été envoyée au Cabinet ; le dessus du chanfrein & le front sont de couleur rousse avec une tache noire au milieu ; il y a de chaque côté du chanfrein une bande blanche avec quelques teintes de roussâtre , qui s'étendent depuis les narines jusqu'aux yeux , on voit au-dessous de cette bande une autre bande de couleur rousse , avec quelque apparence de noirâtre ; il y a une tache d'un blanc roussâtre derrière l'œil & trois bandes longitudinales formées sur la face interne des oreilles par des poils blancs ; la face externe des oreilles & le reste de la tête , à l'exception du bas de la mâchoire inférieure , le derrière & les côtés du cou , le dos , la croupe , les côtés du corps , l'épaule , la cuisse , la face externe de l'avant-bras & de la jambe proprement dite , les canons & les pieds sont de couleur fauve plus ou moins foncée & teinte de roux ou de brun en

### *de la Gazelle.* 3

plusieurs endroits ; il y a quelque mélange de cette dernière couleur sur le corps & une large bande presque entièrement brune qui s'étend sur les côtés du corps , depuis l'épaule jusque sur la cuisse ; la face externe de l'avant-bras & les canons des quatre jambes sont roux , à l'exception de la face interne des canons des jambes de devant , qui est d'un fauve très-clair ; le derrière des paturons & la couronné ont une couleur brune - foncée ; le dessous de la mâchoire inférieure , le devant du cou , la poitrine , le ventre , les fesses , la face interne de l'avant-bras & de la jambe sont blancs ; il y a au - dessus de la face antérieure des canons des jambes de devant , un peu au-dessous du genou , une brosse de poils couchés en bas , plus longs , plus serrés & plus fermes que les autres ; ces brosses sont brunes , mais en écartant les poils on voit que ceux qui sont couverts ont une couleur fauve ou blanche ; la gazelle a au-devant de chaque œil un larmier comme le cerf.

On a aussi envoyé de Syrie au Cabinet une jeune gazelle conservée dans l'esprit de vin ; ses dimensions sont rapportées dans la table suivante ; les cornes ne sont pas encore formées , mais on sent sur le front des tubercules qui indiquent leur origine ; il y a au-devant des orbites un larmier bien apparent , dont l'orifice est long de trois ou quatre lignes & placé en forme de croissant contre

A ij

le bord de l'orbite; ce larmier a deux lignes de profondeur. Le poil de la tête a des teintes de fauve, de roux & de blanchâtre; en comparant cette gazelle avec la peau que j'ai décrite, on reconnoît aisément sur la petite gazelle les vestige de la bande rouffe du milieu du chanfrein, de la bande blanche & de la bande mêlée de roux & de noirâtre des côtés du chanfrein, & on aperçoit le blanc du dessous de l'œil; les trois bandes longitudinales formées par des poils sont déjà bien marquées sur la face interne de l'oreille; les bords de cette face sont aussi couverts de poils; la face externe de l'oreille & toutes les parties qui sont de couleur fauve sur la gazelle adulte, ont à peu près la même couleur sur la petite gazelle dont il s'agit, mais elle n'a qu'une couleur blanchâtre ou fauve très-claire sur les parties qui sont blanches dans l'autre; il y a du brun-noirâtre sur les côtés du corps, sur la couronne, contre les sabots & sur la brosse qui est déjà bien formée.

Je n'ai vu sur le ventre que deux mamelons (*AB*, *pl. XXIV*, *fig. 1*) placés à quatre pouces de distance de l'anüs (*C*) & près l'un de l'autre; mais je n'ai pu reconnoître exactement la distance qui étoit entre deux, parce que le ventre avoit été ouvert dans cet endroit; il se trouve dans les aines à côté de chaque mamelon une poche (*DE*) qui, étant ouverte, a environ dix lignes de



diamètre à son entrée ; elle s'étend en arrière , elle a sept lignes de profondeur (*E F*, on voit le fond *F*, parce que cette poche a été coupée) ; les parois inférieures de chacune de ces poches sont formées par une duplication de la peau , comme la poche du sarigue femelle ; mais celles de la gazelle ne paroissent pas avoir de rapport aux nouveaux nés , comme celle du sarigue ; quoique les mamelons soient placés sur leurs bords , il s'est trouvé dans leur fond un peu de matière graisseuse & blanchâtre.

Les secondes phalanges (*GH*, *pl. XXIV*, *fig. 1*) des doigts de la gazelle ne tiennent l'une à l'autre que par leurs côtés postérieurs qui sont réunis par la peau ; la partie inférieure (*IK*) des premières phalanges n'a pas plus d'adhérence ; mais à l'endroit (*L*) de l'articulation des secondes phalanges avec les troisièmes il y a une cloison (*L*) formée par la peau qui attache les deux doigts l'un à l'autre ; cette cloison termine une cavité qui est entre les secondes phalanges des doigts & entre la partie inférieure des premières ; cette conformation des pieds de la gazelle m'a paru peu différente de celle du pied du mouton (*fig. 2*) & des autres animaux à pied fourchu ; en écartant les sabots (*AB*) d'un mouton , on voit la cloison transversale (*C*) qui est au-dessus des sabots , & la cavité (*D*) qui se trouve au-dessus de la cloison.

Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	1.	8.	»
Longueur de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	»	4.	10.
Circonférence du museau, prise derrière les naseaux.....	»	4.	5.
Contour de la bouche.....	»	3.	»
Distance entre les naseaux en bas...	»	»	2.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	»	»	9.
Distance entre les deux paupières lorsqu'elles sont ouvertes.....	»	»	6.
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres.....	»	2.	3.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	»	1.	3.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite...	»	1.	9.
La même distance en suivant la courbure du chanfrein.....	»	2.	2.
Circonférence de la tête prise au-devant des cornes.....	»	8.	7.
Longueur des oreilles.....	»	3.	»
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	»	2.	9.
Distance entre les deux oreilles, prise au bas.....	»	1.	6.
Longueur du cou.....	»	4.	2.
Circonférence près de la tête.....	»	5.	2.

	pieds.	pouc.	ligne
Circonférence près des épaules . . . . .	"	6.	6.
Hauteur . . . . .	"	2.	1.
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant . . . . .	1.	1.	6.
Longueur du tronçon de la queue . . . . .	"	2.	6.
Circonférence à son origine . . . . .	"	1.	8.
Longueur du bras depuis le coude jusqu'au genou . . . . .	"	4.	10.
Circonférence à l'endroit le plus gros . . . . .	"	3.	"
Circonférence du genou . . . . .	"	3.	"
Longueur du canon . . . . .	"	4.	10.
Circonférence à l'endroit le plus mince . . . . .	"	1.	6.
Circonférence du boulet . . . . .	"	2.	9.
Longueur du paturon . . . . .	"	1.	4.
Circonférence du paturon . . . . .	"	1.	11.
Circonférence de la couronne . . . . .	"	2.	4.
Hauteur depuis le bas du pied jusqu'au genou . . . . .	"	7.	2.
Distance depuis le coude jusqu'au bas du pied . . . . .	"	11.	8.
Longueur de la cuisse depuis la rotule jusqu'au jarret . . . . .	"	6.	8.
Longueur du canon depuis le jarret jusqu'au boulet . . . . .	"	6.	5.
Circonférence . . . . .	"	1.	8.
Longueur des ergots . . . . .	"	"	6.
Hauteur des sabots . . . . .	"	"	11.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans les pieds de devant. . . . #	1.	3.	
Longueur dans les pieds de derrière. #	1.	3.	
Largeur des deux sabots pris ensemble dans les pieds de devant. . . . . #	#	#	9.
Largeur dans les pieds de derrière. . #	#	#	8.
Circonférence des deux sabots réunis, prise sur les pieds de devant. . . . #	3.	6.	
Circonférence prise sur les pieds de derrière. . . . . #	3.	4.	

J'ai comparé le squelette (*pl. XXV*) de la gazelle à ceux du bouc, du chamois & du chevreuil; la tête (*pl. XXXI, fig. 1*) a plus de rapport avec celle du chevreuil, principalement en ce qu'il y a des enfoncemens profonds au-dessous des orbites; que l'os frontal est moins élevé & que le contour des branches de la mâchoire inférieure est plus saillant; mais l'ouverture des narines est plus grande que dans le chevreuil, & aussi grande que dans le bouc & le chamois.

La gazelle a trente-deux dents comme le chevreuil, le bouc & le chamois, &c. huit incisives à la mâchoire du dessous & six machelières de chaque côté des deux mâchoires; les deux dernières incisives sont comme dans le chevreuil, à proportion beaucoup plus petites que dans le bouc & le chamois.

L'apophyse épineuse de la seconde vertèbre ressemble plus à celle du chevreuil qu'à

celle du bouc, en ce qu'elle s'étend moins en avant & qu'elle est moins élevée; les apophyses épineuses des trois vertèbres suivantes ont aussi, comme celles du chevreuil, moins de hauteur que dans le bouc, elles sont creusées dans le milieu de leur partie supérieure, & presque séparées en deux branches, ce qui ne se trouve, ni dans le chevreuil, ni dans le bouc, &c.

La gazelle a treize vertèbres dorsales & treize côtes de chaque côté, huit vraies & cinq fausses, & six os dans le sternum, comme le bouc, le chevreuil, &c; de deux squelettes de gazelles que j'ai observés, l'un a six vertèbres lombaires & l'autre seulement cinq; il ne m'a pas paru qu'aucune vertèbre lombaire ait été supprimée dans celui-ci, elles ont toutes leurs ligamens naturels, excepté la dernière qui est détachée du sacrum, mais elle s'y adapte si juste qu'elle doit être en effet la dernière vertèbre lombaire, quoiqu'elle ne soit que la cinquième; car si elle n'avoit été que l'avant-dernière dans l'animal vivant, ses facettes articulaires seroient fort éloignées de celle du sacrum dans le squelette; s'il a toutes ses vertèbres lombaires, comme je le présume, leur nombre varie de cinq à six dans la gazelle comme dans le cheval\*.

Il y a quatre fausses vertèbres dans l'os sacrum, & dix dans la queue.

\* Voyez le volume VII de cet ouvrage, 2.<sup>e</sup> partie, page 492.



L'humérus, a comme celui du chevreuil, sur le devant de sa partie moyenne supérieure, une apophyse qui n'est pas sur l'humérus du bouc.

Au reste, les os de la gazelle diffèrent peu de ceux du chevreuil, du bouc, &c. excepté par des proportions de leurs formes; les dimensions rapportées dans la table suivante, donneront une idée de ces différences, si on les compare avec les dimensions des os de ces autres animaux.

	pieds. pouc. lign.		
Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'entre-deux des cornes.....	"	4.	9.
Largeur du museau.....	"	"	7.
Largeur de la tête, prise à l'endroit des orbites.....	"	3.	3.
Longueur de la mâchoire inférieure depuis l'extrémité des dents incisives jusqu'au contour de ses branches..	"	7.	"
Distance entre les orbites & l'ouver- ture des narines.....	"	11.	8.
Longueur de cette ouverture.....	"	2.	2.
Largeur.....	"	"	10 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des os propres du nez....	"	1.	11.
Largeur.....	"	"	6 $\frac{1}{2}$ .
Largeur des orbites.....	"	1.	4.
Hauteur.....	"	1.	3.
Longueur des cornes.....	"	7.	1.
Circonférence à la base.....	"	4.	2.

# de la Gazelle.

11

pieds. pouc. lign.

Largeur du trou de la première vertèbre de haut en bas.....	"	"	5.
Longueur d'un côté à l'autre.....	"	"	8.
Longueur du corps de la seconde vertèbre.....	"	1.	11.
Hauteur de l'apophyse épineuse....	"	"	7.
Largeur.....	"	2.	3.
Longueur de la neuvième côte, qui est la plus longue.....	"	7.	6.
Largeur de la côte la plus large....	"	"	6.
Longueur du sternum.....	"	8.	"
Longueur de l'apophyse transverse de la cinquième vertèbre lombaire qui est la plus longue.....	"	1.	4.
Longueur du corps de l'avant-dernière vertèbre lombaire.....	"	"	11.
Longueur de l'os sacrum.....	"	2.	4.
Largeur de la partie antérieure....	"	2.	4.
Largeur de la partie postérieure....	"	"	9.
Longueur de la première fausse vertèbre de la queue qui est la plus longue.....	"	"	7½.
Hauteur de l'os de la hanche depuis le milieu de la cavité cotyloïde, jusqu'au dessus de l'os.....	"	3.	6.
Largeur du bassin.....	"	2.	2.
Hauteur.....	"	2.	6.
Longueur de l'omoplate.....	"	5.	"
Longueur de sa base.....	"	2.	6.

A vj

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur de l'humérus.....	//	4.	11.
Circonférence à l'endroit le plus petit. //	1.	8.	
Longueur de l'os du coude.....	//	6.	9.
Hauteur de l'olécrane.....	//	1.	1.
Longueur de l'os du rayon.....	//	5.	6.
Largeur du milieu de l'os.....	//	//	6 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du fémur.....	//	6.	2.
Circonférence du milieu de l'os....	//	1.	9.
Longueur des rotules.....	//	//	11.
Largeur.....	//	//	8.
Épaisseur.....	//	//	5.
Longueur du tibia.....	//	7.	7.
Circonférence du milieu de l'os....	//	1.	8.
Hauteur du carpe.....	//	//	7.
Longueur du calcaneum.....	//	2.	1.
Longueur des canons des jambes de devant.....	//	5.	10.
Largeur du milieu de l'os.....	//	//	5.
Longueur des canons des jambes de derrière.....	//	5.	11.
Largeur du milieu de l'os.....	//	//	5.
Longueur des os des premières pha- langes des doigts des pieds de devant. //	2.	6.	
Longueur des os des secondes pha- langes.....	//	//	9.
Longueur des os des troisièmes pha- langes.....	//	1.	1.

*Seve del.**P.F. Tardieu Sculp.*

LA. GAZELLE.










Fig. 1.



Fig. 2.







# DESCRIPTION

## DU KEVEL.

**L**E Kevel (*pl. XXVI*) est un peu plus petit que la Gazelle, il a les orbites des yeux plus grandes, & les cornes (*pl. XXXI, fig. 2*) plus longues & plus aplaties sur les côtés; de cinq têtes de kevels que j'ai observées, deux n'avoient que quatorze anneaux sur chaque corne, les trois autres en avoient dix-sept, dix-huit, ou vingt; au reste, ces cornes ressembloient toutes à celles de la gazelle; je n'ai pu décrire les couleurs du poil que sur une peau bourrée depuis longtemps; le milieu du chanfrein & le front au-devant des cornes étoient de couleur rousse, il y avoit de chaque côté du chanfrein une bande blanche qui s'étendoit jusqu'au-dessus de l'œil, au-dessous de cette bande blanche, il s'en trouvoit une autre mêlée de roux & de noirâtre qui alloit depuis le coin de la bouche jusqu'à l'angle antérieur de l'œil, dont le dessous étoit bordé de blanc; la partie postérieure de la paupière du dessus avoit une couleur mêlée de roux & de noirâtre comme la bande inférieure des côtés du chanfrein; la face externe des oreilles étoit de couleur fauve-claire sur la plus grande partie de son étendue, & de couleur blanche



sur le côté externe de la base; il y avoit au dedans de l'oreille trois bandes étroites & longitudinales, formées par de petits poils blancs comme sur la gazelle; le reste de la tête, excepté le bas de la mâchoire inférieure, le cou, le dos, le dessus & les côtés de la croupe, les côtés du corps, l'épaule, la cuisse, la face externe de l'avant-bras, de la jambe & des canons de derrière, la face antérieure des canons de devant & des quatre pieds avoient une couleur fauve, qui étoit rouffâtre & en forme de bande le long des côtés du corps, & fort claire sur le devant du cou & sur les canons & les pieds de derrière; la queue étoit noire, le dessous de la mâchoire inférieure, la poitrine, le ventre, les fesses, la face interne de l'avant-bras & de la jambe, le derrière des canons & des pieds étoient blancs; il y avoit sur le dessus de la face antérieure des canons des jambes de devant, un peu au-dessous du genou, une brosse de poils semblables à celles de la gazelle; le kevel a les orbites des yeux (*AA, pl. XXXI, fig. 2*) à proportion plus grandes que la gazelle, les dents sont semblables pour le nombre, la forme & la situation dans ces deux animaux.

pieds. pouc. lign.

Longueur du corps entier, mesuré  
en ligne droite depuis le bout du  
museau jusqu'à l'anus . . . . .

2. 5. "

Longueur de la tête depuis le bout du  
museau jusqu'à l'origine des cornes. "

4. 6.

	pieds.	pouc.	lign.
Contour de la bouche.....	3.	0	
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. //	10.		
Distance entre les deux paupières lorsqu'elles sont ouvertes..... //	7½.		
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres..... //	3.	7.	
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille..... //	1.	10.	
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite.. //	2.	3.	
La même distance en suivant la cour- bure du chanfrein..... //	2.	9.	
Circonférence de la tête, prise au- devant des cornes..... //	11.	2.	
Longueur des oreilles..... //	4.	5.	
Longueur de la base, mesurée sur la courbure extérieure..... //	3.	3.	
Distance entre les oreilles & les cornes. //	2.		
Distance entre les deux oreilles, prise au bas..... //	1.	8.	
Longueur du tronçon de la queue.. //	5.		
Circonférence du genou..... //	3.		
Longueur du canon..... //	6.	2.	
Circonférence à l'endroit le plus mince. //	1.	10.	
Circonférence du boulet..... //	2.	7.	
Longueur du paturon..... //	1.	6.	
Circonférence du paturon..... //	1.	11.	
Hauteur depuis le bas du pied jusqu'au genou..... //	8.	5.	

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur du canon depuis le jarret jusqu'au boulet.....	8.	2.	
Circonférence.....	2.		
Hauteur des sabots des jambes de devant.....	1.	3.	
Hauteur des sabots des jambes de derrière.....	1.	11.	
Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans les pieds de devant..	1.	10.	
Longueur dans les pieds de derrière.	1.	5.	





ve del.

M<sup>re</sup> Rouardet, P<sup>re</sup> Tardieu sculp.

LE KÉVEL.





# DESCRIPTION

## DE LA CORINE.

**L**A Corine (*pl. XXVII*) diffère de la Gazelle & du Kevel par la forme des cornes & par le poil qui a un peu plus de longueur, mais elle leur ressemble exactement par les couleurs; cette ressemblance est si grande dans ces trois animaux, que l'on seroit tenté de croire qu'ils seroient de même espèce: quoique je n'aie vu que des peaux bourrées du kevel & de la corine, il me semble que s'il y a des différences dans les proportions du corps, elles ne sont que très-légères; ces trois animaux ont les jambes fort menues, les oreilles longues, la queue courte, des bandes blanches sur la face externe des oreilles, des brosseaux aux jambes de devant, trois bandes rousses ou noirâtres & deux blanches sur le chanfrein, &c; mais il se trouve des différences très-apparentes dans les cornes, principalement dans celles de la corine; elles sont à proportion plus menues que les cornes de la gazelle & du kevel, & leurs anneaux sont beaucoup plus petits.

Les cornes (*pl. XXXI, fig. 3*) de la corine ont une courbure en arrière & en bas; il y en a qui sont aussi un peu recourbées en dedans par l'extrémité (*AA, fig. 4*), mais

il paroît que ce n'est que par accident ; comme elles sont menues , il arrive qu'elles s'inclinent en différens sens , ou qu'elles se cassent par le bout , dans ce dernier cas l'une est plus courte que l'autre & terminée par une sorte de calus ; j'ai vu deux têtes de corines , dont les cornes (*fig. 3*) n'avoient que des anneaux peu apparens & fort inégaux , ils étoient petits & serrés dans la partie inférieure de la corne , plus larges & plus éloignés dans la partie supérieure ; les anneaux des cornes d'une troisième tête (*fig. 4*) étoient plus gros & placés pour la plupart à de grandes distances. M. Adanson m'a fait voir une corne (*fig. 5*) qu'il a rapportée du Sénégal , qui est presque droite & plus petite que les autres , & qui n'a dans sa partie inférieure que cinq anneaux , & quelques inégalités dans le reste de sa longueur : mais ces petites différences ne m'empêchent pas de croire que toutes ces cornes ne viennent de corine de différens âges ou de sexe différens.

pieds. pouc. lign.

Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite , depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	2.	2.	6.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'origine des cornes. #	4.	3.	
Contour de la bouche.....	#	2.	10.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. #	#	9	$\frac{1}{2}$

Distance entre les deux paupières lorsqu'elles sont ouvertes.....	II	II	7.
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres.....	II	3.	2.
Distance entre l'angle postérieur & l'orcille.....	II	1.	9.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite.	II	2.	II
La même distance en suivant la courbure du chanfrein.....	II	2.	3.
Circonférence de la tête, prise au-devant des cornes.....	II	10.	3.
Longueur des oreilles.....	II	4.	3.
Longueur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	II	2.	10.
Distance entre les oreilles & les cornes.	II	1.	4.
Distance entre les deux oreilles, prise au bas.....	II	1.	7.
Longueur du tronçon de la queue..	II	4.	II
Circonférence du genou.....	II	2.	9.
Longueur du canon.....	II	5.	3.
Circonférence à l'endroit le plus mince.	II	1.	6.
Circonférence du boulet.....	II	2.	5.
Longueur du paturon.....	II	1.	8.
Circonférence du paturon.....	II	1.	8.
Hauteur depuis le bas du pied jusqu'au genou.....	II	8.	II
Longueur du canon depuis le jarret jusqu'au boulet.....	II	7.	3.

	pieds.	pouc.	lignes
Circonférence.....	"	1.	6.
Hauteur des sabots des jambes de devant.....	"	1.	4.
Hauteur des sabots des jambes de derrière.....	"	1.	1.
Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans les pieds de devant...	"	1.	8.
Longueur dans les pieds de derrière..	"	1.	4.

La corine représentée (*pl. XXVII*) a été vivante pendant quelque temps au parc de Saint-Cloud; S. A. S. M. le Duc d'Orléans, eut la bonté de nous permettre de la faire dessiner; y étant morte, elle fut disséquée par M. Guettard, Médecin botaniste de S. A. S. M. le Duc d'Orléans, & Membre de l'Académie royale des Sciences, qui a bien voulu me communiquer des desseins qu'il fit faire de plusieurs parties de cette corine, & me donner la liberté d'en prendre copie; j'en ai fait copier deux, qui représentent les estomacs de la corine, vus en dehors (*pl. XXVIII*) & en dedans (*pl. XXIX*), on y distingue les quatre estomacs de cet animal; la panse (*A B C D*, *pl. XXVIII*), le bonnet (*E*), le feuillet (*F*) & la caillette (*G*); la panse n'a que deux convexités (*C D*); à cet égard elle ressemble plus à la panse du bœuf, du bétier & du bouc, qu'à celle du cerf, du daim & du chevreuil qui a trois convexités; le feuillet

(F) est fort petit en comparaison des autres estomacs ; les caractères de chacun sont exprimés dans la *pl. XXIX*, on y reconnoît les papilles (ABC) de la panse ; le réseau (D) du bonnet , les feuillets (E) du troisième estomac & les replis (FG) de la caillette, & il paroît que ces replis & les feuillets sont plus petits à proportion que dans la plupart des autres animaux ruminans.

Le squelette de corine (*pl. XXX*) qui est au Cabinet n'a que douze côtes , huit vraies & quatre fausses , & cinq vertèbres lombaires ; mais entre la douzième vertèbre du dos & la première des lombes il y a encore deux vertèbres dorsales , dans lesquelles on voit très-distinctement les facettes de leurs articulations avec les côtes qui manquent dans ce squelette ; les vertèbres ne sont séparées que dans les joints des épiphyses , & il ne m'a pas paru que l'on eût ajouté dans la colonne vertébrale aucune vertèbre étrangère à ce squelette ; il y a quatre fausses vertèbres dans le sacrum & huit dans la queue , mais les dernières ont été supprimées ; les os des canons sont à proportion plus longs que ceux de la gazelle.

pieds. pouc. lign.

Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'entre-deux des cornes.....	"	4.	3.
Largeur de la tête, prise à l'endroit des orbites, .....	"	2.	8.

Longueur de la mâchoire inférieure depuis l'extrémité des dents incisives jusqu'au contour de ses branches.....	"	4.	6.
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	"	1.	4.
Longueur des os propres du nez....	"	1.	5.
Largeur.....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Largeur des orbites.....	"	1.	2 $\frac{1}{2}$ .
Hauteur.....	"	1.	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des cornes.....	"	5.	9.
Circonférence à la base.....	"	2.	1.
Largeur du trou de la première vertèbre de haut en bas.....	"	"	5.
Longueur d'un côté à l'autre.....	"	"	8.
Longueur du corps de la seconde vertèbre.....	"	1.	5.
Hauteur de l'apophyse épineuse....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	"	1.	6.
Longueur de la neuvième côte qui est la plus longue.....	"	7.	"
Largeur de la côte la plus large....	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du sternum.....	"	6.	6.
Longueur de l'apophyse transverse de la cinquième vertèbre, qui est la plus longue.....	"	1.	3.
Longueur du corps de l'avant-dernière vertèbre lombaire.....	"	1.	10 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os sacrum.....	"	2.	"

Largeur de la partie antérieure....	"	1. 11.
Largeur de la partie postérieure....	"	" 10.
Longueur de la première fausse ver- tèbre de la queue, qui est la plus longue.....	"	" 7.
Hauteur de l'os de la hanche depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'au dessus de l'os.....	"	2. 10.
Largeur du bassin.....	"	1. 8.
Hauteur.....	"	2. 8.
Longueur de l'omoplate.....	"	3. 11.
Longueur de sa base.....	"	2. 2.
Longueur de l'humérus.....	"	4. "
Circonférence à l'endroit le plus petit.	"	1. 6.
Longueur de l'os du coude.....	"	6. "
Hauteur de l'olécrane.....	"	1. 1.
Longueur de l'os du rayon.....	"	4. 11.
Largeur du milieu de l'os.....	"	" 5.
Longueur du fémur.....	"	5. 2.
Circonférence du milieu de l'os....	"	1. 6.
Longueur des rotules.....	"	" 9.
Largeur.....	"	" 7.
Épaisseur.....	"	" 6.
Longueur du tibia.....	"	6. 8.
Circonférence du milieu de l'os. ..	"	1. 5.
Hauteur du carpe.....	"	" 5 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du calcaneum.....	"	1. 9.



Longueur des canons des jambes de devant. . . . .	■	5.	4.
Largeur du milieu de l'os. . . . .	■	■	4.
Longueur des canons des jambes de derrière. . . . .	■	5.	10.
Largeur du milieu de l'os. . . . .	■	■	4.
Longueur des os des premières pha- langes. . . . .	■	1.	2.
Longueur des os des secondes pha- langes. . . . .	■	■	8.
Longueur des os des troisièmes pha- langes. . . . .	■	■	9.




**DESCRIPTION**





De Seve del.

C<sup>ne</sup> Haybard Sculp.


LA CORINE.

















# DESCRIPTION

## DE LA TÊTE DU KOB

### ET DES CORNES DU KOB.

LA tête du Kob (*pl. XXXII, fig. 1*) nous a été communiquée par M. Adanson, qui l'a apportée du Sénégal, sous le nom de *petite Vache brune*; elle est décharnée: elle a beaucoup de rapport à celles de la Gazelle, du Kevel & de la Corine par la forme de l'os frontal; mais elle diffère des têtes de ces animaux, en ce que le museau est plus long, & qu'il n'y a point d'enfoncement au-devant des orbites des yeux à l'endroit des larmiers, ce qui doit faire présumer que le kob n'a point de larmiers; il y a sur ses cornes, comme sur celles de la gazelle & du kevel, des stries longitudinales & des anneaux transversaux, mais les anneaux sont plus obliques, se trouvant placés beaucoup plus bas sur le devant de la corne que sur les côtés; on ne voit sur le derrière que des vestiges de quelques-uns de ces anneaux: les cornes au sortir du front s'étendent obliquement en arrière & en dehors, ensuite elles se courbent en dedans & se recourbent en haut par leur partie supérieure; celles de la tête apportée du Sénégal sont presque rondes, elles ont près de treize pouces de longueur en suivant

leur courbure & cinq pouces & demi de circonférence à la base ; elles sont éloignées l'une de l'autre de huit lignes par leurs bases, de près de cinq pouces dans le milieu & de deux pouces quatre lignes à l'extrémité ; le bout de la mâchoire supérieure & la partie gauche de l'inférieure manquent dans la tête dont il s'agit , mais il en reste assez pour faire voir qu'elle avoit sept pouces & demi de longueur, depuis la partie antérieure de la mâchoire du dessous jusqu'à l'origine des cornes , & neuf pouces huit lignes jusqu'à l'occiput ; la plus grande largeur de la tête est de trois pouces huit lignes à l'endroit des orbites , qui ont un pouce sept lignes de diamètre.

On voit à la Bibliothèque de Saint-Victor, des cornes (*pl. XXXII, fig. 2*) de koba, qui sont plus longues & plus recourbées en haut que celles de la tête que M. Adanson a apportée du Sénégal ; elles sont aplaties sur le côté externe de leur partie inférieure, elles ont un pied & demi de longueur en suivant leur courbure , & cinq pouces neuf lignes de circonférence à la base ; au reste, elles ressemblent à celles du kob.



# DESCRIPTION

## DE LA PARTIE DU CABINET

*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*

DU SAIGA, DE LA GAZELLE,  
 du KEVEL, de la CORINE, du TZEIRAN,  
 de l'ALGAZELLE, du PASAN  
 & de l'ANTILOPE.

N.<sup>o</sup> MCXL.

*Les cornes du Saiga.*

LES cornes (dont l'une est représentée  
 planche XXII, figure 2) ont des an-  
 neaux, comme celles de la Gazelle & leur  
 ressemblent beaucoup pour la figure; mais  
 elles sont à demi transparentes, & elles ont  
 une couleur jaunâtre; elles sont aussi un peu  
 plus longues & plus rondes, elles ont dix à  
 onze pouces de longueur & quatre pouces  
 de circonférence à la base; l'os qui entre dans  
 leur cavité, a sur ses parois des stries longi-  
 tudinales, qui s'engrangent dans des canne-  
 lures correspondantes, sur les parois de la  
 cavité des cornes. M. Tesdorf les a envoyées  
 sous le nom de cornes d'un Bouc de Hongrie.

B ij

## N.º MCXLI.

*Une jeune gazelle.*

Cette gazelle a été envoyée de Tripoli de Syrie au Cabinet, par M. Gautier, Chirurgien du Roi; sa description fait partie de celle de la gazelle, elle est conservée dans l'esprit de vin.

## N.º MCXLII.

*Le squelette d'une gazelle.*

C'est le squelette qui a servi de sujet pour la description & les dimensions des os de la gazelle, il n'y a que cinq vertèbres lombaires.

## N.º MCXLIII.

*Autre squelette de gazelle.*

Ce squelette a été envoyé de Tripoli de Syrie, par M. Gautier, comme la gazelle rapportée sous le n.º MCXLI, il est de même grandeur que le précédent, mais ses cornes sont un peu plus longues, & il a six vertèbres lombaires.

## N.º MCXLIV.

*Un kevel.*

Ce kevel est empaillé, il a servi de sujet pour la description & les dimensions de cet animal.

N.° M C X L V.

*Une tête de kevel.*

Cette tête (*pl. XXXI, fig. 2*) a été décrite avec le kevel, elle est décharnée, la mâchoire du dessous y manque, & celle du dessus est cassée à l'extrémité.

N.° M C X L V I.

*Une Corine.*

Cet animal est empaillé, il a servi de sujet pour la description & les dimensions de la corine.

N.° M C X L V I I.

*Le squelette d'une corine.*

Ce squelette a été décrit, & les dimensions de ses os sont rapportées dans la description de la corine.

N.° M C X L V I I I.

*Les cornes d'une corine.*

Ces cornes tiennent à l'os frontal, elles ne diffèrent de celles de la corine rapportée sous le n.° M C X L V I qu'en ce que les anneaux sont plus apparens.

N.° M C X L I X.

*Une corne de tzeiran.*

La courbure de cette corne (*pl. XXXI, B iij*)



fig. 6) est plus forte que celle des cornes de la gazelle & du kevel, elle est uniforme & fait l'arc d'un cercle de dix-neuf pouces de diamètre; cette corne a été tronquée à son extrémité, ce qui reste a un pied & demi de longueur, huit pouces de circonférence à la base & trois pouces à l'endroit de la coupe (A) qui a été faite à quelque distance de la pointe; on a percé au milieu du plan de cette coupe un tronc en forme d'embouchure qui communique dans la cavité de la corne, & qui en fait un cornet à bouquin; il y a environ vingt-six anneaux sur cette corne & des stries longitudinales; les anneaux diffèrent de ceux des cornes de la gazelle & du kevel, en ce qu'ils ne sont pas obliques, ni placés plus bas sur le devant de la corne que sur les côtés & sur le derrière\*.

N.<sup>o</sup> M C L.

*Une corne d'Algazelle.*

Cette corne (*pl. XXXIII, fig. 1*) est noire, elle a deux pieds huit pouces & demi de longueur & quatre pouces dix lignes de circonférence à la base (A); elle est courbée (probablement en arrière) de façon qu'elle forme l'arc d'un cercle qui auroit cinq pieds cinq pouces de diamètre, s'il étoit

\* Cette corne ressemble beaucoup à celle qui est gravée dans Aldrovande. *Lib. I, de quad. Bifulcis, cap. XXI, pag. 757.*

entier; la partie supérieure (*B*) de cette corne est lisse; la partie inférieure est entourée par des anneaux saillans au nombre d'environ trente-cinq, il y a peu de distance entre ceux qui sont près de la base, les derniers sont les plus éloignés les uns des autres & les moins saillans; tous ces anneaux ont des directions obliques en différens sens sur la circonférence de la corne.

N.<sup>o</sup> M C L I.

*Autre corne d'algazelle.*

Quoique cette corne (*pl. XXXIII, fig. 2*) ait été coupée à sa partie inférieure (*A*), elle est un peu plus longue que celle qui est rapportée sous le numéro précédent; sa courbure est aussi plus forte, mais ses anneaux sont très-peu apparens, on n'en voit que des vestiges très-légers, peut-être parce que la corne aura été usée & polie.

N.<sup>o</sup> M C L I I.

*Une corne de paskan.*

Cette corne est brune & presque droite, elle a deux pieds un pouce de longueur & cinq pouces neuf lignes de circonférence à la base; j'en ai vu une au Cabinet de l'abbaye royale de Sainte-Geneviève, qui a près de sept pouces de circonférence; la corne rapportée sous le présent numéro, est lisse sur

la moitié de sa longueur dans sa partie supérieure ; l'autre partie est cannelée longitudinalement comme les cornes de la gazelle , du kevel , de l'antilope , &c. & entourée d'anneaux obliques ; ils sont d'autant plus gros & plus éloignés les uns des autres qu'ils se trouvent plus loin de la base de la corne. On voit à la Bibliothèque de l'abbaye royale de Saint - Victor , parmi quelques morceaux d'histoire naturelle , les deux cornes du pasan tenant à l'os du front ; M. Quillet , Bibliothécaire de cette maison , nous les ayant communiquées , nous les avons fait dessiner (*pl. XXXIII, fig. 3*) ; il paroît par la situation des deux cornes (*AB*) sur l'os frontal (*C*), que l'animal les porte plus inclinées en arrière que celles de la gazelle ; elles ne sont éloignées l'une de l'autre que de quatorze lignes à leurs bases (*DE*) ; mais il y a treize pouces de distance entre leurs extrémités (*FG*) ; ces cornes ont une très-légère courbure en arrière & sont un peu recourbées en dedans par leur extrémité ; j'ai reconnu par ces deux courbures que la corne rapportée sous le présent numéro vient du côté droit.

## N.° M C L I I I.

### *Le squelette d'un antilope.*

Le squelette de l'antilope (*pl. XXXV*) est plus grand que celui de la gazelle , il a

près d'une septième partie de plus en longueur ; les os de ces deux animaux se ressemblent beaucoup ; j'ai seulement observé que la mâchoire supérieure a plus de hauteur dans l'antilope , depuis les dents mâchelières jusqu'aux os du nez , la tubérosité qui est au-dessus des mâchelières ne s'étend pas jusqu'à l'orbite de l'œil ; il y a entre cette tubérosité & l'orbite un enfoncement qui ne se trouve pas dans le kevel , celui des larmiers (*AA, pl. XXXVI, fig. 1*) est à proportion plus grand dans l'antilope ; il n'y a point d'espace vide , comme dans la gazelle , au-dessous de l'os frontal entre les os du nez & celui de la mâchoire ; l'os du front est moins enfoncé.

Les dents de ce squelette sont en partie brisées , cependant il m'a paru qu'il y avoit six mâchelières de chaque côté de chacune des mâchoires , & huit incisives à celles du dessous.

La plus grande différence qui se trouve entre le squelette de l'antilope & celui de la gazelle est dans les cornes ; celles de l'antilope (*pl. XXXVI, fig. 1*) sont plus longues , dirigées obliquement en arrière & en haut , en arrière & en dehors ; elles ont douze à quatorze pouces de longueur & quatre pouces de circonférence près de la base ; il y a quinze pouces & demi de distance entre leurs extrémités , tandis que les bases ne sont éloignées que d'un pouce ; elles sont torses dans leur

longueur, & elles décrivent deux tours de spirale depuis leur base jusqu'à leur extrémité; les Anciens ont observé que ces deux cornes tenant à l'os frontal ressembloient en quelque façon aux branches d'une lire, parce qu'elles forment un angle fort ouvert & qu'elles sont contournées en différens sens; leur couleur est brune-noirâtre, elles sont creuses à l'intérieur comme celles des gazelles, des béliers, des boucs, &c; elles sont à peu près rondes dans leur circonférence, leur extrémité est lisse, mais elles ont de petites stries longitudinales & des anneaux transversaux, à proportion moins gros que ceux de la gazelle & du kevel, plus ils se trouvent près de la base, plus ils sont petits & serrés; la direction de ces anneaux autour de la corne est fort irrégulière sur celles du squelette dont il s'agit, mais cette direction est moins irrégulière sur une autre corne d'antilope (*pl. XXXVI, fig. 2*) qui est au Cabinet & qui a vingt-trois pouces de longueur & six pouces & demi de circonférence près de la base; les anneaux ne s'étendent pas sur la circonférence entière de la corne, ils sont interrompus dans un espace assez large, strié longitudinalement, qui s'étend comme une bande en suivant les pas de la spirale jusque vers les derniers anneaux, près desquels cette bande disparoît, de façon que quelques anneaux sont complets & entourent la corne en entier; on ne voit que des vestiges de cette

bande sur les cornes du squelette : je ne crois pas qu'avec l'accroissement que donne l'âge & les changemens qu'il cause , ces cornes eussent ressemblé à celle dont il vient d'être fait mention.

Les vertèbres du cou de l'antilope m'ont paru ne différer de celles de la gazelle, qu'en ce que l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre étoit moins saillante en avant & plus élevée en arrière.

Les apophyses épineuses des vertèbres dorsales sont à proportion plus larges & les côtes plus étroites que dans la gazelle.

Il y a six vertèbres dans les lombes , quatre fausses vertèbres dans le sacrum & dix dans la queue.

Au reste , le squelette de l'antilope ressembloit à celui de la gazelle , excepté par la grandeur des os , comme on peut le voir dans la table suivante.

pieds. pouc. lignes

Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'entre-deux des cornes.....	"	6.	6.
Largeur du museau.....	"	"	9.
Largeur de la tête prise à l'endroit des orbites.....	"	3.	10.
Longueur de la mâchoire inférieure depuis l'extrémité des dents incisives jusqu'au contour de ses branches..	"	6.	8.
Épaisseur de la partie antérieure de l'os de la mâchoire du dessus....	"	"	1½.

B vj

	pieds. pouc. lign.		
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	H	2.	5.
Longueur de cette ouverture.....	H	2.	3.
Largeur.....	H	"	11.
Longueur des os propres du nez...	H	2.	4.
Largeur.....	H	"	7.
Largeur des orbites.....	H	1.	9.
Hauteur.....	H	1.	7.
Longueur des cornes.....	H	1.	2.
Circonférence à la base.....	H	3.	8.
Largeur du trou de la première vertèbre de haut en bas.....	H	"	8.
Longueur d'un côté à l'autre.....	H	"	10.
Longueur du corps de la seconde vertèbre.....	H	2.	2.
Hauteur de l'apophyse épineuse....	H	"	9.
Largeur.....	H	2.	2.
Hauteur de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre, qui est la plus longue.....	H	4.	"
Longueur de la neuvième côte, qui est la plus longue.....	H	9.	3.
Largeur de la côte la plus large....	H	"	8.
Longueur du sternum.....	H	9.	4.
Longueur de l'apophyse transverse de la quatrième vertèbre lombaire, qui est la plus longue.....	H	2.	"
Longueur du corps de l'avant-dernière vertèbre lombaire.....	H	1.	1.



pieds. pouc. ligne

Longueur de l'os sacrum . . . . .	"	2.	7.
Largeur de la partie antérieure . . . . .	"	2.	6.
Longueur de la partie postérieure . . . . .	"	"	10.
Longueur de la première fausse vertèbre de la queue qui est la plus longue . . . . .	"	"	8.
Hauteur de l'os de la hanche, depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'au-dessus de l'os . . . . .	"	3.	10.
Largeur du bassin . . . . .	"	2.	7.
Hauteur . . . . .	"	2.	11.
Longueur de l'omoplate . . . . .	"	5.	9.
Longueur de sa base . . . . .	"	3.	4.
Longueur de l'humérus . . . . .	"	5.	7.
Circonférence à l'endroit le plus petit . . . . .	"	2.	1.
Longueur de l'os du coude . . . . .	"	7.	10.
Hauteur de l'olécrane . . . . .	"	1.	6.
Longueur de l'os du rayon . . . . .	"	6.	4.
Largeur du milieu de l'os . . . . .	"	"	8.
Longueur du fémur . . . . .	"	7.	2.
Circonférence du milieu de l'os . . . . .	"	2.	2.
Longueur des rotules . . . . .	"	1.	1.
Largeur . . . . .	"	"	11.
Épaisseur . . . . .	"	"	7.
Longueur du tibia . . . . .	"	8.	6.
Circonférence du milieu de l'os . . . . .	"	2.	2.
Longueur du calcaneum . . . . .	"	2.	3.


	pieds.	pouc.	lign.
Longueur des canons des jambes de devant.....	"	7.	3.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	5 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des canons des jambes de derrière.....	"	6.	11.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	6.
Longueur des os des premières pha- langes.....	"	1.	3.
Longueur des os des secondes pha- langes.....	"	"	11.
Longueur des os des troisièmes pha- langes.....	"	"	11.


## N.º M C L I V.

*Une corne d'antilope.*


Cette corne a été décrite avec le squelette d'antilope, rapporté sous le numéro précédent.








*Fig. 3.*





*Fig. 2.*



*Fig. 1.*













e del.


P F Tardieu Sculp.


LE NANGUER.













# DESCRIPTION

## DES BÉZOARDS ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX.

ON donne le nom de *Bézoard* à plusieurs matières de nature très-différente ; pour reconnoître l'abus que l'on a fait de cette dénomination , il faut remonter à son étymologie : soit qu'elle vienne du mot *Pazan* ou *Pazar* , qui est le nom du *Bouc* en langue Persanne , ou du mot *Beluzaar* , qui signifie un contre-poison en Hébreu ou en Chaldéen ; c'est une preuve que le nom de *bézoard* n'a d'abord été donné qu'à des concrétions qui se trouvent dans le corps de quelques animaux de l'Asie ; on ne fait pas précisément quels sont ces animaux , mais il y a lieu de présumer sur les relations des Voyageurs , qu'ils ressemblerent aux boucs & aux gazelles ; au moins il est certain qu'ils sont du nombre des animaux à pied fourchu qui ont des cornes ; le bézoard qu'ils donnent est au dehors & au dedans de couleur d'olive-brune-foncée pour l'ordinaire & même noirâtre , sa surface est luisante & polie.

Après la découverte de l'Amérique , on a aussi donné le nom de *bézoard* à des concrétions qui se sont trouvées dans des animaux de cette partie du monde , & qui ont une

couleur blanchâtre dans leur intérieur ; leur surface externe n'est pas aussi luisante ni aussi polie que celle des bézoards orientaux ; elle a une couleur blanchâtre mêlée de jaune ou de noir , le plus souvent avec des teintes brillantes qui semblent être dorées ou bronzées ; pour distinguer ces concrétions de celles de l'Asie , on les a nommées *bézoards occidentaux* , & alors le bézoard proprement dit & anciennement connu , a été appelé *bézoard oriental*.

Tous les bézoards sont composés de couches concentriques , & plusieurs ont au centre un corps étranger , qui est le noyau sur lequel porte leur première couche ; on a trouvé dans les bézoards orientaux , des marcaffites , du talc , des cailloux , du gravier , des pailles , des brins d'herbes , du bois , des semences de plantes ressemblantes à celles des fasséoles , des cerises , des mirabolans , de la casse , des tamarins , de l'acacia d'Égypte , &c \* ; ces différentes substances , & principalement les semences de plantes qui sont au centre des bézoards orientaux , donnent lieu de croire qu'ils se forment dans l'estomac ou dans les intestins des animaux : car s'ils se trouvoient dans la vésicule du fiel , dans les reins , dans la vessie ou dans les autres cavités du corps , ils n'auroient pas si fréquemment pour noyau des substances qui ne peuvent y pénétrer que

\* Voyez les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, année 1710 , page 233 ; & 1712 , page 202.

par des accidens & des hasards fort extraordinaires ; au contraire ces substances entrent aisément avec les alimens dans l'estomac & dans les intestins ; j'ai trouvé dans la panse des bœufs que j'ai disséqués , grand nombre de graviers qui auroient pu faire le noyau de plusieurs bézoards.

Bontius dit que les bézoards orientaux sont dans le ventre des animaux qui les produisent ; il y a de ces animaux dans différentes provinces de la Perse. Kœmpfer s'étant informé de ce que l'on pensoit dans ces pays au sujet de la partie des animaux dans laquelle le bézoard se forme , rapporte que c'est le pylore ou le fond du quatrième estomac ; que si le bézoard ne s'y engendre pas , au moins il y séjourne & y prend de l'accroissement , & que s'il n'est pas bien engagé dans les plis de l'estomac , il passe par le pylore , il suit le conduit intestinal , & il sort avec les excréments ; mais ces faits ne sont pas prouvés , aucun Observateur n'a ouvert un animal portant des bézoards pour savoir précisément quelles parties les renferment ; Kœmpfer n'a traité du bézoard que sur des récits dont la plupart sont peu vraisemblables.

J'ai fait une observation qui peut donner lieu de présumer que les bézoards se forment dans l'estomac ou dans les intestins des animaux ; j'ai remarqué sur les dents mâchelières des ruminans , tels que les bœufs , les béliers , les boucs , les buffles , les gazelles ,

les cerfs, les daims, les chevreuils, &c. une couche de matière noirâtre & luisante, avec des teintes brillantes qui paroissent être dorées & bronzées; dans les endroits où cette matière a de l'épaisseur, elle recouvre un tartre blanchâtre; j'ai aussi vu sur plusieurs bézoards occidentaux une couche de matière ressemblante à celle qui revêt les dents mâchelières des animaux ruminans; elle a les mêmes couleurs & les mêmes teintes brillantes & dorées; cette matière ne peut venir que des herbes que broutent ces animaux & qu'ils mâchent; lorsqu'ils ruminent, les sucs qu'ils en expriment s'attachent à leurs dents & y forment une sorte de tartre analogue aux sucs concrets des herbes crues, dont ils se nourrissent; on ne peut guère douter que les mêmes sucs, qui s'épaississent & se durcissent sur les dents des animaux ruminans, ne s'épaississent & ne se durcissent aussi sur la face extérieure des couches des bézoards qui se trouvent dans leurs estomacs ou dans leurs intestins, puisque les bézoards occidentaux sont revêtus d'une matière ressemblante à celle qui revêt les dents, & que le caractère singulier des reflets dorés & bronzés est aussi éclatant sur les bézoards que sur les dents; les bézoards orientaux n'ont point de ces reflets, mais leur surface est aussi luisante que celle de la matière qui recouvre les dents, elle a le même fond de couleur, & leur substance paroît avoir des rapports avec les

sucs concrets des herbes ; on pourroit soupçonner qu'elle est composée en partie de ces sucs & en partie d'une matière tartareuse ou pierreuse , colorée par ces sucs concrets & mêlée avec eux : en observant au microscope la matière qui est sur les dents , & celle du bézoard oriental , j'ai vu ces parties tartareuses ou pierreuses.

Le même mélange de ces parties avec des sucs concrets , qui s'attache aux dents , se fait aussi dans l'estomac & dans les intestins ; je suis porté à croire qu'il y forme les bézoards en s'y pelotonnant ou en s'attachant aux noyaux de matières étrangères qui s'y trouvent ; dès qu'une première couche enveloppe un noyau , c'est déjà un petit bézoard ; en roulant sur les parois de l'estomac ou des intestins , il se polit comme la matière qui revêt les dents est polie par le frottement des lèvres , des joues & de la langue ; une seconde couche succède à la première durant le repos de l'animal & dans d'autres circonstances qui arrêtent le mouvement du bézoard ; cette couche prend du poli comme la première , & les autres se forment successivement de la même façon : lorsque l'on ouvre un bézoard , on voit que ces couches sont de différentes épaisseurs , mais elles ont toutes à peu près le même poli sur leur face extérieure.

La forme des bézoards dépend de celle de leurs noyaux , principalement lorsqu'ils ne sont composés que d'un petit nombre de

couches; la plupart sont ronds ou arrondis, il y en a d'oblongs, d'anguleux & de formes très-irrégulières; plus ils deviennent gros, plus ils s'arrondissent, parce que les endroits les plus saillans étant plus exposés au frottement, les couches y prennent moins d'épaisseur que dans les endroits plats ou concaves.

Lorsqu'un bézoard cesse d'acquérir de nouvelles couches, les anciennes s'usent & se détruisent dans les endroits les plus convexes; alors on voit à l'extérieur leur épaisseur & leurs joints comme sur une agate-onyx; les bézoards ne perdent donc rien de leur dureté dans le corps de l'animal, quoiqu'ils n'y prennent plus d'accroissement; comment peut-on croire, comme le dit Kœmpfer, qu'ils se ramollissent, se dissolvent & se détruisent, lorsque l'animal passe plusieurs jours sans manger! le même Auteur ajoute, avec aussi peu de vraisemblance, que le bézoard n'est pas dur & solide dans le corps de l'animal, qu'au contraire on l'en tire mou & friable comme un jaune d'œuf durci dans l'eau bouillante; que pour conserver le bézoard dans son entier & dans tout son lustre, on le met dans la bouche pour lui donner le temps de se durcir: il est pourtant bien certain qu'il se polit dans le corps de l'animal durant tout le temps de sa formation, puisque toutes ses couches sont polies sur leurs faces extérieures; d'ailleurs en le tenant dans la bouche on ne lui donneroit pas plus de

dureté ni de poli, qu'il n'auroit pu en prendre dans le corps de l'animal, puisqu'on le mettroit de nouveau dans un lieu où il auroit à peu près la même chaleur & la même humidité. Il me semble que Kœmpfer avoit été mieux instruit lorsqu'il a dit que la formation du bézoard dépend de la qualité des herbes dont l'animal se nourrit; les plantes glutineuses, aromatiques, résineuses, qui croissent sur les lieux élevés des pays chauds, paroissent en effet les plus propres pour la production du bézoard. Mais il y a peu de pays où les herbes reçoivent de la nature du sol, de la qualité de l'air & de l'action du soleil les sucres propres à former des bézoards orientaux : la structure du corps doit aussi contribuer à cette formation; car il ne paroît pas que toutes les espèces d'animaux produisent des bézoards, même dans les pays chauds.

J'ai lieu de présumer que dans tous les pays les sucres des herbes produisent sur les dents mâchelières des différentes espèces d'animaux ruminans, dont j'ai déjà fait l'énumération, une matière qui a des reflets de couleur dorée ou bronzée, car je l'ai remarquée sur tous les individus de ces espèces que j'ai disséqués, ou dont j'ai seulement vu les squelettes : mais cette matière ne s'attache aux bézoards que dans les pays où se trouvent les animaux qui donnent les bézoards occidentaux qui en sont revêtus, on dit que c'est



en Amérique ; la matière brillante & dorée revêt leurs couches successives sans pénétrer dans l'intérieur de ces couches , ou au moins sans y porter la couleur brune , comme dans le bézoard oriental ; car la substance intérieure des couches du bézoard occidental est blanche ou jaunâtre : il y a lieu de croire que ce bézoard vient d'un animal ruminant , & que ceux qui ne sont pas revêtus de matière dorée viennent d'animaux qui n'ont rien de cette matière sur les dents. J'ai vu un bézoard, trouvé dans le colon d'un cheval, il n'a aucune écorce dorée , aussi les dents du cheval n'en ont point ; mais pourquoi les sucS concrets qui forment cette écorce sur les bézoards occidentaux ne se mêlent-ils pas avec la partie tartareuse ou pierreuse , comme dans le bézoard oriental ? Pourquoi la surface de ce bézoard n'a-t-elle pas des reflets de couleur dorée ou bronzée comme les bézoards occidentaux ? Ces différences ne viennent peut-être que de celles qui sont dans la qualité des sucS des plantes & des parties pierreuses ou tartareuses, lorsque les parties cristallines sont abondantes & pures , leur cristallisation se fait peut-être avec trop de force pour permettre le mélange du suc concret des plantes.

La cristallisation du bézoard oriental est fort régulière & paroît très-pure ; après avoir cassé une des couches de ce bézoard , on aperçoit , à l'œil nu , dans l'épaisseur de la couche de petites stries transversales & bril-

lantes ; en les regardant au microscope on les trouve encore plus brillantes , & on reconnoît que ce sont des aiguilles cristallines , qui paroissent dirigées de dedans en dehors , depuis la face interne de la couche jusqu'à la face externe ; les plus grandes de ces aiguilles s'étendent d'une face à l'autre & laissent entre elles des intervalles remplis par des aiguilles plus petites qui tiennent aux grandes comme des branches à une tige ; toutes ces aiguilles grandes & petites ont moins de grosseur à leur origine que dans le reste de leur étendue ; elles semblent naître d'un point d'où sortent plusieurs aiguilles divergentes & dirigées plus ou moins obliquement , & les grandes aiguilles paroissent être un faisceau d'aiguilles plus petites : elles sont toutes rayées transversalement par de petites lignes blanchâtres , placées fort près les unes des autres , & parallèles aux faces de la couche ; ces lignes indiquent peut-être les différens degrés de l'accroissement de chaque aiguille ; celles qui traversent les couches & qui sont traversées elles-mêmes par des lignes parallèles peuvent , à ce qu'il m'a paru jusqu'à présent , faire le caractère distinctif des bézoards occidentaux qui se forment dans les estomacs ou les intestins des animaux ruminans , comme il y a lieu de le présumer à l'inspection des teintes dorées & bronzées , qui sont sur la plupart de ces bézoards , dans lesquels j'ai vu des aiguilles traversées par des lignes parallèles ; de onze

de ces bézoards que j'ai observés dans leurs parties internes, sept ont des teintes dorées & bronzées, quoiqu'elles manquent aux autres; je n'en suis pas moins porté à croire que ceux-ci ont aussi été formés dans les estomacs ou dans les intestins, parce qu'ils ont le même caractère de cristallisation; il y a d'autres bézoards que l'on pourroit regarder comme occidentaux, parce qu'ils sont très-différens des bézoards orientaux, & qu'ils se forment dans les intestins des animaux: tel est le bézoard que j'ai déjà cité, & qui a été trouvé dans le colon d'un cheval de ce pays-ci, & d'autres bézoards dont il sera fait mention dans la suite de cet ouvrage.

Les Médecins Grecs ne connoissoient pas les bézoards; il paroît que les Arabes reçurent des Persans le bézoard oriental, & le regardèrent comme un contre-poison; en effet, on a reconnu que cette matière contient un sel volatil alkali, sulfureux & huileux, qui excite la transpiration & qui donne des forces; mais on n'a jamais bien su si ces propriétés sont à un degré éminent, même dans les bézoards orientaux; cependant on en a fait usage pendant long-temps, & on les emploie encore quelquefois: si le bézoard étoit un remède efficace, il se seroit d'autant mieux maintenu en vogue, qu'il vient de loin, que son origine n'est pas bien connue, & que le bézoard oriental se vend fort cher\* ; ceux qui exhalent

\* Son prix est de dix ou douze livres le gros.

Les vertus, prétendent qu'elles ne sont jamais équivoques, lorsqu'on emploie de vrais bézoards; mais plus j'ai observé les bézoards & plus il m'a paru qu'il est aisé de reconnoître ceux qui sont apprêtés; quoique les bézoards orientaux soient peu figurés dans leurs parties intérieures, il seroit très-difficile de faire les aiguilles transversales, qui sont apparentes dans plusieurs de leurs couches, & il est bien certain que l'on ne pourroit pas imiter la cristallisation du bézoard occidental: on ne parviendroit pas même à contrefaire les pierres des reins, de la vessie, &c; d'ailleurs elles ne sont que trop communes, & elles ne méritent pas d'être fabriquées: car il n'y a pas lieu d'espérer qu'elles fassent jamais de bien aux hommes pour tant de maux qu'elles leur causent; les moyens que l'on a indiqués afin de distinguer les vrais bézoards orientaux des bézoards factices sont tous fautifs; on pourroit les composer de manière qu'un fer rouge les perceroit sans faire bouillonner leur substance, & on leur donneroit aisément une couleur qui laisseroit des teintes olivâtres ou verdâtres sur un papier enduit de craie, de céruse ou de chaux; on parviendroit aussi, sans grande difficulté, à les former par couches concentriques & polies sur leurs surfaces, à leur donner un noyau & à imiter leurs couleurs; mais avec toutes ces précautions, la supercherie sera découverte au premier coup-d'œil, ou au moins à l'aide d'une loupe, si

l'on enlève quelque partie de cette matière apprêtée; au contraire on reconnoîtra dans les vrais bézoards, principalement dans les bézoards occidentaux, les caractères propres & inimitables de leur structure, pour peu qu'on l'ait observée.

N.° M C L V.

*Un bézoard oriental.*

La forme de ce bézoard approche de l'ovoïde; il pèse une once cinquante-trois grains; il a un pouce & demi de longueur, quatorze lignes de largeur & treize lignes d'épaisseur; sa couleur est brune-olivâtre, sa surface est un peu inégale, parce que les couches extérieures ne sont pas entières, mais les endroits des fractures sont polis, ce qui prouve que les couches ont été entamées dans le corps de l'animal qui portoit ce bézoard.

N.° M C L V I.

*Autre bézoard oriental.*

Ce bézoard est oblong, il a environ onze lignes de diamètre & dix-sept lignes de longueur, il pèse cinq gros & soixante-neuf grains; il a le même poli & à peu près la même couleur brune-olivâtre que le précédent, mais avec des teintes plus claires & d'autres plus foncées, qui forment sur sa surface des veines ou des bandes circulaires & concentriques comme celle d'un caillou-onyx: ces veines indiquent les coupes des

couches dont ce bézoard est composé, & qui ont été entamées par le frottement dans le corps de l'animal.

N.º M C L V I I.

*Autre bézoard oriental.*

Ce bézoard est oblong & de couleur noirâtre, il a un pouce de longueur & cinq à six lignes de diamètre; il pèse près d'un gros & demi.

N.º M C L V I I I.

*Autre bézoard oriental.*

N.º M C L I X.

*Autre bézoard oriental.*

Le poids de chacun de ces deux bézoards est d'un gros & quelques grains, le premier est noirâtre, le second a des teintes de couleur d'olive-pâle.

N.º M C L X.

*Autre bézoard oriental.*

Ce bézoard pèse un gros moins quelques grains, il est de couleur brune-noirâtre & olivâtre.

N.º M C L X I.

*Autre bézoard oriental.*

La couleur de ce bézoard est olivâtre, il pèse trente grains, il a quelques tubercules

52 *Description*

sur sa surface & un grenetis très-fin entre les tubercules dans les endroits qui n'étoient pas exposés au frottement.

N.<sup>o</sup> M C L X I I.

*Autre bézoard oriental.*

La couleur de ce bézoard est brune; il a une forme très-irrégulière, & il est couvert de tubercules: il pèse quarante-sept grains.

N.<sup>o</sup> M C L X I I I.

*Autre bézoard oriental.*

Ce bézoard ressemble au précédent, par sa couleur, sa forme & ses tubercules: son poids est de vingt-six grains.

N.<sup>o</sup> M C L X I V.

*Autre bézoard oriental.*

Quoique ce bézoard soit plus gros que le précédent, il ne pèse que quatorze à quinze grains, il est de forme irrégulière & de couleur olivâtre.

N.<sup>o</sup> M C L X V.

*Autre bézoard oriental.*

Ce bézoard est de même couleur que celui qui le précède, mais il est plus petit, cependant il a le même poids; sa forme approche de celle d'un rein.



N.º M C L X V I.

*Autre bézoard oriental.*

La forme de ce bézoard est cylindrique, il a un pouce de longueur sur trois lignes & dem. de diamètre, sa couleur est brune-olivâtre : il pèse trente-six grains.

N.º M C L X V I I.

*Bézoards orientaux.*

Ces bézoards sont cylindriques ; leur diamètre n'est que d'environ deux lignes ; ils ont été cassés de manière que l'on voit un brin d'herbe qui fait l'axe du cylindre & le noyau du bézoard.

N.º M C L X V I I I.

*Autres bézoards orientaux.*

La forme de ces bézoards est cylindrique, comme celle des précédens, & ils ont aussi des brins d'herbes à leur centre, mais leur diamètre n'est que d'environ une ligne.

N.º M C L X I X.

*Bezoard oriental.*

Ce bézoard est oblong & aplati ; il a été cassé à l'un des bouts, de manière que l'on voit dans l'intérieur un morceau de caillou blanc qui en fait le noyau : il pèse un gros moins quelques grains.

## N.° M C L X X.

*Fragmens de bézoards orientaux.*

On voit sur ces fragmens l'épaisseur & la structure des couches dont ils sont composés.

## N.° M C L X X I.

*Autres fragmens de bézoards.*

Ces fragmens sont remarquables, en ce que leur couche intérieure est composée de poils pelotonnés & serrés comme dans un feutre; le bézoard oriental dont ils faisoient partie, avoit donc pour noyau une sorte d'égagropile, c'est-à-dire, une pelotte de poils, qui au lieu d'être revêtue d'une matière semblable à celle qui recouvre les égagropiles, étoit enveloppée par des couches de matière de bézoard oriental.

## N.° M C L X X I I.

*Noyaux de bézoards orientaux.*

Ces noyaux sont des semences de plantes, & des morceaux de bois.

## N.° M C L X X I I I.

*Bézoard occidental.*

Ce bézoard est de couleur jaunâtre & de forme ovoïde irrégulière; les faces extérieures de ses couches sont polies: son grand diamètre a deux pouces cinq lignes de longueur, & le petit a depuis un pouce huit

lignes jusqu'à deux pouces : il pèse six onces ; la plus grande partie des couches extérieures s'enlève & laisse voir les coupes de ses couches , sur lesquelles on distingue les aiguilles brillantes dont elles sont composées.

N.º M C L X X I V.

*Fragmens d'un bézoard occidental.*

En rapprochant ces fragmens , on voit que le bézoard occidental , dont ils faisoient partie , étoit à peu près aussi gros que le précédent , mais les couches n'ont pas autant de poli , & leurs aiguilles ne sont pas aussi brillantes & aussi distinctes : la substance de ce bézoard est moins pure.

N.º M C L X X V.

*Bézoard occidental.*

Ce bézoard est de forme ovoïde irrégulière , il a quinze lignes de longueur sur son grand diamètre , sa surface est jaunâtre & parsemée de petits grains bruns avec des reflets dorés ; je l'ai trouvé entamé d'un côté jusqu'à sa seconde couche : je l'ai cassé en deux parties pour voir l'intérieur , & j'ai reconnu par cette fracture que la première & la seconde couche sont composées d'aiguilles semblables à celles du bézoard , rapporté sous le n.º M C L X X I I I ; la surface externe de la troisième couche a des couleurs dorées & bronzées , comme celles de la matière qui revêt les dents mâchelières

des animaux ruminans qui ont des cornes ; les mêmes couleurs sont aussi sur la surface interne de la seconde couche.

N.° M C L X X V I.

*Autre bézoard occidental.*

La longueur de ce bézoard est à peu près la même que celle du précédent, mais sa forme est bien différente ; il y a dans le milieu une sorte d'étranglement en forme de gouttière circulaire : il a été cassé dans cet endroit, on voit au centre un brin d'herbe qui fait le noyau ; toute sa substance est mêlée de matière étrangère, qui paroît être des herbes sèches ; sa surface est en partie d'un blanc sale, en partie brune & en partie noirâtre, avec quelques teintes dorées.

N.° M C L X X V I I.

*Autre bézoard occidental.*

Ce bézoard est un peu plus petit que le précédent, il lui ressemble par ses couleurs & par son noyau ; mais il est de forme très-irrégulière, & sa substance est moins mêlée de matière étrangère.

N.° M C L X X V I I I.

*Autre bézoard occidental.*

La longueur de ce bézoard est de treize lignes ; ses couches ont été entamées ; sa couleur est jaunâtre avec des teintes noirâtres.

## N.º M C L X X I X.

*Autre bézoard occidental.*

Le plus grand diamètre de ce bézoard est de onze lignes, il est de même couleur que le précédent : sa première couche a été entamée.

## N.º M C L X X X.

*Autre bézoard occidental.*

La première couche de ce bézoard est en partie détruite & peut-être enlevée ; on détache aussi une portion de la seconde : la surface externe de la première & de la troisième couche est en partie de couleur brune ou noirâtre avec des teintes dorées & bronzées ; il y a aussi de ces teintes sur la surface interne de la seconde couche : le reste de ce bézoard est de couleur blanchâtre ou jaunâtre, il a presque la même grosseur que le précédent.

## N.º M C L X X X I.

*Autre bézoard occidental.*

Ce bézoard est ovoïde, son grand diamètre a neuf lignes, & le petit sept ou huit ; on peut enlever une partie de sa première couche : il a les mêmes couleurs que le précédent.

## N.º M C L X X X I I.

*Autre bézoard occidental.*

La forme de ce bézoard est très-irrégulière, il est divisé en deux parties, & il y a au

centre un gros noyau qui paroît composé d'herbes sèches ; sa couleur est blanchâtre & brune , avec des reflets bronzés ; son plus grand diamètre a dix lignes.

N.<sup>o</sup> M C L X X I I I.


*Portion de bézoard occidental.*

Il paroît que cette portion faisoit la moitié du bézoard entier : elle est à peu près de même grosseur que le bézoard précédent , & on y voit les mêmes couleurs & un trou où étoit vraisemblablement le brin d'herbe qui faisoit le noyau ; la première couche est fort épaisse & bien cristallisée , on y distingue à l'œil nu les aiguilles cristallines dont elle est composée , on y voit au microscope les lignes transversales de chaque aiguille : ce caractère est apparent sur les huit bézoards précédens dans les endroits où la cristallisation est bien formée.

N.<sup>o</sup> M C L X X X I V.

*Autre bézoard occidental.*

La surface de ce bézoard est de couleur jaunâtre ou noirâtre , avec de belles teintes dorées & bronzées : quoique je ne l'aie pas entamé pour voir la structure de ses couches , il y a lieu de présumer qu'elles sont composées de cristaux semblables à ceux des autres bézoards occidentaux , puisqu'il a des teintes dorées & bronzées ; il est presque rond , son plus grand diamètre a sept lignes & demie.



---

# LE BUBALE

## ET LES AUTRES ANIMAUX QUI ONT RAPPORT AUX GAZELLES ET AUX CHÈVRES.

---

# LE BUBALE.\*

**N**OUS avons dit à l'article du buffle ,  
que les Latins modernes lui avoient  
appliqué mal-à-propos le nom de *Bu-*  
*balus* : ce nom appartenoit anciennement

\* Bubale. Βύβαλος, en Grec, *Bubalus*, en Latin.

Βύβαλος. Aristotelis. *Genus id fibrarum* . . . . .  
*Cervi, damæ, Bubali & aliorum quorundam sanguini*  
*deest, quocirca eorum sanguis non similiter atque cæ-*  
*terorum coarctescit. . . . . Bubali sanguis aliquantulo*  
*spissatur; quippe qui proximè orillo aut paulò minùs*  
*consistat. Arist. Hist. animal. lib. III, cap. VI. . . . .*  
*Bubalis etiam, capreisquæ interdum cornua inutilia sunt,*  
*nam etsi contra nonnulla resistunt & cornibus sese defen-*  
*dunt, tamen feroces pugnacesque belluas fugiunt. Idem.*  
*de partibus animal. lib. III, cap. II.*

*Bubalus. Plinii. Bubalum gignit Africa, vituli cervine*  
*quadam similitudine. Hist. nat. lib. VIII, cap. XV.*

Βύβαλιδες. *Æliani. lib. III, cap. T; lib. V,*

à l'animal dont il est ici question, & cet animal est d'une nature très-éloignée de celle du buffle; il ressemble au cerf, aux gazelles & au bœuf par quelques rapports assez sensibles: au cerf par la grandeur & la figure du corps<sup>a</sup>, & sur-tout par la forme des jambes<sup>b</sup> mais il a des cornes permanentes & faites à cap. XLVHI; lib VII, cap. XLVII, & lib. XIII, cap. IV.

Βύβαλος. Oppiani. *Dorcade platycerote corpore inferior, cornua non ramosa sicut Cervis & Capreis sed rupicaprarum cornibus similia, tum situ, tum in aversam partem retortis mucronibus, ad pugnam ferè inutilia.* De Venatione, lib. II.

*Buselaphus Cati*, apud Gesnerum. *Hist. quadrup.* pag. 121.

*Bubalus Capreolus Africanus.* Horatius Fontana, apud Aldrovandum, *de quad.* Bisul, pag. 364 & 365. *Ubi vide figuram.*

Vache de Barbarie. *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux*, partie II, page 24, fig. pl. XXXIX.

Élan. *Description du cap de Bonne-espérance*, par Kolbe, tome III, chap. IV.

<sup>a</sup> Voyez la figure & la description de la Vache de Barbarie, dans les *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux. Partie II*, page 24 & suiv.

<sup>b</sup> Voyez ci-après la description du squelette du Bubale.



peu près comme celles des plus grosses gazelles, desquelles il approche par ce caractère & par les habitudes naturelles; cependant il a la tête beaucoup plus longue que les gazelles & même que le cerf; enfin, il ressemble au bœuf par la longueur du museau & par la disposition des os de la tête, dans laquelle, comme dans le bœuf, le crâne ne débord pas en arrière au-delà de l'os frontal; ce sont ces différens rapports de conformation, joints à l'oubli de son ancien nom, qui ont fait donner au bubale, dans ces derniers temps, les dénominations composées de *buselaphus*, taureau-cerf, *bucula-cervina*, vache-biche, vache de Barbarie, &c; le nom même de *bubalus* vient de *bubulus*, & par conséquent a été tiré des rapports de similitude de cet animal au bœuf.

Le bubale a la tête étroite & très-alongée, les yeux placés très-haut, le front court & étroit, les cornes permanentes, noires, grosses, chargées d'anneaux, très-gros aussi; elles prennent naissance fort près l'une de l'autre, & s'éloignent beaucoup à leur extrémité;

elles sont recourbées en arrière & torses comme une vis dont les pas feroient usés en devant & en dessous <sup>a</sup> ; il a les épaules élevées, de manière qu'elles forment une espèce de bosse sur le garrot, la queue est à peu près longue d'un pied & garni d'un bouquet de crins à son extrémité ; les oreilles sont semblables à celles de l'antilope. Kolbe <sup>b</sup> a donné à cet animal le nom d'*élan*, quoiqu'il ne lui ressemble que par un caractère très-superficiel ;

<sup>a</sup> Voyez la figure de l'animal entier dans les Mémoires pour servir à l'histoire des animaux. *Partie II, page 24, pl. XXXIX.* — Voyez aussi les figures du squelette & des têtes du Bubale dans ce volume-ci, (*pl. XXXVII & XXXVIII*).

<sup>b</sup> L'Élan d'Afrique. . . . Sa tête qui est fort belle, ressemble à celle du cerf, mais elle est plus petite à proportion du corps ; il a les cornes d'environ un pied de longueur : près de la tête elles sont raboteuses, mais aux extrémités elles sont droites, unies & pointues ; son cou est dégagé & beau ; la mâchoire supérieure est tant soit peu plus grande que l'inférieure ; ses jambes sont déliées, minces & longues, & sa queue a environ un pied de long : le poil dont son corps est couvert, est doux, poli & de couleur cendrée. . . . Un élan d'Afrique pèse environ quatre cents livres. *Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe, tome III, chap. IV.*

le poil du bubale est comme celui de l'élan, plus menu vers sa racine que dans son milieu & qu'à l'extrémité; cela est particulier à ces deux animaux, car dans presque tous les quadrupèdes le poil est toujours plus gros à la racine qu'au milieu & à la pointe; ce poil du bubale est à peu près de la même couleur que celui de l'élan, quoique beaucoup plus court, moins fourni & plus doux; ce sont-là les seules ressemblances du bubale à l'élan: pour tout le reste, ces deux animaux sont absolument différens l'un de l'autre; l'élan porte un bois plus large & plus pesant que celui du cerf, & qui de même se renouvelle tous les ans; le bubale, au contraire, a des cornes qui ne tombent point, qui croissent pendant toute la vie, & qui, pour la forme & la texture, sont semblables à celles des gazelles: il leur ressemble encore par la figure du corps, la légèreté de la tête, l'allongement du cou, la position des yeux, des oreilles & des cornes, la forme & la longueur de la queue. M.<sup>rs</sup> de l'Académie des Sciences, auxquels cet animal fut présenté sous le nom de

*vache de Barbarie*, & qui ont adopté cette dénomination, n'ont pas laissé que de le reconnoître pour le *bubalus* des Anciens : nous avons cru devoir rejeter la dénomination de *vache de Barbarie*, comme équivoque & composée ; mais nous ne pouvons mieux faire, au reste, que de citer ici la description exacte \* qu'ils

\* L'habitude du corps, les jambes & l'encolure de cet animal le faisoient mieux ressembler à un cerf qu'à une vache, dont il n'avoit que les cornes, lesquelles étoient encore différentes de celles des vaches en beaucoup de choses ; elles prenoient leur naissance fort proche l'une de l'autre, parce que la tête étoit extraordinairement étroite en cet endroit-là, tout au contraire des vaches, qui ont le front fort large, suivant la remarque d'Homère ; elles étoient longues d'un pied, fort grosses, recourbées en arrière, noires, torses comme une vis, & usées en devant & en dessus, en sorte que les côtés élevés qui formoient la vis étoient là entièrement effacés ; la queue n'étoit longue que de treize pouces, en comprenant un bouquet de crins longs de trois pouces qu'elle avoit à son extrémité ; les oreilles étoient semblables à celles de la gazelle, étant garnies en dedans d'un poil blanc en quelques endroits, le reste étant pelé, & découvrant un cuir parfaitement noir & lissé ; les yeux étoient si hauts & si proche des cornes, que la tête paroissoit n'avoir presque point de front ; les mamelons du pis étoient très-menus, très-courts & seulement au nombre de deux, ce qui les rendoit fort différens de ceux de

ont donnée de cet animal, & par laquelle on voit qu'il n'est ni gazelle, ni chèvre, ni vache, ni élan, ni cerf<sup>a</sup>; mais qu'il est d'une espèce particulière & différente de toutes les autres; au reste, cet animal est le même que Caius<sup>b</sup> a décrit sous

nos vaches; les épaules étoient fort élevées, faisant entre l'extrémité du cou & le commencement du dos une bosse. . . . Il y a apparence que cet animal doit être plutôt pris pour le bubale des Anciens, que le petit bœuf d'Afrique, que Belon décrit: car Solin compare le bubale au cerf; Oppien lui attribue des cornes recourbées en arrière, & Pline dit qu'il tient du veau & du cerf. *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, partie II, pages 25 & 26.*

<sup>a</sup> *Nota.* Deux caractères essentiels séparent le bubale du genre des cerfs; le premier, sont les cornes qui ne tombent pas; le second, c'est la vésicule du fiel qui se trouve dans le bubale, & qui, comme l'on sait, manque dans les cerfs, les daims, les chevreuils; &c. « La vésicule du fiel (disent M.<sup>rs</sup> de l'Académie) étoit à la partie « cave au côté droit, elle étoit attachée par toute « sa moitié interne au foie, & la membrane qui « faisoit la moitié de dehors étoit mince, délicate « & toute plissée, étant entièrement vide de fiel. « *Description anatomique de la vache de Barbarie; « Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, « partie II, page 29 ».*

<sup>b</sup> *Ex Mauritaniæ desertis locis (inquit Joh. Caius Anglus), ad nos adventum est animal bisulco vestigio,*

le nom de *buselaphus*, & je suis étonné que M.<sup>rs</sup> de l'Académie n'aient pas fait

*magnitudine cervæ, formâ & affectu inter cervam & juvencam; unde ex argumento voco Buselaphum seu Bovi-cervum, Moschelaphum seu Buculam-cervinam: capite & aure longâ atque tenui, tibiâ & ungulâ gracili ut cervæ, ita ut ad celeritatem videatur factum animal. Cauda pedali longitudine & paulo amplius, formâ caudæ vaccinæ quam simillima, sed brevitate accedens propius ad cervinam: naturâ quasi ambigente cervæne esset an vaccæ, per superiora rufa & lenis, per ima nigra & hirta. Colore corporis fulvo seu rufo undique pilo sessile cuicunque æquato, in fronte stellatim posito at sub cornibus per ambitum erecto: cornibus nigris, in summum levibus, cætera rugosis, rugis ex adversâ parte sibi vicinioribus, ex adversâ ad duplam aut triplam latitudinem a se diductis. Ea cornua primo suo oriu digitali tantum latitudine distantia paulatim se dilatant ad mediam usquæ sui longitudinem & paulo ultra, quâ parte distant palmos tres cum semisse, tum se reducunt leviter & recedunt rursus in aversum, ita ut extrema cernua non distent nisi palmorum duorum digiti trium & semissis intervallo: longa quidem sunt pedem unum & palmum unum crassa verò in ambitu ad radices palmos tres. Caput a vertice quâ parte linea nigra inter cornua dividitur, ad extremas naves, longum est pedem unum palmos duos & digitum unum; latum qua est latissimum, in fronte videlicet paulo supra oculorum regionem digitos septem: crassum in ambitu quâ maximum est pedem unum & palmos tres. Dentes habet octonos, ordine caret superiori & ruminat; ubera sunt duo, corpori æquata qua constat juvencam esse necdum factam. Caius de Buselapho. Geln. Hist. quadrup. pag. 121.*

cette remarque avant nous, puisque tous les caractères que Caius donne à son *bustelaphus*, conviennent à leur vache de Barbarie.

Nous avons au Cabinet du Roi;  
1.<sup>o</sup> un squelette de bubale (*voyez pl. XXXVII*) qui provient de l'animal que M.<sup>rs</sup> de l'Académie des Sciences ont décrit & disséqué sous le nom de *vache de Barbarie*; 2.<sup>o</sup> une tête (*voyez pl. XXXVIII, fig. 2*) beaucoup plus grosse que celle de ce squelette, & dont les cornes sont aussi beaucoup plus grosses & plus longues; 3.<sup>o</sup> une autre portion de tête (*voyez pl. XXXVIII, fig. 1*), avec les cornes qui sont tout aussi grosses que les précédentes, mais dont la forme & la direction sont différentes: il y a donc dans les bubales, comme dans les gazelles, dans les antilopes, &c. des variétés pour la grandeur du corps & pour la figure des cornes; mais ces différences ne nous paroissent pas assez considérables pour en faire des espèces distinctes & séparées.

Le bubale est assez commun en Barbarie & dans toutes les parties

septentrionales de l'Afrique, il est à peu près du même naturel que les antilopes, il a comme elles le poil court, le cuir noir & la chair bonne à manger. On peut voir la description des parties intérieures de cet animal dans les Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, où M.<sup>rs</sup> de l'Académie des Sciences en ont fait l'exposition anatomique, avec leur exactitude ordinaire.





---

## LE CONDOMA.

**M.** le Marquis de Marigny, qui ne perd pas la plus petite occasion de favoriser les Sciences & les Arts, m'a fait voir dans son Cabinet la tête d'un animal, que je pris au premier coup-d'œil pour celle d'un grand Bubale, elle est semblable à celles de nos plus grands Cerfs : mais au lieu de porter un bois solide & plein comme celui des cerfs, elle est surmontée de deux grandes cornes creuses, portant arête comme celles des Boucs, & doublement fléchie comme celles des Antilopes. (*Voyez pl. XXXIX, fig. 1*). En cherchant au Cabinet du Roi les morceaux qui pouvoient être relatifs à cet animal, nous avons trouvé deux cornes qui lui appartiennent ; la première sans aucun indice ni étiquette, venoit du Garde-meuble de Sa Majesté ; la seconde (*pl. XXXIX, fig. 2*) m'a été donnée en 1760, par M. Baurhis, Commis de la Marine, sous le nom de

*Condoma* du cap de Bonne-espérance ; nous avons cru devoir adopter ce nom, l'animal qu'il désigne n'ayant jamais été dénommé ni décrit.

Par la longueur, la grosseur & surtout par la double flexion des cornes, le condoma nous paroît approcher beaucoup de l'animal que Cælius a donné sous le nom de *Strepsiceros* \* :

\* *Strepsicerotis cornua tam graphicè descripsit Flinius, atque hyris tam appositè comparavit, ut longiore verborum ambitu opus non sit. Ergo hoc tantum addam : ea esse intus cava, sed longa pedes Romanos duos palmos tres, si recto ductu metiaris : si flexo pro naturâ cornuum, pedes tres integros. Crassa sunt ubi capiti committuntur, digitos romanos tres cum semisse. Describuntur in ambitu palmis romanis duobus & dimidio, eo ipso in loco. In summo, levore quodam nigrescunt, cum in imo fusca magis & rugosa sint. Jam inde a primo ortu sensim gracilescent, & tandem in acutum exeunt. Pendenti intè cum facie sicca per longitudinem dimidiatâ, libras septem uncias tres & semissem. Facies, quæ adhuc superest juncta cornibus, & frontis cervicisque pilus, loquuntur Strepsicerotem animal esse magnitudinis ferè cervinâ, & pilo rufo ad instar cervini. Sed an nare & figura corporis cervina sit, ex facie nihil habeo certi dicere, cum nares diuturni temporis usu detritæ sint & facies eâdem de causâ hinc inde glabra sit, conjiceres tamen ex eo quod superest eum propius accedere ad cervum aut pluvycerotem. Cælius, apud Gesnerum, de quad. pag. 295.*

non-seulement la figure & les contours des cornes sont absolument les mêmes, mais toutes les dimensions se rapportent presque exactement ; & en comparant la description que M. Daubenton \* a faite de la tête du condoma avec celle du *strepsiceros* de Caius, il m'a paru qu'on pouvoit présumer que c'étoit le même animal, sur-tout en faisant précéder notre jugement des réflexions suivantes :  
 1.° Caius s'est trompé en donnant cet animal pour le *strepsiceros* des Anciens, cela me paroît évident, car le *strepsiceros* des Anciens est certainement l'*antilope*, dont la tête est très-différente de celle du cerf : or Caius convient, & même assure que son *strepsiceros* a la tête semblable à celle du cerf ; donc ce *strepsiceros* n'est pas celui des Anciens :  
 2.° l'animal de Caius a, comme le condoma, les cornes grosses & longues de plus de trois pieds, & couvertes de rugosités & non pas d'anneaux ou de tubercules, au lieu que le *strepsiceros* des Anciens, ou l'*antilope*, a les cornes non-seulement beaucoup moins grosses

\* Voyez ci-après la description du Condoma.

& plus courtes , mais aussi chargées d'anneaux & de tubercules très-apparens : 3.<sup>o</sup> quoique les cornes de la tête du condoma , qui est au Cabinet de M. le Marquis de Marigny , aient été usées & polies , & que la corne qui vient du Garde-meuble du Roi , ait même été travaillée à la surface ; on voit cependant qu'elles n'étoient point chargées d'anneaux , & cela nous a été démontré par celle que nous a donnée M. Baurhis , qui n'a point été touchée , & qui ne porte en effet que des rugosités , comme les cornes de bouc , & non pas des anneaux comme celles de l'antilope : or Caius dit lui-même , que les cornes de son strepsiceros ne portent que des rugosités ; donc ce strepsiceros n'est pas celui des Anciens , mais l'animal dont il est ici question , qui porte en effet tous les caractères que Caius donne au sien.

En recherchant dans les Voyageurs les notices qui pouvoient avoir rapport à cet animal remarquable par sa taille , & sur-tout par la grandeur de ses cornes , nous n'avons rien trouvé qui  
en

en approche de plus près que l'animal indiqué par Kolbe, sous le nom de *Chèvre sauvage*, du cap de Bonne-espérance. « Cette chèvre, dit-il, qui chez les Hottentots, n'a point reçu de nom, & que j'appelle *chèvre sauvage*, « est fort remarquable à plusieurs égards; « elle est de la taille d'un grand cerf, « sa tête est fort belle & ornée de deux « cornes unies, recourbées & pointues, « de trois pieds de long, dont les extré- « mités sont distantes de deux pieds »: ces caractères nous paroissent convenir parfaitement à l'animal dont il est ici question; mais il est vrai que n'en ayant vu que la tête, nous ne pouvons pas assurer que le reste de la description de Kolbe \* lui convienne également;

\* Depuis son front, tout le long du dos, on voit une raie blanche qui finit au-dessus de sa queue; une autre raie de même couleur coupe cette première au bas du cou, dont elle fait tout le tour; il y en a deux autres de même nature, l'une derrière les jambes de devant, & l'autre devant les jambes de derrière, elles font toutes deux le tour du corps; le poil dont le reste de son corps est couvert tire sur le gris avec quelques petites taches rouges, excepté celui qu'elle a sous le ventre, qui est blanc; sa barbe est grise & fort longue; ses

nous le présumons seulement comme une chose vraisemblable qui demande à être vérifiée par des observations ultérieures.

jambes, quoique longues, sont bien proportionnées. *Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe, tome III, page 42.*



## LE GUIB.

**L**E Guib est un animal qui n'a été indiqué par aucun Naturaliste, ni même par aucun Voyageur; cependant il est assez commun au Sénégal, d'où M. Adanson en a rapporté les dépouilles, & a bien voulu nous les donner pour le Cabinet du Roi; il ressemble aux gazelles, sur-tout au Nanguer, par la grandeur & la figure du corps, par la légèreté des jambes, par la forme de la tête & du museau, par les yeux, par les oreilles & par la longueur de la queue & le défaut de barbe; mais toutes les gazelles, & sur-tout les Nanguers, ont le ventre d'un beau blanc, au lieu que le guib a la poitrine & le ventre d'un brun-marron assez foncé; il diffère encore des gazelles par ses cornes qui sont lisses, sans anneaux transversaux, & qui portent deux arêtes longitudinales, l'une en dessus & l'autre en dessous, lesquelles forment un tour de spirale depuis la base jusqu'à la pointe;

Dij

elles sont aussi un peu comprimées, & par ces parties le guib approche plus de la chèvre que de la gazelle; néanmoins il n'est ni l'une ni l'autre, il est d'une espèce particulière qui nous paroît intermédiaire entre les deux; cet animal est remarquable par des bandes blanches sur un fond de poil brun-marron, ces bandes sont disposées sur le corps en long & en travers comme si c'étoit un harnois<sup>a</sup>. Il vit en société & se trouve par grandes troupes dans les plaines & les bois du pays de Podor; comme M. Adanson est le premier qui ait observé le guib, nous publions ici bien volontiers la description qu'il en a faite, & qu'il nous a communiquée<sup>b</sup>.

<sup>a</sup> Voyez ci-après la description du Guib, & la figure (pl. XL).

<sup>b</sup> Guib chez les Nègres Oualofes ou Jalofes. *Gazella cornibus rectis spiralibus; caput, rostrum, nasus, oculi uti Nanguer. Cornua recta spiralia, spirâ primâ nigra, nitida, subcompressa, angulis duobus lateralibus, anticè convexa, ponè plana, apice conico teretia. . . . . Aures uti Nanguer intus sabnudæ quinque pollices longæ. . . . . Cauda decem pollices longa, pilis longis hirta. Dentes duo & triginta, edis uti Nanguer. Corpus totum ferè fulvum. Albæ fasciæ sex utrinque in dorso transversæ, & fasciæ albæ*



*duæ longitudinales ventri laterales. Maculæ albæ utrinque octo ad decem supra femora, orbiculatæ. Collum subtus album & genæ albæ; latera pedum interiora alba, macula alba paulò infra oculos. Frons media nigra, linea supra dorsum longitudinalis nigra, venter subtus niger, pars antica pedum anteriorum, ungulæ & cornua nigra; longitudo ab apice rostri ad anum quatuor pedes cum dimidio; altitudo a pedibus posticis ad dorsum duos pedes octo pollices; pili omnes brevissimi, lucidi, vix unum pollicem longi corpori adpressi. Pulchrum animal a D. Andriot missum. Notice manuscrite, communiquée par M. Adanson, de l'Académie royale des Sciences.*



# LA GRIMME.

CET animal n'est connu des Naturalistes que sous le nom de *Chèvre de Grimm*<sup>a</sup>, & comme nous ignorons celui qu'il porte dans son pays natal, nous ne pouvons mieux faire que d'adopter cette dénomination précaire. On trouve une figure de cet animal dans les *Éphémérides d'Allemagne*<sup>b</sup>, qui a été copiée dans la collection Académique<sup>c</sup>; le Docteur Herman Grimm, est le seul avant nous qui en ait parlé, & ce qu'il en dit a été copié par Ray, & ensuite par tous ceux qui ont écrit sur la Nomenclature des animaux: quoique

<sup>a</sup> *Capra sylvestris Africana Grimmii*. Ray. *Syn. anim.* pag. 80.

*Tragulus in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens..... Tragulus Africanus*. Le chevrotain d'Afrique. Briss. *reg. anim.* pag. 97.

*Grimmia capra capite fasciculo tophoso, cavitare infra oculos*. Linn. *syst. nat.* Edit. X, pag. 70.

<sup>b</sup> *Ephem. Nat. Cur.* an. 14, obs. 57.

<sup>c</sup> *Collect. Académ.* tome III, pl. XXVI.

sa description soit incomplète \*, elle désigne deux caractères si marqués, que nous ne croyons pas nous méprendre en présentant ici pour la chèvre de Grimm la tête d'un animal du Sénégal, qui nous a été donnée par M. Adanson;

\* Sur une espèce de Chèvre sauvage d'Afrique, par le D.<sup>r</sup> Herman - Nicolas Grimm. J'ai vu en Afrique, dans un château près du cap de Bonne-espérance, une espèce de Chèvre sauvage fort singulière; sa couleur est cendrée, un peu obscure; elle a sur le sommet de la tête une touffe de poils droits & élevés, & entre chaque narine & l'œil une cavité dans laquelle il se fait un amas d'une humeur jaunâtre, grasse & visqueuse, qui se durcit & devient noire avec le temps, & dont l'odeur participe de celle du *Castoreum* & du *Musc*; lorsqu'on a enlevé cette matière, il s'en reproduit de nouvelle qui se durcit de même à l'air; & je me suis bien assuré que ces cavités n'avoient aucune communication avec les yeux, & que l'humeur épaissie qu'elles contenoient étoit différente de celle qui s'amasse dans le grand angle de l'œil des cerfs & de quelques autres animaux: cette matière a sans doute ses vertus & ses propriétés, qui doivent être fort différentes des larmes du cerf. *Éphémérides des curieux de la Nature*, decad. II, ann. 4, 1686, Obs. 57, Collection Académique. Dijon, 1755, tome III, page 696, fig. pl. XXVI. Nota. Le toupet élevé ou plutôt la longue gerbe de poil que l'on voit dans cette figure au-dessus de la tête de cet animal paroît exagérée par le dessinateur.

Le premier de ces caractères, est une énorme cavité au-dessous de chaque œil, laquelle forme de chaque côté du nez un enfoncement si grand dans la mâchoire supérieure, qu'il ne laisse qu'une lame d'os très-mince contre la cloison du nez; le second caractère, est un bouquet de poil bien fourni & dirigé en haut sur le sommet de la tête: ils suffisent pour distinguer la grimme de toutes les autres chèvres ou gazelles; elle ressemble cependant aux unes & aux autres, non-seulement par la forme du corps, mais même par les cornes, qui sont annelées vers la base & striées longitudinalement comme celles des autres gazelles, & en même temps dirigées horizontalement en arrière, & très-courtes comme celles de la petite chèvre d'Afrique, dont nous avons parlé. Au reste, cet animal étant plus petit que les chèvres, les gazelles, &c. & ne portant que des cornes très-courtes, nous paroît faire la nuance entre les chèvres & les chevrotains.

Il y a apparence que dans l'espèce de la grimme, le mâle seul porte des

cornes: car l'individu dont le D.<sup>r</sup> Grimm a donné la description & la figure, n'avoient point de cornes; & la tête que nous a donnée M. Adanson, porte au contraire deux cornes, à la vérité très-courtes & cachées dans le poil, mais cependant assez apparentes pour ne pouvoir échapper au dessinateur, & encore moins à l'observateur; d'ailleurs, on verra dans l'histoire des chevrotains, que dans celui de Guinée le mâle seul a des cornes, & c'est ce qui nous fait présumer qu'il en est de même dans l'espèce de la grimme qui à tous égards approche plus du chevrotain que d'aucun autre animal.



## LES CHEVROTAINS\*.

L'ON a donné en dernier lieu le nom de *Chevrotain*, (*Tragulus*) à de petits animaux des pays les plus chauds de l'Afrique & l'Asie, que les Voyageurs ont presque tous indiqués par la dénomination de *petit Cerf* ou *petite Biche*; en effet, les Chevrotains ressemblent en petit au Cerf, par la figure du museau, par la légèreté du corps, la courte queue & la forme des jambes, mais ils en diffèrent prodigieusement par la taille, les plus grands chevrotains n'étant tout au plus que de la grandeur du lièvre; d'ailleurs, ils n'ont point de bois sur la tête: les uns sont absolument sans cornes, & ceux qui en portent les ont creuses, annelées & assez semblables à celles des gazelles: leur petit

\* Le Chevrotain. *Tragulus*, en Latin moderne; *Guevei*, au Sénégal; selon les notices manuscrites, qui nous ont été communiquées par M. Adanson, le plus petit chevrotain s'appelle *Guevei-kaior*, parce qu'il vient de la province de *Kaior*, dans l'étendue de laquelle se trouve le Cap-verd & les terres adjacentes à ce Cap.

pied fourchu ressemble aussi beaucoup plus à celui de la gazelle qu'à celui du cerf, & ils s'éloignent également des cerfs & des gazelles, en ce qu'ils n'ont point de larmiers ou d'enfoncement au-dessous des yeux; par-là ils se rapprochent des chèvres: mais dans le réel ils ne sont ni cerfs, ni gazelles, ni chèvres, & font une ou plusieurs espèces à part: Seba \* donne la description & les

\* *Tabula quadragesima & tertia. Num. 1. Cerva parvula, Africana, ex Guineâ, rubida, sine cornibus. Licet admodum pusilla hæc sit, tamen suâ in specie maxima est; quum congneres ejus plerumque aliquantulum minores deprehendantur. Caput, magni cervi æmulum, cornibus tamen caret. Cursu saltuque velocissimæ sunt, longis gracilibusque pedibus, in binas ungulas, uti in magnis cervis, concinnè fissis, inixæ: neque vero calcaneum in parvam ungulam elongatur, uti in proceris, sed talus crassus & rotundus est. Pilus dorsi ex fusco rubet; ad ventrem & sub collo albicat. Cauda minus longa, & longis dispersisque pilis vestita ex fusco, rubro, & albo variegatis. Suffraginis postica facies in hæc dilutissimè spadicea est. Fœmellam hic representamus. Pabulum horum animalculorum cymæ sunt graminum, aliarumque herbarum. Altissimos autem montes conscendunt, difficillimè, nec nisi ope tendicularum, captandæ. Summas inter delicias ciborum, & pro ferinâ optimâ habentur; quo etiam nomine dignissimorum munerum administratoribus, illis in locis dono dantur.*

Num. 2. *Himulus, seu Cervus juvenens, pergra-*

figures de cinq chevrotains ; le premier ,

*cilis , Africanus. Salientis hic in gestu constitutus , tenui gracilique est corpore , atque articulis , instar canis venatici , priori congener , & concolor. Auriculæ mediocriter proluxæ sunt. Cauda , sursum recurvata , quasi crispata est. Maxilla inferior insignes dentes à primo ortu gerit. Pedes , tanquam res pretiosa , aurum circumclusi , loco pistillorum , ad Nicotianam in fistulas adigendam , usurpantur. Sub lit. A. ejusmodi repræsentatur.*

Num. 3. *Cervus juvenis , perpusillus , Guineensis. Minima hæc species est inter omnes , quas hæctenus hisce in oris videre licuit : quanquam in nostro musæo pedes minoris adhuc asservemus , prout lit. B. demonstrat. Dantur & aliæ species , quæ bina , nigricantia & acuminata cornicula gerunt ; cujusmodi , sub lit. C. exhibuimus. Quotannis novo annulo notantur cornicula , quorum è numero ætas animalculi supputatur : id , quod in bobus quoque obtinere , notissimum est. Summus Russorum Imperator , quando musæi mei perlustrandi gratiâ ad me invisere dignabatur , centum mihi aureos offerebat , si tam pusillum ipsi cervum procurare possem : sed votis excidi , quidquid impenderim operæ.*

Tabula quadragesima & quarta. Num. 2. *Cervula Surinamensis , subrubra albis maculis notata. Caput , pectus , abdomen , & pedes exceperis , quæ unicoloria sunt ; reliquum , ex rufo luteum , maculis albis undique tygridis in modum , variegatur ; auriculæ grandes , longæ ; cauda brevis , obtusa. Cursus rapiditate incredibili vel magnum cervum superat. Memorabile est , cervos Americanos adeo pusillos esse : quum dentur , leporem qui magnitudine hæud excedunt ; & omnium maxima species altero tanto circiter major sit , quam*



sous la dénomination de *petite Biche Africaine de Guinée*, rougeâtre sans cornes; le second, sous celle de *Fan* ou *jeune Cerf d'Afrique très-délié*; le troisième, sous le nom de *jeune Cerf très-petit de Guinée*; le quatrième, sous la dénomination de *petite Biche de Surinam*, rougeâtre & marquée de taches blanches; & le cinquième, sous celle de *Cerf d'Afrique à poil rouge*. De ces cinq chevrotains donnés par Seba, le premier, le second & le troisième sont évidemment le même animal, le cinquième, qui est plus grand que les trois premiers, & qui a le poil

*quæ hæc tabulâ representatur. Cornua vero nunquam gerunt, & pro sapidissimâ ferinâ habentur.*

*Tabula quadragesima & quinta. Num. 1. Cervus Africanus, pilo rubro. Parvus quidem est, at istâ tamen in specie cervorum maximus, quem hîc representamus, ex oris Guineæ oriundus. Egimus de his animalculis jam prægressis in tabellis. Interim ut, quantum licet, specierum exhiberetur varietas, hunc quoque æri curavimus incidi: siquidem & specie & pilo discreperet ab aliis. Pilus ei longior est, coloris ex fusco longè obscurioris, quam in præcedentibus. Pedes etiam & crura ejus longiora sunt, & concinnè admodum subrefacta. Cæterum cum prioribus convenit. Seba, vol. 1.<sup>a</sup> pag. 70 & 73.*

beaucoup plus long & d'un fauve plus foncé, ne nous paroît être qu'une variété de cette première espèce; le quatrième, que l'auteur indique comme un animal de Surinam, n'est encore, à notre avis, qu'une seconde variété de cette espèce, qui ne se trouve qu'en Afrique & dans les parties méridionales de l'Asie; & nous sommes très-portés à croire que Seba a été mal informé lorsqu'il a dit que cet animal venoit de Surinam: tous les Voyageurs font mention de ces petits cerfs ou chevrotains au Sénégal, en Guinée & aux grandes Indes; aucun ne dit les avoir vus en Amérique, & si le chevrotain à peau tachée dont parle Seba, venoit en effet de Surinam, on doit présumer qu'il y avoit été transporté de Guinée ou de quelque autre province méridionale de l'ancien continent: mais il paroît qu'il y a une seconde espèce de chevrotain réellement différente de tous ceux que nous venons d'indiquer, qui ne nous semblent être que de simples variétés de la première: ce second chevrotain porte de petites cornes qui

n'ont qu'un pouce de longueur & autant de circonférence; ces petites cornes sont creuses, noirâtres, un peu courbées, fort pointues & environnées à la base de trois ou quatre anneaux transversaux; nous avons au Cabinet du Roi les pieds de cet animal<sup>a</sup>, avec une de ses cornes, & ces parties suffisent pour démontrer que c'est ou un chevrotain ou une gazelle, beaucoup plus petite que les autres gazelles; Kolbe<sup>b</sup> en faisant mention de cette espèce de chevrotain a dit au hasard, que ses cornes étoient semblables à celles du cerf, & qu'elles ont des branches à

<sup>a</sup> Voyez ci-après la description du Chevrotain. Voyez aussi dans la note précédente le n.<sup>o</sup> 3.

<sup>b</sup> A Congo, à Viga, en Guinée, & dans d'autres endroits près du cap de Bonne-espérance, on trouve une espèce de chèvre à laquelle je donne le nom de *chèvre de Congo*; jamais elles ne sont plus grandes qu'un lièvre, mais elles sont d'une beauté & d'une symétrie admirables; leurs cornes sont semblables à celles du cerf, & ont aussi des branches à proportion de leur âge, elles ont les jambes fort jolies & si petites qu'on se sert souvent de la partie inférieure pour presser le tabac dans la pipe, dont la division est fort ferrée. On les monte en or ou en argent. *Description du cap de Bonne-espérance, par Kolbe, tome III, page 32.*

proportion de leur âge ; c'est une erreur évidente, & que la seule inspection de ces cornes suffit pour démontrer.

Ces animaux sont d'une figure élégante ; & très-bien proportionnés dans leur petite taille, ils font des sauts & des bonds prodigieux , mais apparemment ils ne peuvent courir long-temps , car les Indiens les prennent à la course \* ; les Nègres les chassent de même & les tuent à coups de bâton ou de petites zagaies , on les cherche beaucoup parce que la chair en est excellente à manger.

\* Les Habitans d'une petite île près Java , apportèrent des biches qui sont de la grosseur d'un lièvre , & que ces Indiens attrapent à la course. *Voyage de le Gentil*. Paris , 1725 , tome 111 , page 73 . . . . . idem , page 93. — En voici encore une sorte ; ce sont de petits animaux parfaitement jolis , avec de fort petites cornes noires & des pattes fort menues qui , à proportion de leur corps , sont passablement longues , mais si menues qu'il y en a qui ne passent point l'épaisseur du bout d'une pipe ; je vous en envoie une garnie d'or , &c.... Ces petits animaux sont extrêmement légers à la course & font des sauts surprenans , du moins pour de si petites bêtes : j'en ai vu , de ceux que nous avions pris , qui sautoient par-dessus une muraille de dix à douze pieds de haut. Les Nègres les nomment *les rois des cerfs*. *Voyage de Guinée* , par Bosman , page 252.

En comparant les témoignages des Voyageurs; il paroît 1.<sup>o</sup> que le chevrotain duquel nous donnons la figure (*pl. XLII*); & qui n'a point de cornes, est le chevrotain des Indes orientales; 2.<sup>o</sup> que celui qui a des cornes est le chevrotain du Sénégal, appelé *Guevei* par les naturels du pays; 3.<sup>o</sup> qu'il n'y a que le mâle du *Guevei* qui porte des cornes \*, & que la femelle, comme celle de la grimme, n'en porte point; 4.<sup>o</sup> que le chevrotain à peau marquetée de taches blanches, & que Seba dit

\* Au royaume d'Acara, sur la côte d'or en Guinée, on trouve des biches si petites qu'elles n'excèdent pas huit à neuf pouces de hauteur; leurs jambes ne sont pas plus grandes & plus grosses qu'un cure-dent de plume. Les mâles ont deux cornes renversées sur le cou, de deux ou trois pouces de longueur; elles sont sans branches ou andouillers, contournées, noires & luisantes comme du jayet. Rien n'est plus mignon, plus privé & plus caressant que ces petits animaux; mais ils sont d'une si grande délicatesse qu'ils ne peuvent souffrir la mer, & quelque soin que les Européens aient pris pour en apporter en Europe, il leur a été impossible d'y réussir. *Voyage de Desmarchais, tome I, page 31.* — Voyez aussi l'histoire générale des Voyages, par M. l'abbé Prevost, tome IV, page 75.

se trouver à Surinam, se trouve au contraire aux grandes Indes, & notamment à Ceylan \* où il s'appelle *Memina*: donc l'on doit conclure qu'il n'y a (du moins jusqu'à ce jour) que deux espèces de chevrotains, le *memina* ou chevrotain des Indes sans cornes, & le *guevei* ou chevrotain de Guinée à cornes; que les cinq chevrotains de Seba ne sont que des variétés du *memina*, & que le plus petit chevrotain qu'on appelle au Sénégal *guevei-kaïor*, n'est qu'une variété du *guevei*; au reste, tous ces petits animaux ne peuvent vivre que dans les climats excessivement chauds, ils sont d'une si grande délicatesse qu'on a beaucoup de peine à les transporter vivans en Europe, où ils ne peuvent subsister & périssent en peu de temps; ils sont doux, familiers & de la plus

<sup>b</sup> Il y a dans l'île de Ceylan un animal qui n'est pas plus gros qu'un lièvre & qu'on appelle *Memina*, mais qui ressemble parfaitement à un daim : il est gris tacheté de blanc, & la chair en est excellente à manger. *Relation de Ceylan*, par Robert Knox. Lyon, 1693, tome 1.<sup>er</sup> page 90. — Voyez aussi l'*histoire générale des Voyages*, par M. l'abbé Prevost, tome VIII, page 545.

jolie figure; ce sont les plus petits, sans aucune comparaison, des animaux à pied fourchu : à ce titre de pied fourchu, ils ne doivent produire qu'en petit nombre, & à cause de leur petitesse ils doivent au contraire produire en grand nombre à chaque portée. Nous demandons à ceux qui sont à portée de les observer de vouloir bien nous instruire sur ce fait; nous croyons qu'ils ne font qu'un ou deux petits à la fois, comme les gazelles, les chevreuils, &c ; mais peut-être produisent-ils plus souvent, car ils sont en très-grand nombre aux Indes, à Java, à Ceylan, au Sénégal, à Congo & dans tous les autres pays excessivement chauds, & il ne s'en trouve point en Amérique ni en aucune des contrées tempérées de l'ancien continent.



## LES MAZAMES.

**M**AZAME, dans la langue Mexicaine, étoit le nom du *Cerf*, ou plutôt le nom du genre entier des *Cerfs*, des *Daims* & des *Chevreaux*. Hernandès, Recchi & Fernandès, qui nous ont transmis ce nom, distinguoient deux espèces de Mazames, tous deux communs au Mexique & dans la nouvelle Espagne; le premier, & le plus grand auquel ils donnent le nom simple de *Mazame* \*, porte un bois semblable

\* De *Mazame* seu *Cervis*, cap. XIV.... *Hos* ( *Telethtlalmacame* scilicet & *Temamaçame* ) *ego prius computaverim inter Capreos ( quam inter Cervos )*.... *Mazames caprarum mediocrium, paulòve majori constant magnitudine; pilo teguntur cano & qui facile avellatur, fulvoque; sed lateribus & ventre candentibus*..... *Cornua gestant juxta exorium lata, ac in paucos parvosque reteres ac præacutos ramos divisa & sub eis oculos quarum imaginem exhibemus* ( fig. pag. 324 ) deinde in quodam damarum genere quas *Macutlchichiltic* aut *Temamaçame* appellant, brevissimis cornibus acutissimisque, coloris fulvi, fusci & infernè albi quarum quoque præstita est imago ( fig. pag. 325 ). *Nard. Ant. Recchus apud Hernandezium, lib. IX, caput. XIV, pag. 324 & 325.*



à celui du chevreuil d'Europe, c'est-à-dire, un bois de six à sept pouces de longueur, dont l'extrémité est divisée en deux pointes, & qui n'a qu'un seul andouiller à la partie moyenne du merain; le second qu'ils appellent *Temamaçame*, est plus petit que le mazame & ne porte qu'un bois simple & sans andouillers, comme celui d'un daguet: il nous paroît que ces deux animaux sont vraiment des chevreuils, dont le premier est absolument de la même espèce que le chevreuil d'Europe, & le second n'en est qu'une variété; il nous paroît aussi que ces chevreuils ou mazames & temamaçames du Mexique, sont les mêmes que le *Cuguacu-apara* \*

\* *Nota.* La figure que l'on trouve dans Pison; page 98, sous le nom de *Cuguacu-été* ressemble parfaitement à notre chevreuil, & il ne faut que la comparer avec celle du mazame de Recchi, pour reconnoître que c'est le même animal. Ce *cuguacu-été* de Pison a un bois; cependant Marcgrave qui ne donne pas la figure, dit qu'il n'a point de bois, & que c'est le *Cuguacu-apara* qui a un bois à trois andouillers. Il est vraisemblable que comme dans l'espèce du chevreuil la femelle n'a point de bois, l'un de ces animaux désignés par Marcgrave étoit la femelle de l'autre; la description que ces

& le *Cuguacu-été du Bresil*, & qu'à Cayenne le premier se nomme *Cariacou* ou *Biche des bois*, & le second *petit Cariacou* ou *Biche des Paletuviers*<sup>a</sup> : quoique personne avant nous n'ait rapproché ces rapports, nous ne présumons pas qu'il y eût eu sur cela ni difficultés, ni doutes; si Seba<sup>b</sup> ne s'étoit avisé de

Auteurs donnent de ces animaux ne permet pas de douter que ce ne soient des chevreuils absolument semblables aux chevreuils de l'Europe.

<sup>a</sup> *Cervus major corniculis brevissimis*, Biche des bois. *Cervus minor palustris corniculis brevissimis*, Biche des Paletuviers turnommée ainsi, parce qu'elle habite ordinairement dans les marécages parmi la vase & les mangles, autrement *paletuviers*. On appelle indifféremment dans ce pays (de Cayenne) *Biche*, & la femelle du cerf & le cerf même, quoiqu'il ait un bois sur la tête. *Barrère, Essai d'histoire naturelle de la France équinoxiale. Paris, 1741, pages 171 & 172.*

<sup>b</sup> *Tabula quadragesima secunda. Num. 3. Mazame seu Cervus cornutus, ex novâ Hispaniâ. Hæc species omnino differt ab illâ quam Guineæ profert. Capite & collo crassis curtisque est, & bina gerit rotata quasi cornicula, in acutum recurrumque apicem convergentia, retrorsum reclinata. Auriculæ grandes, flaccidæ : at oculi renusti. Cauda crassa, obtusa. Pilus totius corporis subrufus est, paulò tamen dilutior qui caput & ventrem tegit. Femora cum pedibus admodum habilia.*

Num. 4. *Cervus Macatlehichilitic sive Temama-*

donner sous les noms de *mazame* & de *temamaçame* deux animaux tous différens : ce ne sont plus des chevreuils à bois solide & branchu, ce sont des gazelles à cornes creuses & torfes : ce ne sont pas des animaux de la nouvelle

*çama dictus.* Horum ingens numerus per alta montium & rupium novæ Hispaniæ divagatur, qui gramine, foliis herbisque victitantes, cursu saltuque velocissimi sunt. Europæos cervos habitu referunt, sed instar hinnulorum, valde parvi. Cornua tornata, recurvatum in acumen convergunt, quæ singulis annis novâ spirâ aucta, ætatem animalis produunt. Cornuum color coracinus. Oculi auresque magni & agiles. Dentes prægrandes & laei. Cauda pilis longis obsita : brevioribus & dilutè spadicis universum corpus vestitur. Fr. Hernandezius, aliam prorsus horum ideam exhibet, putans veram hanc esse speciem capri cervarum, è quibus lap. bezoar acquiritur : quâ tamen de re diversa penitus percepinus. Notissimum est lapidem bezoar fortuitâ quâdam concretionem, in ventriculo animalium nasci, haud secus, ac in renibus & vesicâ hominum calculi generantur. Neque una duntaxat animantium species lapides hosce profert ; sed variæ cervorum, caprarum, hædulorum & aliorum, quorum in ventriculo plerumque isti concrescunt, nucleum seu basin, dante frustulo quodam ligni, straminis culmo aut lapillo ; quæ, si, non comminuta nec commansa deglutiuntur, in ventriculum delata, dissolvi nequeunt : his tunc ibi detentis circum accrescit calcaria quâdam crusta, sensim aucta ; donec à tunica ventriculi secedens lapis, itâ conflatus, cum excrementis per alvum exoneretur. Seba.

Espagne, quoique l'auteur les donne pour tels: ce sont au contraire des animaux d'Afrique, ces erreurs de Seba ont été adoptées par la plupart des Auteurs qui ont écrit depuis; ils n'ont pas douté que ces animaux, indiqués par Seba, sous les noms de *mazame* & de *temamaçame*, ne fussent des animaux d'Amérique, & les mêmes que ceux dont Hernandès, Recchi & Fernandès avoient fait mention; la confusion du nom a été suivie de la méprise sur la chose, & en conséquence les uns ont indiqué ces animaux sous le nom de *chevrotains*<sup>a</sup>, & les autres sous celui de *gazelles*<sup>b</sup> ou de *chèvres*; cependant, il paroît que M. Linnæus s'est douté de l'erreur, car il ne l'a point adoptée: il a

<sup>a</sup> *Tragulus*, *Temamaçame*. . . . *Tragulus*, *Mazame*. Klein, *de quadrup.* pag. 21.

<sup>b</sup> *Hircus cornibus teretibus, erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis*. . . . *Capra novæ Hispaniæ*. La chèvre de la nouvelle-Espagne. Brisson, *Regn. anim.* pag. 72. (Le Mazame de Seba). . . . *Hircus cornibus teretibus circa medium inflexis; ab origine ad flexuram spiraliter canaliculatis, à flexurâ ad apicem lævibus*. . . . *Gazella novæ Hispaniæ*. La gazelle de la Nouvelle-Espagne. Brisson, *Regn. anim.* pag. 70. (Le Temamaçame de Seba).

a mis le mazame dans la liste des cerfs, & a pensé comme nous, que ce mazame du Mexique \* est le même animal que le cuguacu du Bresil.

Pour démontrer ce que nous venons d'avancer, nous poserons en fait, qu'il n'y a ni gazelles, ni chevrotains dans la nouvelle Espagne, non plus que dans aucune autre partie de l'Amérique; qu'avant la découverte de ce nouveau monde, il n'y avoit pas plus de chèvres que de gazelles, & que toutes celles qui y sont à présent y ont été apportées de l'ancien continent; que le vrai mazame du Mexique est le même animal que le cuguacu-apara du Bresil; que le nom *cuguacu* se prononce *couguacou*, & que par corruption cet animal, s'appelle à Cayenne *cariatou*, d'où il nous a été envoyé vivant sous ce même nom *cariatou*, & nous en donnerons ici la description; ensuite, nous rechercherons

\* *Bezoarticus. Cervus cornibus ramosis teretibus rectis : ramis tribus. Mazama. Hernand. Mex. pag. 324 Cuguacu, &c. Maregrav. Bras. pag. 2. H. Bras. pag. 98. Ray, quad. pag. 90. Habitat America australi, Linn. Syst. nat. edit. x, p. 67.*

quelles peuvent être les espèces des deux animaux, donnés par Seba sous les faux noms de *mazame* & de *tema-maçame*; car pour détruire une erreur, il ne suffit pas de ne la pas adopter, il faut encore en constater la cause & en démontrer les effets.

Les gazelles & les chevrotains sont des animaux qui n'habitent que les pays les plus chauds de l'ancien continent; ils ne peuvent vivre dans les contrées tempérées, & encore moins dans les pays froids; ils n'ont donc pu, ni fréquenter les terres du Nord, ni passer d'un continent à l'autre par ces mêmes terres: aussi aucun Voyageur, aucun Historien du nouveau monde, n'a dit qu'il s'y trouvât nulle part des gazelles ou des chevrotains; les cerfs & les chevreuils sont au contraire des animaux des climats froids & tempérés: ils ont donc pu passer par les terres du Nord, & on les trouve en effet dans les deux continens. L'on a vu dans notre Histoire du Cerf \*, que le cerf

\* Voyez au volume XII de cette Histoire Naturelle, l'article du Daim, page 35.

du Canada est le même que celui d'Europe, qu'il est seulement plus petit, & qu'il n'y a que quelques légères variétés dans la forme du bois & la couleur du poil; nous pouvons même ajouter à ce que nous avons dit, qu'il y a en Amérique autant de variétés qu'en Europe parmi les cerfs, & que néanmoins ils sont tous de la même espèce: l'une de ces variétés dont nous avons donné la figure <sup>a</sup>, est le cerf de Corse plus petit & plus brun que le cerf commun: nous avons aussi parlé des cerfs & des biches blanches, & nous avons dit que cette couleur provenoit de leur état de domesticité; on les trouve en Amérique <sup>b</sup>, aussi-bien que

<sup>a</sup> Voyez le volume XI de cette Histoire Naturelle, page 189, planche XI.

<sup>b</sup> *Inter cervorum genera quæ apud novam hanc Hispaniam adhuc mihi videre licuit (præter candidos totos, quos reges Cervorum esse Indi sibi persuaserunt, nuncupantque a colore Yztac mazame, & vocatos Tiamacaz quemacatl) primi sunt quos vocant Aculliam, Hispanicis omnino similes formâ, magnitudine ac reliquâ naturâ; minores his apparent Quautht mazame, sed usque adeo a cæterorum timiditate alieni, ut vulnerati homines ipsos adoriantur ac sæpe numero interimant. hos sequuntur magnitudine Tlalhuicamazame, quæ*



nos cerfs communs & nos petits cerfs bruns; les Mexicains, qui élevoient ces cerfs blancs dans leurs parcs, les appelloient les *Rois des Cerfs*: mais une troisième variété dont nous n'avons pas fait mention, c'est celle du cerf d'Allemagne, communément appelé *Cerf des Ardennes*, *Brandhirts* par les Allemands; il est tout au moins aussi grand que nos plus grands cerfs de France; & il en diffère par des caractères assez marqués; il est d'un pelage plus foncé & moins noirâtre sur le ventre, & il a sur le cou & la gorge de longs poils comme le bouc, ce qui lui a fait donner par les Anciens <sup>a</sup> & les modernes <sup>b</sup> le

*formâ & moribus essent eis omnino similes, ni timidiores viderentur; Minimi omnium Temamaçame sunt. Nard. Ant. Recchus, apud Hernand, pag. 324 & 325.*

<sup>a</sup> *Eâdem est specie (Cervi scilicet) barbâ tantum & armorum villo distans quem Tragelaphon vocant; non alibi quam juxta Phasin amnem nascens. Plin. Hist. nat. lib. VIII, cap. XXXIII. Nota. Cette race de cerfs se trouve aujourd'hui dans les forêts d'Allemagne & de Bohême, comme elle se trouvoit du temps de Pline dans les terres qu'arrose le Phase.*

<sup>b</sup> *Agricola, tragelaphum interpretatur, germanicè dictam feram ein Brandhirse. Tragelaphus, inquit, & cervus in sylvis cubant. . . . Tragelaphus ex hirco*



nom de *Tragelaphe* ou *Bouc-cerf*. Les chevreuils se sont aussi trouvés en Amérique, & même en très-grand nombre; nous n'en connoissons en Europe que deux variétés, les roux & les bruns \*, ceux-ci sont plus petits que les premiers, mais ils se ressemblent à tous autres égards, & ils ont tous deux le bois branchu; le mazame du Mexique, le cuguacu-apara du Brésil & le cariacou ou biche des bois de Cayenne ressemblent

*Et cervo nomen invenit, nam hirci quidem instar videtur esse barbatus, quod ei villi nigri sunt in guttine & in armis longi; cervi verò gerit speciem; eo tamen multò est crassior & robustior. Cervinus etiam ipsi color insidet, sed nonnihil nigrescens, unde nomen Germanicum traxit. Veruntamen suprema dorfi pars cinerea est, ventris sub-nigra, non ut cervis candida, atque illius villi circa genitalia nigerrimi sunt. Cæteris non differunt uterque in nostris sylvis, quamquam plures tragelaphi in his quæ finitimæ sunt Boëmicis quam in aliis reperiuntur. Agricola apud Gesnerum. Hist. quad. pag. 296 & 297. — Aliorum cervi genus ignotius quod Græco nomine Tragelaphus dicitur. Friore (Cervi scilicet vulgaris) majus, pinguius, tum pilo densius & colore nigrius; unde Germanis à semiusti ligni colore, Brandhirtz nominatur; hoc in Misenæ salibus Boëmiæ vicinis capitur. Fabricius apud Gesnerum, pag. 297, cum Icone, pag. 296.*

\* Voyez dans le volume XII de cette Histoire Naturelle, l'article du Chevreuil, page 74.

en entier à nos chevreuils roux : il suffit d'en comparer les descriptions pour être convaincu que tous ces noms ne désignent que le même animal ; mais le temamaçame que nous croyons être le cuguacu-été du Bresil, le petit cariacou ou biche des Paletuviers de Cayenne pourroit être une variété différente de celles de l'Europe ; le temamaçame est plus petit, & a aussi le ventre plus blanc que le mazame, comme notre chevreuil brun a le ventre plus blanc & la taille plus petite que notre chevreuil roux : néanmoins il paroît en différer par le bois qui est simple & sans andouillers dans la figure qu'en a donnée Recchi : mais si l'on fait attention que dans nos chevreuils & nos cerfs, le bois est sans andouillers dans la première, & quelquefois même dans la seconde année de leur âge, on sera porté à croire que le temamaçame de Recchi étoit de cet âge, & que c'est par cette raison qu'il n'avoit qu'un bois simple & sans andouillers. Ces deux animaux ne nous paroissent donc être que de simples variétés dans l'espèce du chevreuil ; on pourra s'en convaincre

aisément en comparant les figures & les passages des Auteurs que nous venons de citer, avec la figure & la description que nous donnons ici du cariacou qui nous est venu de Cayenne, & que nous avons nourri en Bourgogne pendant quelques années; l'on verra, en insistant même sur les différences, qu'elles ne sont pas assez grandes pour séparer le cariacou de l'espèce du chevreuil.

Il nous reste maintenant à rechercher ce que sont réellement les deux animaux, donnés par Seba sous les faux noms de *mazame* & de *temamaçame*: la seule inspection des figures, indépendamment même de sa description, que nous avons citée dans les notes ci-dessus, démontre que ce sont des animaux du genre des chèvres ou des gazelles; & non pas de celui des cerfs ni des chevreuils; le défaut de barbe & la figure des cornes prouvent que ce ne sont pas des chèvres, mais des gazelles, & en comparant ces figures de Seba avec les gazelles que nous avons décrites, j'ai reconnu que son prétendu *temamaçame* de la nouvelle Espagne est le *Kob*

ou petite vache brune du Sénégal: la forme, la couleur & la grandeur des cornes est la même; la couleur du poit est aussi la même & diffère de celle des autres gazelles, en ce qu'elle n'est pas blanche, mais fauve sous le ventre comme sur les flancs; & à l'égard du prétendu *mazame*, quoiqu'il ressemble en général aux gazelles, il diffère cependant en particulier de toutes celles dont nous avons ci-devant fait l'énumération; mais nous avons trouvé dans le Cabinet de M. Adanson, où il a rassemblé les productions les plus rares du Sénégal, un animal empaillé que nous avons appelé *Nagor*, à cause de la ressemblance de ses cornes avec celles du nanguer \*: cet animal se trouve dans

\* *Capra à D. Andriot missa. Differt à nanguer. Longitudo ab apice rostri ad anum quatuor ferè pedum; ab ano ad pectus duo pedes cum dimidio. Altitudo a pedibus anticis ad dorsum duo pedes & tres pollices; a pedibus posticis duo pedes cum dimidio. Ventris longitudo inter pedes, pedem unum & tres pollices; ventris crassities decem pollices. Caput longum novem pollices; altum sex, latum quatuor cum dimidio. Cornua longa quinque pollices cum dimidio; lata unum pollicem cum dimidio. Apices cornuum distant sex pollicibus; aures longæ quinque pollicum; cornua basi 1 ad 2 annulis levibus*

les terres voisines de l'île de Gorée, d'où il fut envoyé à M. Adanson, par M. Andriot, & il a tous les caractères que Seba donne à son prétendu *mazame* : il est d'un roux pâle sur tout le corps, & n'a pas le ventre blanc comme les autres gazelles, il est grand comme un chevreuil; ses cornes n'ont pas six pouces de longueur, elles sont presque lisses, légèrement courbées & dirigées en avant, mais moins que celles du nan-guer : nous en donnons ici la figure (pl. XLVI); cet animal, donné par Seba, sous le nom de *mazame* ou *cerf d'Amérique*, est donc au contraire une chèvre ou gazelle de l'Afrique, que nous ajoutons ici sous le nom de *nagor* aux douze autres gazelles, dont nous avons ci-devant donné l'histoire & la description.

*cincta; color totus rufus. Pili mediocres, rigidi, lucidi, unum pollicem longi, corpori non adpressi.* Note manuscrite, jointe à l'animal empaillé, que M. Adanson nous a prêté pour le faire dessiner.



# DESCRIPTION

## DU GUIB.

**L**E Guib (*pl. XL*) est à peu près de la grandeur d'un Daim, il a le pied fourchu & des cornes creuses, qui ont quelque rapport à celles du Bouc & du Bélier; les oreilles sont grandes & la queue est courte, les jambes longues & menues indiquent que cet animal a beaucoup de légèreté; les cornes (*pl. XLI, fig. 1, qui représente la corne droite*) ont huit pouces & demi de longueur, & quatre pouces & demi de circonférence à la base: elles sont dirigées en arrière & un peu courbées en haut; leur couleur est brune ou noirâtre, elles ont deux arêtes longitudinales (*AB*) qui forment chacune un pas de spirale d'un bout à l'autre de la corne.

Le poil du guib (*pl. XL*) est de couleur fauve sur la tête, sur le cou, sur le dos, la croupe, les côtés du corps, l'épaule, le bras, la cuisse, la face externe de l'avant-bras, de la jambe & des canons, & sur la plus grande partie de la queue avec un mélange de blanc & de brun-marron, par bandes & par grandes & petites taches; il y a une tache de couleur de marron-brun au bas du front & le long de la partie postérieure du chanfrein, & une bande fort étroite de

même couleur, qui m'a paru s'étendre depuis le bas du front sur le dessus & le derrière de la tête, le long du cou, du dos, de la croupe, jusqu'au bout de la queue, dont les derniers poils sont aussi de couleur de marron-brun; cette bande étoit mêlée de poils blancs sur le dos, dans le guib qui a servi de sujet pour cette description; la peau étoit épilée dans plusieurs endroits de façon qu'il y avoit quelques interruptions dans la bande de couleur de marron-brun, qui va depuis le chanfrein tout le long du corps jusqu'au bout de la queue; la face externe de l'avant-bras & du canon de la jambe de devant est mêlée de fauve & de marron-brun; le dessous de la mâchoire inférieure est blanc, il y a une petite tache de même couleur au-dessous de l'œil, une grande au-dessus de la face antérieure du cou & une autre au-dessous: il y a aussi une ou deux petites taches blanches sur l'épaule, & quatorze ou même jusqu'à seize sur le bas des côtés de la croupe, sur le flanc & sur le haut de la cuisse; la partie postérieure du dos & des côtés du corps, & la croupe, sont traversées par cinq ou six bandes blanches; deux autres bandes de même couleur s'étendent longitudinalement, depuis l'épaule sur les côtés du corps, jusqu'auprès de la croupe & de la cuisse; la bande longitudinale supérieure est courbée en haut vers le garrot, croise une ou deux des bandes trans-



versales du dos, & aboutit à la seconde ou à la troisième; la bande longitudinale inférieure est aussi courbée par sa partie antérieure au-dessus de l'épaule & passe au-dessous d'une ou deux des premières bandes transversales du dos; on voit par l'incertitude du nombre des taches ou des bandes dont il s'agit, qu'il n'est pas exactement le même sur les deux côtés du corps, mais malgré cette irrégularité les bandes ressemblent beaucoup par leur situation aux courroies d'un harnois que l'animal auroit sur le corps; la poitrine & le ventre sont de couleur de marron-brun avec quelques teintes de fauve; la partie supérieure de la face interne du bras est blanche, l'inférieure a un mélange de brun-noirâtre & de fauve; la face interne de la jambe est en partie blanche & en partie fauve; la face interne des canons est blanche en entier; les boulets, le derrière du paturon & la couronne sont bruns-noirâtres, avec quelque mélange de fauve; le devant du paturon est blanc.





# DESCRIPTION

## DE LA GRIMME.

**J**E n'ai vu de la Grimme que les os de la tête (*pl. XLI, fig. 2 & 3*) avec une partie de la mâchoire inférieure, les cornes (*AA*), les oreilles (*BB, fig. 2*), quelques lambeaux de la peau de la tête (*fig. 2*), les canons & les pieds des quatre jambes : M. Adanson a rapporté du Sénégal toutes ces pièces, & il nous a dit qu'elles venoient de la plus petite des gazelles de ce pays ; cela prouve que l'on donne le nom de *Gazelle* à des animaux bien différens les uns des autres, car celui dont il s'agit, diffère beaucoup de la gazelle, du kevel, de la corine & de l'antilope, par la conformation de la tête ; il y a sur les côtés de la mâchoire supérieure entre les premières dents mâchelières & les os du nez, les orbites (*C, fig. 3*) & l'ouverture (*D*) des narines, un enfoncement (*E*) si grand & si profond que chacun des côtés de la mâchoire ne forme qu'une lame très-mince & transparente, placée contre la cloison du nez ; ces enfoncemens resserrent les arrière-narines & les réduisent à un très-petit espace : je ne connois aucun autre animal qui soit ainsi conformé ; l'os du front est aussi très-différent de celui

des gazelles, il a une convexité dans le milieu (*F*), les cornes sont placées à une assez grande distance au-delà des orbites & dirigées en arrière, elles n'ont qu'environ deux pouces & demi de longueur, & deux pouces huit lignes de circonférence à la base; elles sont un peu recourbées obliquement en haut & en dedans par l'extrémité: elles ont de petites stries qui s'étendent presque d'un bout à l'autre, quelques anneaux vers la base, & seulement des vestiges d'anneaux dans le milieu de leur longueur, elles sont noirâtres.


Il y a six dents mâchelières de chaque côté de chacune des mâchoires; l'extrémité de celle du dessous étoit brisée, il n'y restoit aucune des dents incisives.

Le poil du milieu du chanfrein, du front & du sommet de la tête avoit une couleur cendrée-brune, celui des côtés du chanfrein étoit roux: tout ce poil étoit ferme, celui du dessus de la tête formoit un toupet (*G*, *pl. XLI*, *fig. 2*) qui avoit un pouce & demi de longueur; les poils de la partie antérieure de ce toupet étoient dirigés obliquement en arrière, ceux de la partie postérieure étoient au contraire dirigés obliquement en avant, & ceux du milieu s'étendoient directement en haut; les canons & les pieds des quatre jambes avoient une couleur cendrée-brune; il n'y avoit point de brosse sur la partie supérieure de la face antérieure des jambes de devant, & je n'ai vu sur la face interne des

oreilles aucune trace de bandes blanches ,  
comme dans la gazelle , le kevel & la corine.

La grimme diffère de ces trois animaux  
par la grande étendue des enfoncemens des  
côtés de la mâchoire supérieure , par la forme  
du front , par la situation & la direction des  
cornes , le toupet du dessus de la tête , les  
couleurs du poil du chanfrein , du front ,  
du dessus de la tête , des canons & des  
pieds des quatre jambes ; je n'ai pas vu la  
peau qui recouvroit les enfoncemens de la  
mâchoire supérieure , ainsi je ne fais si elle  
formoit des larmiers , comme il y a lieu de  
le croire , par la conformation des os.

Il m'a paru que la grimme est un peu  
plus petite que le chevreuil & la gazelle.



DESCRIPTION  
DE LA PARTIE DU CABINET  
*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*

DU BUBALE,  
DU CONDOMA ET DU GUIB.

N.º MCLXXXV.

*Le squelette d'un Bubale.*

LE museau du squelette du Bubale (*pl. XXXVII*) est très-long & a peu de largeur, il est plus alongé que celui du Cheval, du Taureau, du Cerf, &c. Le crâne du Cerf, du Daim, du Chevreuil est saillant en arrière au-delà de l'os frontal; dans le taureau, l'occipital ne s'étend guère plus en arrière que le frontal; à cet égard le bubale a plus de rapport avec le taureau qu'avec le cerf, car son os frontal a plus de saillie en arrière que le reste du crâne, en supposant que le museau soit dirigé en avant; cette saillie de l'os frontal à l'endroit des apophyses qui portent les cornes, donne de la longueur au front & rend la distance qui est entre les cornes & les yeux plus grande que dans le cerf, les gazelles, &c; cette distance qui est

aussi fort grande dans le taureau, vient de ce que le crâne est en entier sous l'os frontal du bubale, à peu près comme celui du taureau; l'os du front est un peu convexe au-dessous des cornes & concave entre les orbites; il y a une cavité encore plus profonde au-devant de chaque orbite.

Les cornes (*pl. XXXVII & XXXVIII, fig. 1*) du squelette qui fait le sujet de cette description, ne sont qu'à dix lignes de distance l'une de l'autre par la base; leur partie inférieure est dirigée obliquement en dehors & en haut, ensuite elles se courbent en haut, & enfin elles se recourbent en arrière; ces cornes sont brunes, elles ont des anneaux saillans & transversaux plus ou moins gros, & de petites cannelures longitudinales, excepté à la pointe qui est presque lisse; on n'y aperçoit que quelques vestiges de cannelures longitudinales.

Les dents incisives sont au nombre de huit à la mâchoire supérieure, elles ont toutes été cassées, il y a six dents mâchelières de chaque côté de chacune des mâchoires, la première du dessous m'a paru plus petite que dans le cerf & le taureau.

Les vertèbres cervicales, sont à proportion moins longues que celles du cerf, & à peu près de même longueur que celle du taureau; la troisième, la quatrième & la cinquième vertèbre ont l'apophyse épineuse plus longue que dans le cerf.

Les vertèbres dorsales, les côtes, les os du sternum & les fausses vertèbres du sacrum sont en même nombre que dans le taureau & le cerf; les côtes sont moins larges que celles du taureau, elles ressemblent plus à celles du cerf.

Les fausses vertèbres de la queue manquent dans le squelette dont il s'agit; les os des jambes ressemblent beaucoup plus à ceux du cerf qu'à ceux du taureau, sur-tout par leurs dimensions, comme on peut le voir dans la table suivante.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'entre-deux des cornes.....	1.	3.	8.
Largeur du museau.....	"	1.	11.
Largeur de la tête prise à l'endroit des orbites.....	"	4.	10.
Longueur de la mâchoire inférieure depuis l'extrémité des dents incisives jusqu'au contour de ses branches..	"	10.	7.
Longueur de la mâchoire inférieure au-delà des dents incisives.....	"	1.	5.
Largeur à l'endroit des barres.....	"	"	11.
Hauteur des branches de la mâchoire inférieure jusqu'à l'apophyse condyloïde.....	"	3.	11.
Hauteur jusqu'à l'apophyse coronoïde.	"	5.	7.
Largeur à l'endroit du contour des branches.....	"	2.	7.

	pieds.	pouc.	lign.
Largeur des branches au-deffous de la grande échancrure.....	"	1.	9.
Épaisseur de la partie antérieure de l'os de la mâchoire du dessus....	"	"	1.
Largeur de cette mâchoire à l'endroit des barres.....	"	1.	10.
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	"	6.	11.
Longueur de cette ouverture.....	"	3.	3.
Largeur.....	"	1.	6.
Longueur des os propres du nez....	"	7.	2.
Largeur.....	"	"	6.
Largeur des orbites.....	"	2.	"
Hauteur.....	"	1.	7.
Longueur des cornes.....	1.	"	"
Circonférence à la base.....	"	7.	6.
Distance entre les dents incisives & les mâchelières.....	"	3.	8.
Longueur de la partie de la mâchoire supérieure, qui est au-devant des dents mâchelières.....	"	4.	6.
Longueur des plus grosses de ces dents au dehors de l'os.....	"	"	7.
Largeur.....	"	1.	1.
Épaisseur.....	"	"	5.
Longueur du trou de la première vertèbre de haut en bas.....	"	"	7.
Longueur d'un côté à l'autre.....	"	1.	1½.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur des apophyses transverses de devant en arrière.....	2.	10.	1.
Longueur du corps de la seconde ver- tèbre.....	2.	8.	1.
Hauteur de l'apophyse épineuse.....	1.	1.	1.
Largeur.....	2.	5.	1.
Hauteur de la plus longue apophyse épineuse, qui est celle de la sep- tième vertèbre.....	1.	8.	1.
Longueur de la portion de la colonne vertébrale, qui est composée des vertèbres dorsales.....	1.	7.	1.
Hauteur de l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre, qui est la plus longue.....	6.	3.	1.
Largeur de celle de la dernière, qui est la plus large.....	1.	1.	1.
Longueur du corps de la dernière vertèbre, qui est la plus longue..	1.	3.	1.
Longueur du corps de la première, qui est la plus courte.....	1.	1.	1.
Longueur des premières côtes.....	6.	4.	1.
Hauteur du triangle qu'elles forment.	3.	9.	1.
Largeur à l'endroit le plus large.....	2.	2.	1.
Longueur de la huitième côte, qui est la plus longue.....	1.	2.	1.
Longueur de la dernière des fausses côtes, qui est la plus courte.....	9.	6.	1.
Largeur de la côte la plus large.....	1.	1.	1.
Largeur de la plus étroite.....	1.	1.	3.



	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du sternum.....	"	11.	4.
Largeur du sixième os qui est le plus large.....	"	2.	2.
Largeur du premier os, qui est le plus étroit.....	"	"	9.
Largeur de l'apophyse épineuse de la troisième vertèbre lombaire, qui est la plus large.....	"	1.	5.
Largeur de celle de la dernière, qui est la plus étroite.....	"	"	9.
Longueur de l'apophyse transverse de la quatrième vertèbre lombaire qui est la plus longue.....	"	2.	2.
Longueur du corps de l'avant-dernière vertèbre lombaire.....	"	1.	5.
Longueur de l'os sacrum.....	"	4.	3.
Largeur de la partie antérieure....	"	4.	7.
Largeur de la partie postérieure....	"	1.	3.
Longueur du côté supérieur de l'os de la hanche.....	"	3.	11,
Hauteur de l'os depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'au-dessus de l'os.....	"	6.	"
Largeur au-dessus de la cavité cotyloïde.....	"	"	10.
Diamètre de cette cavité.....	"	1.	4.
Longueur de la gouttière depuis les trous ovalaires jusqu'à son extrémité postérieure.....	"	1.	5.
Largeur dans le milieu.....	"	3.	6.

	pieds.	pouc.	lign.
Profondeur de la gouttière.....	#	1.	1.
Longueur des trous ovalaires.....	#	2.	2 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	#	1.	7.
Largeur du bassin.....	#	3.	9.
Hauteur.....	#	5.	#
Longueur de l'omoplate.....	#	9.	3.
Longueur de la base.....	#	4.	10.
Longueur du côté postérieur.....	#	8.	11.
Longueur du côté antérieur.....	#	8.	9.
Largeur de l'omoplate à l'endroit le plus étroit.....	#	1.	2.
Hauteur de l'épine à l'endroit le plus élevé.....	#	1.	#
Diamètre de la cavité glénoïde....	#	1.	2.
Longueur de l'humérus.....	#	7.	6.
Circonférence à l'endroit le plus petit.	#	2.	9.
Longueur de l'os du coude.....	#	11.	6.
Épaisseur à l'endroit le plus épais...	#	#	10.
Hauteur de l'olécrane.....	#	2.	5.
Longueur de l'os du rayon.....	#	9.	6.
Largeur du milieu de l'os.....	#	#	11.
Longueur du fémur.....	#	9.	1.
Diamètre de la tête.....	#	1.	1.
Circonférence du milieu de l'os....	#	2.	10.
Longueur des rotules.....	#	1.	4.
Largeur.....	#	1.	5.
Épaisseur.....	#	#	10.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du tibia.....	"	10.	9.
Circonférence du milieu de l'os....	"	2.	9.
Hauteur du carpe.....	"	1.	1.
Longueur du calcaneum.....	"	3.	5.
Hauteur de l'os cunéiforme & du scaphoïde pris ensemble.....	"	"	8.
Longueur des canons des jambes de devant.....	"	7.	9.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	8.
Longueur des canons des jambes de derrière.....	"	7.	6.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	7.
Longueur des os des premières pha- langes.....	"	2.	17
Longueur des os des secondes pha- langes.....	"	1.	"
Longueur des os des troisièmes pha- langes.....	"	1.	8.

N.º M C L X X X V I.

*Une tête de Bubale.*

Cette tête (*pl. XXXVIII, fig. 2*) est plus grosse que celle (*fig. 1*) du squelette rapporté sous le numéro précédent, & les cornes de la tête dont il s'agit, sont à proportion encore plus grandes que celles de ce squelette; il n'y a que quatre lignes de distance entre leurs extrémités inférieures; elles ne diffèrent des cornes du squelette,

qu'en ce qu'elles ont une couleur noire, & que leurs anneaux sont en proportion beaucoup plus gros sur la partie antérieure que sur la postérieure; les os du nez ne s'étendent pas aussi haut que dans la tête du squelette: ces différences ne paroissent pas suffisantes pour faire attribuer ces deux têtes à des animaux de diverses espèces, celle du présent numéro vient peut-être d'un mâle & l'autre d'une femelle de même espèce; il n'y a pas lieu de croire qu'une différence d'âge ait pu causer celle de la grandeur des cornes; car le squelette qui a les cornes les moins grandes est adulte, on n'y voit pas les joints des épiphyses.

	pieds.	pouc.	lignes.
Largeur de la tête prise à l'endroit des orbites.....	5.	5.	5.
Distance entre les orbites & l'ouver- ture des narines.....	4.	7.	4.
Longueur des os propres du nez....	9.	9.	9.
Largeur.....	9.	9.	9.
Largeur des orbites.....	2.	3.	3.
Hauteur.....	1.	8.	8.
Longueur des cornes.....	1.	7.	3.
Circonférence à la base.....	10.	7.	7.

## N.º MCLXXXVII.

*Cornes de bubale.*

Ces cornes tiennent à une portion de l'os  
du

du front, elles sont presque aussi grandes que les précédentes, & n'en diffèrent que par leur direction, leur extrémité n'est pas recourbée en arrière.

## N.º MCLXXXVIII.

### *Une corne de Condoma.*

Cette corne (*pl. XXXIX, fig. 2*) est torse; elle décrit par sa courbure environ un pas & demi de spirale fort alongée, elle a deux pieds & demi de longueur mesurée en ligne droite, trois pieds huit pouces en suivant ses courbures, & neuf pouces & demi de circonférence à la base; elle a une arête qui s'étend sur toute sa longueur: le reste de la circonférence est arrondi, excepté à quelque distance au-dessous de la pointe, où il y a deux arêtes & une face plate entre-deux; la couleur de cette corne est grise: on voit sur sa surface des rides transversales & onduoyantes, qui commencent de chaque côté de l'arête longitudinale, & qui forment sur le côté opposé à celui de l'arête un angle dont le sommet est dirigé en bas; cette corne est creuse & de même substance que celle du saureau, du bouc, du béliet, &c; par sa forme elle ressemble plus aux cornes des boucs qu'à celles d'aucun autre animal; il y a au Cabinet un squelette de chèvre d'Angora, dont les cornes ne diffèrent de la corne de condoma dont il s'agit, qu'en ce qu'elles

sont moins renflées & beaucoup plus petites; elles ont des courbures & des arêtes semblables aux courbures spirales & aux arêtes de cette corne.

Il y a dans la belle collection de morceaux choisis que fait M. le Marquis de Marigny, pour joindre l'étude de la Nature à la connoissance des beaux Arts, une tête entière (*pl. XXXIX, fig. 1*) de condoma avec des cornes semblables à celle dont il est question, on dit qu'elle a été apportée du Thibet; le museau est plus large que celui du bouc, & l'ouverture des narines beaucoup plus courte; il y a des enfoncemens sur l'os du front, & l'extrémité antérieure des os propres du nez est échancrée autrement que dans le bouc; la tête du condoma ne diffère pas moins de celles des béliers, des gazelles, des buffles & des bœufs; il m'a paru que le museau & l'os du front de cette tête ont plus de rapport avec le museau & le front des cerfs, des daims & des chevreuils, quoique l'ouverture des narines soit encore à proportion plus courte; mais il n'y a point d'enfoncement au-devant des orbites des yeux, comme dans ces animaux, ni aucuns vestiges de crochets à la mâchoire du dessus comme dans le cerf; les dents molaires de la tête du condoma dont il s'agit, ont été brisées: les cornes ont jusqu'à deux pieds dix ou onze pouces de longueur prise en ligne droite, trois pieds onze pouces en suivant les cour-

bures, & huit pouces & demi de circonférence à la base; ces cornes sont entières & pointues à l'extrémité, mais elles ont été polies; leur couleur est mêlée de teintes noirâtres, livides & blanchâtres; il y a des ondes transversales, noirâtres & correspondantes aux ondes creuses, qui subsistoient avant que ces cornes eussent été polies; la grande arête longitudinale s'étend depuis leur base sur la plus grande partie de leur longueur & disparoît à cinq pouces au-dessous de leur extrémité; la seconde arête est longue de quatre ou cinq pouces, elle finit à la même hauteur que la grande.

pieds. pouc. liges

Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'entre-deux des cornes.....	1.	"	"
Largeur du bout du museau.....	"	2.	8.
Largeur de la tête prise à l'endroit des orbites.....	"	6.	4.
Largeur de la mâchoire supérieure à l'endroit des barres.....	"	3.	2.
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines.....	"	5.	3.
Longueur de cette ouverture.....	"	2.	10.
Largeur.....	"	1.	11.
Largeur des orbites.....	"	2.	6.
Hauteur.....	"	2.	"

## N.º MCLXXXIX.

*Autre corne de condoma.*

Cette corne a été polie, elle est de couleur brune-jaunâtre, elle a deux pieds un pouce de longueur mesurée en ligne droite, & deux pieds dix pouces en suivant ses courbures, elle est tronquée par les deux bouts, le plus gros a huit pouces & demi de circonférence, & le plus petit seulement trois pouces, l'intérieur est creux dans toute la longueur de la corne, parce qu'elle a été coupée au-dessous de la partie solide qui la terminoit; on a aussi ouvert la cavité au petit bout de la corne pour en faire un cornet à bouquin.


## N.º MCXC.


*Les cornes du guib.*

Ces cornes tiennent à l'os frontal & à la peau de l'animal, qui a été en partie détruite; leur description a été faite avec celle du guib.





















ve del.

P. F. Tardieu Sculp.

LE GUIB.





Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 1.





## DESCRIPTION DU CHEVROTAIN.

**L**E Chevrotain est le plus petit des animaux à pied fourchu, au moins de tous ceux que nous connoissons, il n'a guère plus d'un pied de longueur depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue; la couleur fauve de son poil, ses jambes longues & déliées, sa queue courte & un air de légèreté dans ses proportions, l'ont fait comparer au Cerf, & lui en ont aussi fait donner le nom; la grande différence qui est entre la taille de ces deux animaux, a rendu le chevrotain plus remarquable qu'il ne l'auroit été, s'il s'étoit trouvé plus gros; on est surpris d'y voir un grand cerf en raccourci, un cerf adulte qui est aussi petit que l'embryon de notre cerf: mais pour peu que l'on observe le chevrotain, on reconnoît aisément qu'il est d'une espèce bien différente de celle du cerf.

Le museau a peu de largeur; le nez est aussi avancé que la lèvre supérieure, comme celui du cerf, du daim, du chevreuil, & non pas reculé en arrière, comme le nez des boucs, des béliers & des gazelles; le museau a peu de largeur, les yeux sont grands, les jambes de derrière ont plus de longueur que celles de devant, parce qu'elles ont les

canons beaucoup plus longs ; le chevrotain n'a point de larmiers , comme les cerfs , les gazelles , &c ; mais il y a entre les secondes phalanges des doigts , & principalement de ceux de derrière un petit trou peu profond : ainsi la conformation du pied ressemble en quelque manière à celle du pied des gazelles ; je n'ai point trouvé de brosses sur les jambes de devant , ni sur celles de derrière d'un jeune chevrotain , conservé dans l'esprit de vin , ni sur la peau bourrée de deux adultes , qui sont les seuls que j'aie vus.

Le bout du museau du jeune chevrotain (*pl. XLII*), le dessus & les côtés de la tête, du cou , de la poitrine & du corps , la croupe , le côté postérieur de la queue , la face externe des oreilles , l'épaule , le bras , la face externe de l'avant-bras , de la jambe & de la cuisse , une partie de la face interne de la jambe , les canons & les pieds de devant , la partie postérieure , & les côtés des canons & des pieds de derrière avoient différentes teintes de fauve ou de roux ; le dessus du chanfrein , de la tête , du cou & du corps étoit d'un roux sombre & mêlé de brun ; le roux des jambes & des côtés de la tête , du cou & du corps étoit plus clair & presque fauve ; le dessous de la mâchoire inférieure , la gorge , le dessous de la poitrine , le ventre , une partie de la face interne de la jambe & de l'avant-bras , la partie antérieure des canons & des pieds de derrière , & le côté antérieur de la

queue avoient une couleur blanchâtre, le dessous du cou étoit en partie de cette couleur & en partie de couleur fauve; ce jeune chevrotain avoit les dents incisives bien formées & les mâchoières commençoient à paroître; ses dimensions sont rapportées dans la table suivante.

pieds. pouc. lignes

Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	8.	
Longueur de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	2.	3.
Circonférence du museau, prise derrière les naseaux.....	1.	8.
Contour de la bouche.....	1.	8.
Distance entre les naseaux en bas....		2.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.....		5.
Distance entre les deux paupières lorsqu'elles sont ouvertes.....		3.
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres.....	1.	
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....		8.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite....		9.
La même distance en suivant la courbure du chanfrein.....	1.	1.
Circonférence prise entre les yeux & les oreilles.....	4.	
Longueur des oreilles.....	1.	1.

	pieds.	pouces.	lignes.
Largeur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	1	1	11
Distance entre les deux oreilles, prise au bas.....	1	1	9
Longueur du cou.....	1	2	2
Circonférence près de la tête.....	2	4	4
Circonférence près des épaules.....	3	9	9
Hauteur.....	1	1	1
Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant.....	4	2	2
Longueur du tronçon de la queue..	1	1	1
Circonférence à son origine.....	1	1	6
Longueur du bras depuis le coude jusqu'au genou.....	1	7	7
Circonférence à l'endroit le plus gros.	1	6	6
Circonférence du genou.....	1	1	1
Longueur du canon.....	1	4	4
Circonférence à l'endroit le plus mince.	1	1	8
Circonférence du boulet.....	1	1	1
Longueur du paturon.....	1	4	4
Circonférence du paturon.....	1	1	1
Circonférence de la couronne.....	1	1	11
Hauteur depuis le bas du pied jusqu'au genou.....	2	2	2
Distance depuis le coude jusqu'au garrot.....	1	4	4
Distance depuis le coude jusqu'au bas du pied.....	3	8	8

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur de la cuisse depuis la rotule jusqu'au jarret. ....	"	2.	3.
Circonférence près du ventre. ....	"	2.	3.
Longueur du canon depuis le jarret jusqu'au boulet. ....	"	2.	4.
Circonférence. ....	"	"	9.
Hauteur des sabots. ....	"	"	4.
Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans les pieds de devant. ....	"	"	4.
Longueur dans les pieds de derrière. "	"	"	4.
Largeur des deux sabots pris ensemble dans les pieds de devant. ....	"	"	3.
Largeur dans les pieds de derrière. .	"	"	3.
Distance entre les deux sabots. ....	"	"	1.
Circonférence des deux sabots réunis, prise sur les pieds de devant. ....	"	"	10.
Circonférence prise sur les pieds de derrière. ....	"	"	11.

Les chevrotains adultes, dont j'ai fait mention, avoient bien moins de fauve & de roux que le jeune chevrotain que j'ai décrit; le brun étoit le plus apparent sur le dessus de la tête, du cou & du corps, il y avoit deux bandes longitudinales de couleur rousse, mêlée de brun sur le dessous du cou entre des bandes blanches, une bande transversale de même couleur au-devant de la poitrine, & une bande fauve qui s'étendoit le long de la poitrine & du ventre; au reste toutes les

parties qui avoient une couleur blanchâtre sur le jeune chevrotain étoient d'un beau blanc sur les adultes, excepté les jambes, qui n'avoient presque plus de poil; les peaux bourrées de ces chevrotains étoient raccornies & déformées par le desséchement: cependant pour donner une idée de la taille de cet animal, & des proportions de ses principales parties, je vais rapporter quelques dimensions prises sur ces peaux qui n'ont pas été détachées des os de la tête & des jambes.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	1.	"	6.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	3.	6.
Contour de la bouche.....	"	2.	8.
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres.....	"	1.	8.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	"	"	9.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite..	"	1.	"
La même distance en suivant la courbure du chanfrein.....	"	1.	4.
Circonférence prise entre les yeux & les oreilles.....	"	5.	2.
Longueur du tronçon de la queue..	"	1.	8.
Longueur du bras depuis le coude jusqu'au genou.....	"	2.	6.



pieds: pouc. lign.

Circonférence du genou.....	"	1.	1.
Longueur du canon des jambes de devant.....	"	1.	7.
Circonférence à l'endroit le plus mince.	" "	8.	
Longueur du canon des jambes de derrière.....	"	3.	"
Circonférence.....	" "	2.	

Le chevrotain a dans la mâchoire inférieure huit dents incisives (*AB*, pl. *XLIII*, fig. 1) qui ressemblent à celles du cerf, du daim, du chevreuil & des gazelles, en ce que les dents du milieu (*A*) ont beaucoup plus de largeur que les autres (*B*) à leur extrémité; la seconde & la troisième dent sont fort étroites, la dernière (*B*) n'est guère plus large; la mâchoire supérieure n'a point de dents incisives, mais elle a deux dents canines (*CD*) très-longues, aplaties sur les côtés, dirigées obliquement en bas & en dehors, & recourbées en arrière; elles ont jusqu'à six lignes de longueur au dehors de l'os, quoique leurs extrémités aient été cassées, une ligne un tiers de largeur, & deux tiers de ligne d'épaisseur; elles sortent hors de la bouche: ces dents correspondent aux crochets du cerf par leur situation, mais elles en diffèrent par leur forme, il n'y a que quatre dents mâchelières de chaque côté de chacune des mâchoires, ce nombre est moindre que celui des dents mâchelières des

autres animaux à pied fourchu, celles du chevrotain en diffèrent aussi beaucoup par la figure : la première du dessus & les deux premières (*EF*) du dessous ressemblent plus à celles d'un animal carnassier, tel que le chien, le chat, le lion, le tigre, &c. qu'à celle des animaux à pied fourchu ; l'avant-dernière de la mâchoire du dessous a trois rangs de pointes, & plus de longueur prise de devant en arrière que la dernière, au contraire de ce qui se trouve dans presque tous les animaux dont le pied est fourchu : cependant le chevrotain a, comme ces animaux, les dents mâchelières revêtues d'un tartre noirâtre avec des teintes luisantes de couleur de bronze doré ou de certaines pyrites.





e Seve inv.

LE CHEVROTAIN

Baron Sculp.




Fig. 1




Fig. 2.



Fig. 3



Fig. 4.



Fig. 5



Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



## DESCRIPTION DU CARIACOU.

**L**E Cariacou (*pl. XLIV*) a beaucoup de rapport avec le Daim, le Cerf & le Chevreuil; mais il a paru qu'il ressembloit plus au daim qu'aux deux autres, autant qu'il a été possible d'en juger par l'individu qui a servi de sujet pour cette description, & qui étoit femelle. Le bois du mâle, comparé à celui du cerf, du daim & du chevreuil, auroit sans doute donné des indices plus assurés; ce cariacou femelle étoit, comme la daine, de taille moyenne entre celle de la biche & de la chevrette; elle avoit le museau plus effilé que celui de la biche, plus long que celui de la chevrette, & à peu près de même forme que celui de la daine; les oreilles à peu près de même longueur que celles de cet animal, & plus courtes que celles de la biche & de la chevrette; les jambes étoient moins longues & un peu plus minces que celles de la biche, & à peu près de la même longueur & de la même grosseur que celles de la daine, & de même longueur, mais moins effilées que les jambes de la chevrette; l'encolure étoit moins relevée que celle de la biche, & presque aussi longue que celle de la daine & de la chevrette; la queue étoit plus

longue que celle de la biche, & presqu'aussi longue que celle de la daine; le corps étoit plus étoffé que celui de la chevrette, &c. Cette femelle de cariacou n'avoit pas des larmiers profonds comme ceux de la biche & de la daine; mais ils étoient seulement marqués par une petite concavité dégarnie de poil qui ne se trouve point sur la chevrette.

Le tour du nez, la partie antérieure de chaque côté de la lèvre du dessus étoient noirs, & il y avoit une tache de cette même couleur sur le milieu de chacun des côtés de la lèvre du dessous; le chanfrein, le sommet de la tête, l'occiput, la face extérieure des oreilles, le dessus du cou, le garrot, le dos & la croupe étoient de couleur brune-noirâtre, lorsqu'on ne les voyoit que de loin; mais en les regardant de près, on y distinguoit autant de fauve que de noirâtre; l'extrémité de chaque poil étoit noirâtre; il y avoit du fauve au-dessous de ce noir, & plus bas une couleur cendrée-brune qui devenoit plus claire, & même grise près de la racine des poils; les côtés de la tête, les côtés & le dessous du cou, les épaules, la face extérieure du bras, les côtés du corps, la face extérieure de la cuisse & de la jambe proprement dite, & les canons de la jambe de derrière étoient de couleur fauve; le dedans de l'oreille, le dessous de la mâchoire inférieure, l'aisselle, la face intérieure du bras, le canon des jambes de devant, la face in-



érieure de la jambe proprement dite & les quatre pieds, étoient de couleur mêlée de blanc & de fauve. La partie postérieure de la poitrine, le ventre, les aines, la face intérieure de la cuisse, les fesses & le dessous de la queue étoient blancs; le dessus de la queue avoit une couleur fauve mêlée de brun sur la plus grande partie de sa longueur; la pointe étoit blanche, & il y avoit du noir entre le blanc & le fauve mêlé de brun. Le plus long poil de l'animal étoit sur la queue & avoit quatre pouces de longueur, celui du dos n'étoit long que d'environ deux pouces.

Il y avoit sur la face interne des talons une brosse formée par un poil blanc, & il se trouvoit sur la partie moyenne inférieure de la face externe du canon de la jambe de derrière un lichen noirâtre, long de neuf lignes, fort étroit & entouré par des poils blancs & longs qui paroissoient former aussi une sorte de brosse.

	pieds, pouc. lign.		
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	3.	11.	"
Hauteur du train de devant.....	2.	3.	6.
Hauteur du train de derrière.....	2.	5.	"
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	9.	6.
Circonférence du museau prise derrière les naseaux.....	"	6.	"
Contour de la bouche.....	"	6.	4.

	pieds.	pouc.	lignes
Distance entre les angles de la mâchoire inférieure.....	II	3.	II
Distance entre les naseaux en bas...	II	II	9.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	II	1.	1.
Distance entre les deux paupières lorsqu'elles sont ouvertes.....	II	II	9.
Distance entre l'angle antérieur & le bout des lèvres.....	II	5.	4.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	II	2.	9.
Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en ligne droite...	II	2.	2.
La même distance en suivant la courbure du chanfrein.....	II	3.	4.
Circonférence de la tête prise au-devant des cornes.....	I.	3.	II
Longueur des oreilles.....	II	4.	9.
Largeur de la base mesurée sur la courbure extérieure.....	II	4.	5.
Distance entre les deux oreilles, prise en bas.....	II	2.	4.
Longueur du cou.....	II	1.	II
Circonférence près de la tête.....	II	11.	3.
Circonférence près des épaules.....	I.	4.	4.
Hauteur.....	II	6.	II
Circonférence prise derrière les jambes de devant.....	2.	3.	6.
Circonférence à l'endroit le plus gros.,	2.	9.	II

Circonférence devant les jambes de derrière. ....	2.	"	8.
Longueur du tronçon de la queue..	"	6.	4.
Circonférence à son origine. ....	"	3.	6.
Longueur du bras, depuis le coude jusqu'au genou. ....	"	9.	"
Circonférence à l'endroit le plus gros.	"	7.	6.
Circonférence du genou. ....	"	4.	6.
Longueur du canon. ....	"	7.	"
Circonférence à l'endroit le plus mince.	"	2.	8.
Circonférence du boulet. ....	"	4.	"
Longueur du paturon. ....	"	1.	8.
Circonférence du paturon. ....	"	3.	8.
Circonférence de la couronne. ....	"	4.	"
Hauteur depuis le bas du pied jusqu'au genou. ....	"	10.	6.
Distance depuis le coude jusqu'au garrot. ....	"	9.	6.
Distance depuis le coude jusqu'au bas du pied. ....	"	1.	6. 9.
Longueur de la cuisse depuis la rotule jusqu'au jarret. ....	"	11.	6.
Circonférence près du ventre. ....	"	10.	6.
Longueur du canon depuis le jarret jusqu'au boulet. ....	"	10.	4.
Circonférence. ....	"	3.	"
Longueur des ergots. ....	"	"	10.
Hauteur des sabots. ....	"	1.	8.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur depuis la pince jusqu'au talon dans les pieds de devant. . .	"	1.	10.
Longueur dans les pieds de derrière. .	"	1.	8.
Largeur des deux sabots pris ensemble dans les pieds de devant. . . . .	"	1.	5.
Largeur dans les pieds de derrière. . .	"	1.	4.
Distance entre les deux sabots. . . .	"	"	4.
Circonférence des deux sabots réunis, prise sur les pieds de devant. . . . .	"	4.	"
Circonférence prise sur les pieds de derrière. . . . .	"	3.	8.

Cet animal pesoit soixante-seize livres, à l'ouverture de l'abdomen les quatre estomacs & les intestins se sont trouvés placés comme dans les autres animaux ruminans ; le cœcum s'étendoit transversalement de droite à gauche dans la partie postérieure de la région ombilicale entre le rectum & les intestins grêles. . . . .

Les quatre estomacs & les intestins ressembloient à ceux du bœuf par leur forme & par leur position ; il n'y avoit que deux convexités sur la partie postérieure de la panse ; ses parois intérieures étoit blanches & couvertes en entier de papilles peu alongées & placées fort près les unes des autres ; les figures du réseau du bonnet avoient peu de diamètre , & leurs cloisons étoient peu élevées ; les feuilletts du troisième estomac étoient au nombre d'environ soixante &

quinze grands , quinze moyens & trente petits.

Le foie étoit placé & conformé comme celui du cerf & du bœuf ; il avoit au dehors & au dedans une couleur livide , il pesoit quinze onces , il n'y avoit point de vésicules du fiel.

La rate ressembloit à celle du cerf par sa figure ovale & par sa position ; elle avoit au dehors une couleur pâle comme celle du foie ; mais au dedans elle étoit d'un brun-rougeâtre , elle pesoit quatre onces quatre gros & demi.

Les reins étoient très-différens de ceux du bœuf , & ressembloient aux reins du bœuf , du cerf , &c.

Il s'est trouvé un os dans le cœur , les poumons ressembloient à ceux du cerf , car les lobes n'étoient pas séparés les uns des autres jusqu'à la racine.

La langue différoit de celle du cerf en ce qu'il n'a point paru de glandes à calice sur sa partie postérieure ; il y avoit dix-neuf sillons sur le palais , qui étoit de couleur mêlée de blanc & de cendrée. L'épiglotte étoit légèrement échancrée dans le milieu de ses bords ; en général la langue , le palais , l'épiglotte , l'entrée du larynx , le cerveau & le cervelet ressembloient à ces mêmes parties vues dans le cerf ; le cerveau pesoit trois onces sept gros & le cervelet sept gros.

Ce cariacou femelle avoit quatre mamelles

placées comme celles de la biche ; le clitoris n'étoit marqué que par l'enfoncement du prépuce ; il y avoit des rides longitudinales dans le vagin , & des rides transversales larges & saillantes dans le col de la matrice ; la vessie avoit la forme d'une poire ; les cornes de la matrice étoient adhérentes l'une à l'autre sur la longueur de trois pouces , & recourbées en dehors & en arrière d'un bout à l'autre ; les trompes étoient grosses & longues ; & les testicules quoique petits , contenoient des caroncules fort apparentes.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de la panse du devant en arrière , depuis le bonnet jusqu'au bout de la convexité du côté gauche.	1.	3.	"
Largeur.....	1.	"	"
Hauteur.....	"	6.	"
Circonférence transversale du corps de la panse.....	2.	6.	"
Circonférence longitudinale qui passe en devant auprès de l'œsophage & en arrière sur le sommet de la grosse convexité.....	2.	9.	"
Circonférence du col de la panse...	1.	4.	"
Profondeur de la scissure qui le sépare du corps.....	"	3.	6.
Circonférence de la base de la con- vexité droite.....	1.	1.	6.
Circonférence de la base de la con- vexité gauche.....	"	10.	"

Profondeur de la scissure qui sépare les deux convexités.....	"	2.	6.
Longueur du bonnet.....	"	7.	"
Circonférence à l'endroit le plus gros.	1.	1.	"
Grande circonférence du feuillet...	"	11.	"
Petite circonférence.....	"	7.	6.
Circonférence longitudinale du corps de la caillette.....	1.	8.	6.
Circonférence transversale à l'endroit le plus gros.....	"	10.	"
Circonférence de l'œsophage. ....	"	3.	"
Circonférence du pylore.....	"	2.	6.
Longueur des plus grandes papilles de la panse.....	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	"	"	" $\frac{1}{2}$ .
Hauteur des cloisons du réseau du bonnet.....	"	"	" $\frac{1}{2}$ .
Diamètre des plus grandes figures du réseau.....	"	"	5.
Longueur de la gouttière du bonnet.	"	2.	"
Largeur.....	"	"	8.
Largeur des plus grands feuillets du troisième estomac.....	"	1.	2.
Largeur des moyens.....	"	"	8.
Hauteur des plus grands replis de la caillette.....	"	"	6.
Longueur des intestins grêles depuis le pylore jusqu'au cœcum.....	33.	"	"

	pieds.	pouc.	lign.
Circonférence du duodenum dans les endroits les plus gros.....	"	2.	3.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	1.	3.
Circonférence du jejunum dans les endroits les plus gros.....	"	2.	"
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	1.	6.
Circonférence de l'ileum dans les en- droits les plus gros.....	"	2.	6.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	1.	6.
Longueur du cœcum.....	"	7.	"
Circonférence à l'endroit le plus gros.	"	6.	"
Circonférence à l'endroit le plus mince.	"	4.	"
Circonférence du colon dans les endroits les plus gros.....	"	5.	3.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	"	1.	9.
Circonférence du rectum près du colon.....	"	2.	6.
Circonférence du rectum près de l'anus.....	"	4.	6.
Longueur du colon & du rectum pris ensemble.....	15.	"	"
Longueur du canal intestinal en entier, non compris le cœcum : : 48.	"	"	"
Longueur du foie.....	"	4.	6.
Largeur.....	"	8.	6.



*du Cariacou.*

143

	pieds.	pouc.	ligne
Sa plus grande épaisseur.....	"	1.	3.
Longueur de la rate.....	"	5.	10.
Largeur.....	"	4.	2.
Épaisseur.....	"	"	9.
Épaisseur du pancréas.....	"	"	2.
Longueur des reins.....	"	2.	6.
Largeur.....	"	1.	5.
Épaisseur.....	"	"	10.
Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave jusqu'à la pointe...	"	3.	"
Largeur.....	"	5.	"
Largeur de la partie charnue entre le centre nerveux & le sternum..	"	2.	"
Largeur de chaque côté du centre nerveux.....	"	3.	6.
Circonférence de la base du cœur.	"	8.	6.
Hauteur depuis la pointe jusqu'à la naissance de l'artère pulmonaire.	"	4.	5.
Hauteur depuis la pointe jusqu'au sac pulmonaire.....	"	3.	3.
Diamètre de l'aorte, pris de dehors en dehors.....	"	"	6.
Longueur de la langue.....	"	6.	"
Longueur de la partie antérieure depuis le filet jusqu'à l'extrémité.	"	2.	3.
Largeur de la langue.....	"	1.	"
Longueur du cerveau.....	"	3.	"
Largeur.....	"	2.	8.

	pieds.	pouc.	lign.
Épaisseur.....	"	1.	5.
Longueur du cercelet.....	"	1.	2.
Largeur.....	"	2.	"
Épaisseur.....	"	1.	3.
Distance entre l'anus & la vulve.....	"	1.	4.
Longueur de la vulve.....	"	"	6.
Longueur du vagin.....	"	5.	9.
Circonférence du vagin.....	"	2.	6.
Grande circonférence de la vessie..	1.	6.	"
Petite circonférence.....	"	8.	6.
Longueur de l'urètre.....	"	1.	4.
Circonférence.....	"	1.	"
Longueur du col & du corps de la matrice.....	"	2.	"
Circonférence du corps.....	"	1.	9.
Longueur des cornes de la matrice..	"	6.	6.
Circonférence dans les endroits les plus gros.....	"	1.	6.
Circonférence à l'extrémité de chaque corne.....	"	"	4.
Longueur de la ligne courbe que par- court chaque trompe.....	"	3.	"
Longueur des testicules.....	"	"	6.
Diamètre.....	"	"	3.

La tête du squelette (*pl. XLV*) de la femelle du cariacou dont il s'agit, m'a paru ne différer de celle d'une biche, qu'en ce que  
l'arête




De Sève del.

E<sup>t</sup> Hauvcard Sculp.

LE CARIACOU.





Seve del.

M<sup>re</sup> Roussellet f<sup>me</sup> Tardieu Sulp.











e del

LE NAGOR.

L. le Grand Sculp.



l'arête longitudinale de la partie postérieure du front est plus élevée dans le cariacou que dans la biche ; les apophyses coronoides sont plus longues , & les contours des branches de la mâchoire beaucoup plus saillans ; la partie inférieure de l'épine de l'omoplate est plus alongée en bas que dans le cerf.

pieds. pouc. lignes

Longueur de la tête depuis le bout de la mâchoire supérieure jusqu'à l'occiput.....	"	8.	10.
Largeur de la tête , prise à l'endroit des orbites.....	"	3.	7 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'humérus.....	"	6.	4.
Circonférence à l'endroit le plus petit.	"	2.	11 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os du coude.....	"	8.	4.
Longueur de l'os du rayon.....	"	6.	7.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	8.
Longueur du fémur.....	"	7.	7 $\frac{1}{2}$ .
Circonférence du milieu de l'os....	"	2.	3.
Longueur du tibia.....	"	8.	9.
Circonférence du milieu de l'os....	"	2.	11 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des canons des jambes de devant.....	"	6.	9.
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	6 $\frac{2}{3}$ .
Longueur des canons des jambes de derrière.....	"	8.	"
Largeur du milieu de l'os.....	"	"	6.



## LE COUDOUS.

**L**A classe des animaux ruminans est la plus nombreuse & la plus variée ; elle contient , comme on vient de le voir , un très-grand nombre d'espèces , & peut-être un nombre encore plus grand de races distinctes , c'est-à-dire , de variétés constantes. Malgré toutes nos recherches & les détails immenses dans lesquels nous avons été contraints d'entrer , nous avouerons volontiers que nous ne l'avons pas épuisée , & qu'il reste encore des animaux même très-remarquables que nous ne connoissons , pour ainsi dire , que par échantillons , souvent très-difficiles à rapporter au tout auquel ils appartiennent. Par exemple , dans la grande & très-grande quantité de cornes rassemblées au Cabinet du Roi , ou dispersées dans les collections des particuliers , & que nous avons , après bien des comparaisons , rapportées chacune à l'animal duquel elles proviennent , il nous en est resté une sans étiquette , sans nom , abso-

lument inconnue , & dont nous n'avions d'autres indices que ceux qu'on pouvoit tirer de la chose même. Cette corne (*planche XLVII*) est très-grosse , presque droite , & d'une substance épaisse & noire ; ce n'est point un bois solide comme celui du cerf , mais une corne creuse & remplie , comme celles des bœufs , d'un os qui lui sert de noyau , elle porte depuis la base & dans la plus grande partie de sa longueur , une grosse arête épaisse & relevée d'environ un pouce ; & quoique la corne soit droite , cette arête proéminente fait un tour & demi de spirale dans la partie inférieure , & s'efface en entier dans la partie supérieure de la corne qui se termine en pointe ; en tout , cette corne différente de toutes les autres , nous paroissoit seulement avoir plus de rapport avec celles du buffle qu'avec aucune autre ; mais nous ignorions le nom de l'animal , & ce n'est qu'en dernier lieu & en cherchant dans les différens cabinets , que nous avons trouvé dans celui de M. Dupleix un massacre surmonté de deux cornes semblables (*pl. XLVII, fig. 2*) ;

& cette portion de tête étoit étiquetée : *cornes d'un animal à peu près comme un cheval , de couleur grisâtre , avec une crinière comme un cheval au devant de la tête , on l'appelle ici ( à Pondichery ) Coesdoes , qui doit se prononcer Coudous .* Cette petite découverte nous a fait grand plaisir , mais cependant nous n'avons pu trouver ce nom *coesdoes* ou *coudous* dans aucun voyageur , l'étiquette seulement nous a appris que cet animal est de très-grande taille , & qu'il se trouve dans les pays les plus chauds de l'Asie . Le buffle est de ce même climat , & il a d'ailleurs une crinière au-dessus de la tête ; il est vrai que ses cornes sont courbes & aplaties , au lieu que celles-ci sont rondes & droites ; & c'est ce qui distingue ces deux animaux aussi-bien que la couleur ; car le buffle a la peau & le poil noirs ; & selon l'étiquette , le coudous a le poil grisâtre . Ces rapports nous ont indiqué d'autres ; les voyageurs en Asie parlent de grands buffles de Bengale , de buffles roux , de bœufs gris du Mogol \* , qu'on appelle *nil-gauts* ,

\* La chasse des *nil-gauts* ou bœufs gris , qui à

le coudous est peut-être l'un ou l'autre de ces animaux ; & les voyageurs en Afrique , où les buffles sont aussi communs qu'en Asie , font une mention plus précise d'une espèce de buffle appelée *pacasse* au Congo , qui par leurs indices nous paroît être le coudous. « Sur la route de Louanda , au royaume de « Congo , nous aperçumes<sup>a</sup> , disent-ils , « deux pacasses , qui sont des animaux « assez semblables aux buffles , & qui « rugissent comme des lions ; le mâle & « la femelle vont toujours de compa- « gnie ; ils sont blancs , avec des taches « rousses & noires , & ont des oreilles « de demi-aune de long , & les cornes « toutes droites. Quand ils voient quel- « qu'un , ils ne fuient point ni ne font « aucun mal , mais regardent les passans. » Nous avons dit ci-devant<sup>b</sup> que l'animal

mon avis sont une espèce d'élan , n'a pas grand'chose de particulier , &c. *Voyage de Bernier. Amsterdam , 1710 , tome II , page 245.*

<sup>a</sup> Relation de Congo par les PP. Michel-Ange de Galline & Denys de Charly de Plaisance , Capucins. *Lyon , 1680 , page 77*

<sup>b</sup> Histoire naturelle , générale & particulière. *Tome XXIII , page 145.*

appelé à Congo \* *empacassa* ou *pacassa* nous paroissoit être le buffle ; c'est en effet une espèce de buffle , mais qui en diffère par la forme des cornes & la couleur du poil , c'est en un mot un cou-dous qui peut-être forme une espèce séparée de celle du buffle , mais qui peut-être aussi n'en est qu'une variété.

\* Le même pays de Congo produit un autre animal que les habitans nomment *empacassa* , quelques-uns le prennent pour le buffle , d'autres y trouvent seulement beaucoup de ressemblance. L'éditeur de la relation de Loppes , dit qu'il est un peu moins gros que le bœuf , mais qu'il lui ressemble par la tête & le cou . . . . Dapper assure que le buffle porte le nom d'*empacassa* dans le royaume de Congo , qu'il a le poil rouge & les cornes noires. *Histoire générale des voyages* , tome V , page 81.





# LE MUSC\*.

**P**OUR achever en entier l'histoire des Chèvres, des Gazelles, des Chevrotains & des autres animaux de ce genre, qui tous se trouvent dans l'ancien continent, il ne nous manque que celle de l'animal aussi célèbre que peu connu, duquel on tire le vrai musc.

\* *Moschi Capreolus*. Gesner, *Hist. quadrup.* pag. 695, fig. pag. 696.

*Capra Moschi*. Aldrovand. *de quadrup. Bissulcis*, pag. 743, fig. pag. 744.

*The Musc Deer*, le Cerf du Musc. Grews, *Musc. Reg. Societ. London*, 1681, pag. 21 & suiv.

Hiam, *animal Musci*. Michaël. Boym. *Flora sinensis*, 1656, fig. pag. 2.

*Moscus*. Schrokii *Historia Moschi*. Viennæ, 1682.

*Animal Moschiferum*. Ray, *Syn. quad.* pag. 127.

*Tragus Moschiferus*, *Moschus*. Klein, *de quad.* pag. 18.

*Tragulus ad umbilicum folliculum Moschiferum gerens*..... *Moschus*, le Musc. Briss. *Regn. animal.* pag. 97.

*Moschiferus*, *Moschus* *Syst. nat.* 13. Linn. *Syst. nat.* edit. x, pag. 66.

Tous les Naturalistes modernes & la plupart des voyageurs de l'Asie en ont fait mention, les uns sous le nom de *cerf*, de *chevreuil*, ou de *chevre du musc*; les autres l'ont considéré comme un grand chevrotain, & en effet il paroît être d'une nature ambiguë & participante de celle de tous ces animaux, quoiqu'en même temps on puisse assurer que son espèce est une, & différente de toutes les autres : il est de la grandeur d'un petit chevreuil ou d'une gazelle, mais sa tête est sans cornes & sans bois; & par ce caractère il ressemble au *memina* ou chevrotain des Indes. Il a deux grandes dents canines ou crochets à la mâchoire supérieure, & par-là il s'approche encore du chevrotain, qui a aussi deux grandes dents canines à cette même mâchoire; mais ce qui le distingue de tous les animaux, c'est une espèce de bourse d'environ deux ou trois pouces de diamètre qu'il porte près du nombril, & dans laquelle se filtre la liqueur, ou plutôt l'humeur grasse du musc, différente par son odeur & par sa consistance, de celle de la civette. Les Grecs ni les

Romains n'ont fait aucune mention de cet animal du musc; les premiers qui l'aient indiqué sont les Arabes<sup>a</sup>; Gesner, Aldrovande, Kircher<sup>b</sup> & Boym en ont

<sup>a</sup> *Nota.* Abusseid Serafi dit, que l'animal du Musc ressemble assez au Chevreuil, qu'il a la peau & la couleur semblables, les jambes menues, la corne fendue, le bois droit & un peu courbe, & qu'il est armé de deux dents blanches, du côté de chaque joue. Cet Auteur est le seul qui ait avancé que l'animal du musc portoit un bois; & ce n'est vrai-semblablement que par analogie qu'il a pensé que cet animal, ressemblant d'ailleurs au chevreuil, devoit avoir un bois sur la tête. Comme Aldrovande a copié cette erreur, nous avons cru devoir la remarquer. Avicenne, en parlant du Musc, dit que c'est la bourse ou la follicule d'un animal assez semblable au chevreuil, mais qui porte deux grandes dents canines recourbées. On trouve aussi une figure de l'animal dans le fragment de Cosmas, imprimé dans le premier volume des Voyages de Tavernier.

<sup>b</sup> Je dis donc, en premier lieu, qu'il se trouve un certain cerf dans les provinces de Xensi & de Chiamfi, lequel sent fort bon, & à qui les Chinois ont donné le nom de *Xerchiam*, c'est à-dire l'animal du musc: l'Atlas Chinois en parle en ces termes: « Pour ne vous faire pas languir « davantage touchant la signification de ce nom ou « de ce mot *Muschus*, je vous dirai ce que j'en « ai vu plus d'une fois. Cet animal a une certaine « bosse au nombril qui ressemble à une petite bourse, « parce qu'elle est entourée d'une peau fort déli- »

donné des notions plus étendues, mais Grew \* est le seul qui en ait fait une description exacte d'après la dépouille de

» cate, & couverte d'un poil fort doux & très-délié.  
 » Les Chinois appellent cette bête *Xe*, qui veut  
 » dire odeur, d'où ils composent ce mot *xehiang*,  
 qui signifie l'odeur de l'animal *Xe* ou *Se*, *Muschus*: »  
 il a quatre pieds de longueur, il est aussi vite  
 qu'un cerf; toute la différence qu'il y a, c'est que  
 son poil est un peu plus noir & qu'il n'a point  
 de cornes comme lui. Les Chinois mangent la  
 chair parce qu'elle est très-délicate. Les provinces  
 de Suchuen & de Junnan abondent extraordinairement  
 en ces sortes d'animaux, & on peut dire que  
 de toutes les contrées de la Chine, il n'y en a  
 pas qui en ait en si grande quantité que les pays  
 qui approchent le plus de l'occident. *La Chine*  
*illustrée de Kircher, traduite par d'Alquié, Amster-*  
*dam, 1610, page 256.*

\* Le cerf du musc se trouve à la Chine & aux  
 Indes orientales: il n'est pas mal représenté dans  
 le *Museum de Calceolarius*. La figure qu'en a donnée  
 Kircher (*China illustrata*) pêche par le museau &  
 par les pieds. Celle de Jonston est absurde; presque  
 par-tout cet animal est mal décrit. *Tous les Au-*  
*teurs connoissent*, dit Aldrovande, *qu'il a deux cornes*,  
 excepté Siméon Sethi, qui dit qu'il n'en a qu'une:  
 ni l'un ni l'autre n'est vrai; il en est de même  
 de la description donnée par Scaliger, & ensuite  
 par Chiocco dans le *Calceolarie Museum*, elle est  
 très-défectueuse; la meilleure est celle qui se trouve  
 dans les *Éphémérides d'Allemagne*, cependant en  
 la comparant avec celle que j'ai faite moi-même,

l'animal, qui de son temps étoit conservée dans le Cabinet de la Société

& que je vais donner ici, j'y ai trouvé quelques différences.

Cet animal a du bout du nez jusqu'à la queue environ trois pieds, la tête cinq à six pouces, le cou sept à huit pouces de longueur; le front trois pouces de largeur; le bout du nez n'a pas un pouce de largeur, il est pointu & semblable à celui d'un lévrier; les oreilles ressemblent à celles d'un lapin, elles sont droites & ont environ trois pouces de hauteur; la queue est droite aussi & n'a pas plus de deux pouces de longueur; les jambes de devant ont environ treize à quatorze pouces de hauteur; cet animal est du nombre des pieds fourchus, le pied est fendu profondément, armé en avant de deux cornes ou sabots de plus d'un pouce de long, & en arrière de deux autres presque aussi grands; les pieds de derrière manquoient au sujet que je décris ici. Les poils de la tête & des jambes n'étoient longs que d'un demi-pouce & étoient assez fins; sous le ventre ils étoient un peu plus gros & longs d'un pouce & demi; sur le dos & les fesses, ils avoient trois pouces de longueur, & ils étoient trois ou quatre fois plus gros que des soies de cochon, c'est-à-dire, plus gros que dans aucun autre animal. Ces poils étoient marqués alternativement de brun & de blanc depuis la racine jusqu'à l'extrémité; ils étoient bruns sur la tête & sur les jambes, blanchâtres sur le ventre & sous la queue, ondes, c'est-à-dire, un peu frisés sur la croupe & le ventre, plus doux au toucher que dans la plupart des

royale de Londres; cette description est

autres animaux. Ils sont aussi extrêmement légers & d'une texture très-peu compacte, car en les fendant & les regardant avec la loupe, ils paroissent comme composés de petites vessies semblables à celles que l'on voit dans le tuyau des plumes, en sorte qu'ils sont, pour ainsi dire, d'une substance moyenne entre celle des poils & des tuyaux de plume. De chaque côté de la mâchoire inférieure & un peu au-dessous des coins de la bouche, il y a un petit toupet de poils d'environ trois quarts de pouce de long, durs, roides, d'égale grandeur, & assez semblables à des soies de cochon.

La vessie ou la bourse qui renferme le muse, a environ trois pouces de longueur sur deux de largeur, elle est proéminente au-dessus de la peau du ventre, d'environ un pouce & demi.....; l'animal a vingt-six dents, seize dans la mâchoire inférieure, dont huit incisives devant, & quatre molaires derrière, & de chaque côté autant de molaires dans la mâchoire supérieure; & à un pouce & demi de distance de l'extrémité du nez, il y a de chaque côté, dans cette même mâchoire supérieure, une défense ou dent canine d'environ deux pouces & demi de long, courbée en arrière & en bas & se terminant en pointe; ces défenses ne sont pas rondes, mais aplaties; elles sont larges d'un demi-pouce, peu épaisses & tranchantes en arrière, en sorte qu'elles ressemblent assez à une petite faucille; il n'y a point de cornes sur la tête, &c. Passage que j'ai traduit de l'Anglois dans le livre qui a pour titre: *Musæum Reg. Societatis By-Nehemiad, Grew M. D. Lond. 1681, pag. 22. & 23.*

en Anglois, & j'ai cru devoir en donner ici la traduction. Un an après la publication de cet ouvrage de Grew, en 1681, Luc Schrockius \* fit imprimer à Vienne en Autriche l'histoire de cet animal, dans laquelle on ne trouve rien de fort exact, ni d'absolument nouveau : nous combinerons seulement les faits que nous en pourrons tirer avec ceux qui sont épars dans les autres auteurs, & sur-tout dans les voyageurs les plus récents ; & au moins ne pouvant faire mieux, nous aurons rassemblé, non pas tout ce que l'on a dit, mais le peu

<sup>a</sup> *Nota.* Schrockius donne la figure de l'animal, mais sans description, il dit seulement qu'il ressemble à un chevreuil, à l'exception qu'il a deux dents à la mâchoire supérieure en forme de défenses qui sont dirigées en bas & longues d'environ trois pouces ; que c'est-là le caractère principal de cet animal, qu'il varie pour la couleur du poil, qu'il a aussi la tête différente du chevreuil & plus approchante de celle d'un loup ; que le poil est ordinairement marqué de plusieurs taches, & que la protubérance qui contient le musc est sous le ventre, un peu au-dessous du nombril ; il ajoute que cet animal se trouve en Tartarie, au Thibet, à la Chine, sur-tout dans la province de Xinsî, dans le Tunquin, au Pégu, au royaume d'Aracan, de Boutan, (page 32 jusqu'à la page 57).

que l'on fait au sujet de cet animal que nous n'avons pas vu, & que nous n'avons pu nous procurer. Par la description de Grew, qui est la seule pièce authentique & sur laquelle nous puissions compter, il paroît que cet animal a le poil rude & long, le museau pointu, & des défenses à peu près comme le cochon, & que par ces premiers rapports il s'approche du sanglier, & peut-être plus encore de l'animal appelé *Babiroussa*, que les Naturalistes ont nommé *sanglier des Indes*, lequel avec plusieurs caractères du cochon, a néanmoins, comme l'animal du musc, la taille moins grosse & les jambes hautes & légères comme celles d'un cerf ou d'un chevreuil : d'autre côté le cochon d'Amérique, que nous avons appelé *pecari*, a sur le dos une cavité ou bourse qui contient une humeur abondante & très-odorante, & l'animal du musc a cette même bourse, non pas sur le dos, mais sur le ventre. En général, aucun des animaux qui rendent des liqueurs odorantes, telles que le blaireau, le castor, le pecari, l'ondatra, le desman, la civette, le zibet ne sont



du genre des cerfs ou des chèvres; ainsi nous serions portés à croire que l'animal du musc approche plus de celui des cochons \*, dont il a les défenses, s'il avoit en même temps des dents incisives à la mâchoire supérieure; mais il manque de ces dents incisives, & par ce rapport, il se rapproche des animaux ruminans, & sur-tout du chevrotain qui rumine aussi, quoiqu'il n'ait point de cornes; mais tous ces indices extérieurs ne suffisent pas, ils ne peuvent que nous fournir des conjectures, l'inspection seule des parties intérieures peut décider la nature de cet animal, qui jusqu'à ce jour n'est pas connue. J'avoue même que ce n'est que pour ne pas choquer les préjugés du plus grand nombre que nous l'avons mis à la suite des chèvres, gazelles & chevrotains, quoiqu'il nous ait paru aussi éloigné de ce genre que d'aucun autre.

\* *Animal moschiferum neque e cervino neque e caprino genere esse videtur, cornua enim non habet & non ruminet incertum est; dentibus tamen incisoribus in superiore mandibula caret, ruminantium in modum & dentes ibidem exsertos habet (Tusks Anglice, défenses Gallice) velut Porcus, Ray, Sin. quad. pag. 127.*

Marc Paul, Barbofa, Thevenot, le P. Philippe de Marini se font tous plus ou moins trompés dans les notices \*

\* Paolo le décrit de cette façon : il a le poil gros comme celui du cerf, les pieds & la queue comme une gazelle & n'a point de cornes *non plus qu'elle*. Il a quatre dents en haut, longues de trois doigts, délicates & blanches comme l'ivoire, deux qui s'élèvent en haut & deux tournées en bas, & cet animal est beau à voir. Dans la pleine lune, il lui vient une apostume au ventre près du nombril, & alors les chasseurs le prennent & ouvrent cette apostume. Barbofa dit qu'il est plus semblable à la gazelle; mais il ne s'accorde pas avec les autres auteurs, en ce qu'il dit qu'il a le poil blanc, voici ses paroles. « Le musc se trouve dans de petits  
» animaux blancs qui ressemblent aux gazelles &  
» qui ont des dents comme les éléphants, mais plus  
» petites. Il se forme à ces animaux une manière  
» d'apostume sous le ventre & sous la poitrine; &  
» quand la matière est mûrie, il leur vient une  
» telle démangeaison, qu'ils se frottent contre les  
» arbres, & ce qui tombe en petits grains est le  
» musc le plus excellent & le plus parfait. » La description que donne M. Thevenot convient encore moins avec les autres, il en parle en ces termes.  
« Il y a dans ces pays un animal semblable à un  
» renard par le museau, qui n'a pas le corps plus  
» gros qu'un lièvre; il a le poil de la couleur  
» de celui du cerf & les dents comme celles  
» d'un chien, il produit de très-excellent musc, il  
» a au ventre une vessie qui est pleine de sang  
» corrompu, & c'est ce sang qui compose le musc

qu'ils ont données de cet animal; la

ou qui est le musc même, on la lui ôte & on «  
couvere aussitôt avec du cuir l'endroit de la vessie «  
qui est coupée, afin d'empêcher que l'odeur ne «  
se dissipe; mais après que l'opération est faite, la «  
bête ne demeure plus long-temps en vie. » La  
description d'Antoine l'igassetta, qui dit que le musc  
est de la taille d'un chat, ne peut convenir avec  
celle des autres auteurs; la description que donne  
le P. Philippe de Marini ne convient pas tout-à-fait  
avec celle des autres auteurs, car il dit que cet  
animal a la tête semblable à celle d'un toup; &  
le P. Kircher, dans la figure qu'il en donne, le  
représente avec un groin de cochon, ce qui est  
peut-être la faute du graveur qui lui donne aussi  
des ongles, au lieu qu'il a la corne fendue. Siméon  
Sethi s'éloigne encore plus de la vérité en nous  
représentant cet animal grand comme la licorne,  
& même comme étant de cette espèce. Voici ses  
paroles : « Le musc de moindre valeur est celui qu'on  
apporte des Indes, qui tire sur le noir; & le «  
moindre de tous est celui qui vient de la Chine. «  
Tout ce musc se forme sous le nombril d'un «  
animal fort grand qui n'a qu'une corne, & qui «  
ressemble à un chevreuil; lorsqu'il est en chaleur, «  
il se fait autour de son nombril un amas de sang «  
épais qui lui cause une enflure, & la douleur «  
l'empêche alors de boire & de manger; il se roule «  
à terre & met bas cette tumeur remplie de sang «  
bourbeux qui s'étant caillé après un temps consi- «  
dérable acquiert la bonne odeur. » Tous ces auteurs  
conviennent de la manière dont le musc se forme  
dans la vessie, ou dans la tumeur qui paroît au  
nombril de l'animal quand il est en rut. *Anciennes*

seule chose vraie & sur laquelle ils s'accordent, c'est que le musc se forme dans une poche ou tumeur qui est près du nombril de l'animal, & il paroît par leurs témoignages & par ceux de quelques autres voyageurs, qu'il n'y a que le mâle qui produise le bon musc; que la femelle a bien la même poche près du nombril, mais que l'humeur qui s'y filtre n'a pas la même odeur: il paroît de plus que cette tumeur du mâle ne se remplit de musc que dans le temps du rut; & que dans les autres temps, la quantité de cette humeur est moindre & l'odeur plus foible.

A l'égard de la matière même du musc, son essence, c'est-à-dire, sa substance pure est peut-être aussi peu connue que la nature de l'animal qui le produit; tous les Voyageurs conviennent que cette drogue est toujours altérée & mêlée avec du sang ou d'autres drogues par ceux qui la vendent; les Chinois en augmentent non-seulement le volume par ce mélange, mais ils cherchent

*relations des Indes & de la Chine, page 216 & suivantes.*

encore à en augmenter le poids, en y incorporant du plomb bien trituré; le musc le plus pur & le plus recherché, par les Chinois mêmes, est celui que l'animal laisse couler sur des pierres ou des troncs d'arbres contre lesquels il se frotte lorsque cette matière devient irritante ou trop abondante dans la bourse où elle se forme; le musc qui se trouve dans la poche même est rarement aussi bon parce qu'il n'est pas encore mûr, ou bien parce que ce n'est que dans la saison du rut qu'il acquiert toute sa force & toute son odeur, & que dans cette même saison l'animal cherche à se débarrasser de cette matière trop exalée qui lui cause alors des picotemens & des démangeaisons. Chardin \* & Tavernier.

\* Je crois que la plupart du monde fait assez que le musc est l'excrément & le pus d'une bête qui ressemble à la chèvre sauvage, excepté qu'elle a le corps & les jambes plus déliées; elle se trouve dans la haute Tartarie, dans la Chine septentrionale qui lui est limitrophe, & au grand Thibet, qui est un royaume entre les Indes & la Chine. Je n'ai jamais vu de ces animaux-là en vie, mais j'en ai vu des peaux en bien des endroits; l'on en trouve des portraits dans l'ambassade des Hollandois à la Chine, & dans la *China illustrata* du P. Kircher :

ont tous deux bien décrit les moyens

on dit communément que le musc est une sueur de cet animal, qui coule & qui s'amasse en une vessie déliée proche le nombril; les Orientaux disent plus précisément qu'il se forme un abcès dans le corps de cette chèvre, proche l'ombilic, dont l'humeur picote & démange, sur-tout lorsque la bête est en chaleur; qu'alors à force de se frotter contre les arbres & contre les rochers, l'abcès perce, & la matière s'épanche au même endroit entre les muscles & la peau, & en s'y amassant y forme une manière de loupe ou de vessie; que la chaleur interne échauffe ce sang corrompu, & que c'est cette chaleur qui lui donne cette forte odeur que l'on sent au musc. Les Orientaux appellent cette vessie le *nombril du musc*, & aussi le *nombril odoriférant*; le bon musc s'apporte du Thibet; les Orientaux l'estiment plus que celui de la Chine, soit qu'il ait effectivement une odeur plus forte & plus durable, soit que cela leur paroisse seulement arrivant plus frais chez eux, parce que le Thibet en est plus proche que la province de Xinsî, qui est l'endroit de la Chine où l'on fait le plus de musc. Le grand commerce de musc se fait à Boutan, ville célèbre du royaume de Thibet, les Patans qui vont là en faire emplette, le distribuent par toute l'Inde; d'où on le transporte ensuite par toute la terre; les Patans sont voisins de la Perse & de la haute Tartarie, sujets, ou seulement tributaires du grand Mogol. Les Indiens font cas de cette drogue aromatique, tant pour l'usage que pour la recherche que l'on en fait, ils l'emploient en leurs parfums & confectons, & dans tout ce qu'ils ont accoutumé de préparer pour réveiller l'humeur amoureux, & pour rétablir la vigueur; les femmes s'en servent

dont les Orientaux se servent pour falsifier le musc ; il faut nécessairement que

pour dissiper les vapeurs qui montent de la matrice au cerveau , en portant une vessie au nombril ; & quand les vapeurs sont violentes & continuelles , elles prennent du musc hors de la vessie , l'enferment dans un petit linge fait comme un petit sac , & l'appliquent dans la partie que la pudeur ne permet pas de nommer . . . . . On tient communément que lorsqu'on coupe le petit sac où est le musc , il en sort une odeur si forte , qu'il faut que le chasseur ait la bouche & le nez bien bouchés d'un linge en plusieurs doubles ; & que souvent malgré cette précaution ; la force de l'odeur le fait saigner avec tant de violence qu'il en meurt. Je me suis informé de cela exactement , & comme en effet j'ai ouï raconter quelque chose de semblable à des Arméniens qui avoient été à Boutan , je crois que cela est vrai. Ma raison est que cette drogue n'acquiert point de force avec le temps , mais qu'au contraire elle perd son odeur à la longue ; or cette odeur est si forte aux Indes , que je ne l'ai jamais pu supporter. Lorsque je négociois du musc , je me tenois toujours à l'air , un mouchoir sur le visage , loin de ceux qui manioient ces vessies , m'en rapportant à mon Courtier , ce qui me fit bien connoître dès lors que le musc est fort entêtant & tout-à fait insupportable quand il est frais tiré ; j'ajoute qu'il n'y a drogue au monde plus aisée à falsifier & plus sujette à l'être , il se trouve bien des bourses qui ne sont que des peaux de l'animal renaplis de son sang & d'un peu de musc pour donner l'odeur , & non cette loupe que la sagesse de la Nature forme proche le nombril pour recevoir cette espèce d'hu-



les marchands en augmentent la quantité bien au-delà de ce qu'on pourroit imaginer, puisque dans une seule année Tavernier \* en acheta seize cents soixante & treize vessies, ce qui suppose une merveillesse & odoriférante. Quant aux vraies vessies même, lorsque le chasseur ne les trouve pas bien pleines, il presse le ventre de cet animal pour en tirer du sang dont il les remplit; car on tient que le sang du musc, & même la chair, sentent bon; les marchands ensuite y mêlent du plomb, du sang de bœuf & autres choses propres à les appesantir, qu'ils font entrer dedans à force. L'art dont les Orientaux se servent pour connoître cette falsification, sans ouvrir la vessie, est premièrement au poids, à la main, l'expérience leur a fait connoître combien doit peser une vessie non altérée; le goût est leur seconde preuve, aussi les Indiens ne manquent jamais de mettre à la bouche de petits grains qu'ils tirent des vessies lorsqu'ils en achètent; le troisième, c'est de prendre un fil trempé dans du suc d'ail & de le tirer au travers de la vessie avec une aiguille; car si l'odeur d'ail se perd, le musc est bon; si le fil la garde, il est altéré. *Voyages de Chardin. Amsterdam, 1711, tome II, pages 16 & 17.*

\* La meilleure sorte & la plus grande quantité de musc, vient du royaume de *Boutan*, d'où on le porte à Patna, principale ville de Bengale, pour négocier avec les gens de ce pays-là; tout le musc qui se négocie dans la Perse vient de-là..... J'ai eu la curiosité d'apporter la peau de cet animal à Paris, dont en voici la figure.



un nombre égal d'animaux auxquels

Après qu'on a tué cet animal, on lui coupe la vessie qui paroît sous le ventre de la grosseur d'un œuf, & qui est plus proche des parties génitales que du nombril, puis on tire de la vessie le musc qui s'y trouve & qui est alors comme du sang caillé; quand les payfans le veulent falsifier, ils mettent du foie & du sang de l'animal haché ensemble en la place du musc qu'ils ont tiré, ce mélange produit dans les vessies en deux ou trois années de temps, de certains petits animaux qui mangent le bon musc, de sorte que quand on vient à les ouvrir, on y trouve beaucoup de déchet; d'autres payfans quand ils ont coupé la vessie & tiré du musc ce qu'ils en peuvent tirer, sans qu'il y paroisse trop, remettent à la place de petits morceaux de plomb pour la rendre plus pesante; les marchands qui l'achettent & le transportent dans les pays étrangers, aiment bien micux cette tromperie que l'autre, parce qu'il ne s'y engendre point de ces petits animaux; mais la tromperie est encore plus mal aisée à découvrir, quand de la peau du ventre du petit animal ils font de petites bourses qu'ils cousent fort proprement avec des filets de la même peau & qui ressemblent aux véritables vessies, & ils remplissent ces bourses de ce qu'ils ont ôté des bonnes vessies avec le mélange frauduleux qu'ils y veulent ajouter, à quoi il est difficile que les marchands puissent rien connoître; il est vrai que s'ils lioient la vessie dès qu'ils l'ont coupée, sans lui donner de l'air & laisser le temps à l'odeur de perdre sa force en s'évaporant, tandis qu'ils en tirent ce qu'ils en veulent ôter, il arriveroit qu'en portant cette vessie au nez de quelqu'un, le sang lui for-

cette vessie auroit été enlevée ; mais  
comme

tiroit aussi-tôt par la force de l'odeur qui doit nécessairement être tempérée pour se rendre agréable sans nuire au cerveau. L'odeur de cet animal que j'ai apporté à Paris étoit si forte, qu'il étoit impossible de le tenir dans ma chambre, il entêtoit tout le monde du logis, & il fallut le mettre au grenier, où enfin mes gens lui coupèrent la vessie, ce qui n'a pas empêché que la peau n'ait toujours retenu quelque chose de l'odeur. On ne commence à trouver cet animal qu'environ le cinquante-sixième degré; mais au soixantième, il y en a grande quantité, le pays étant rempli de forêts : il est vrai qu'aux mois de Février & de Mars, après que ces animaux ont souffert la faim dans le pays où ils sont à cause des neiges qui tombent en quantité jusqu'à dix ou douze pieds de haut, il viennent du côté du midi, jusqu'à quarante-quatre ou quarante-cinq degrés pour manger du blé ou du ris nouveau, & c'est en ce temps-là que les paysans les attendent au passage avec des pièges qu'ils leur tendent, & les tuent à coups de flèches & de bâtons; quelques-uns d'eux m'ont assuré qu'ils sont si maigres & si languissans à cause de la faim qu'ils ont soufferte, que beaucoup se laissent prendre à la course. Il faut qu'il y ait une prodigieuse quantité de ces animaux, chacun d'eux n'ayant qu'une vessie, & la plus grosse qui n'est ordinairement que comme un œuf de poule, ne pouvant fournir une demi-once de musc, il faut bien quelquefois trois ou quatre de ces vessies pour en faire une once.

Le roi de Dantan, de qui je parlerai au volume suivant, dans la description que je ferai de ce royaume,

comme cet animal n'est domestique nulle part, & que son espèce est confinée à quelques provinces de l'Orient, il est impossible de supposer qu'elle est assez nombreuse pour produire une aussi grande quantité de cette matière, & l'on ne peut pas douter que la plupart de ces prétendues poches ou vessies ne soient

royaume, craignant que la tromperie qui se fait au musc ne fût cesser ce négoce, d'autant plus qu'on en tire aussi du Tunquin & de la Cochinchine qui est bien plus cher, parce qu'il n'y en a pas en si grande quantité; ce roi, dis-je, craignant que cette marchandise falsifiée ne décriât le commerce de ses États, ordonna, il y a quelque temps, que toutes les vessies ne seroient point cousues, mais qu'elles seroient apportées ouvertes à Boutan, qui est le lieu de sa résidence, pour y être visitées & scellées de son sceau; toutes celles que j'ai achetées étoient de cette sorte, mais nonobstant toutes les précautions du roi, les payfans les ouvrent subtilement, & y mettent, comme j'ai dit, des petits morceaux de plomb, ce que les marchands tolèrent, parce que le plomb ne gâte pas le musc, ainsi que j'ai remarqué, & ne fait tort que pour le poids. Dans un de mes voyages à Patna, j'achetai soixante cents soixante-treize vessies, qui pesoient deux mille cinq cents cinquante-sept onces & demi, & quatre cents cinquante deux onces hors de la vessie. *Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier en Turquie, en Perse & aux Indes. A Rouen, 1713, tome IV, page 75 jusqu'à 78.*

des petits sacs artificiels faits de la peau même des autres parties du corps de l'animal, & remplies de son sang, mêlé avec une très-petite quantité de vrai musc. En effet, cette odeur est peut-être la plus forte de toutes les odeurs connues, il n'en faut qu'une très-petite dose pour parfumer une grande quantité de matière, l'odeur se porte à une grande distance, la plus petite particule suffit pour se faire sentir dans un espace considérable ; & le parfum même est si fixe, qu'au bout de plusieurs années, il semble n'avoir pas perdu beaucoup de son activité.



DESCRIPTION  
 DE LA PARTIE DU CABINET  
*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*  
 DES CHEVROTAINS,  
 DU CARIACOU, DU COUDOUS  
 ET DU MUSC.

N.<sup>o</sup> MCXCI.

*Un jeune chevrotain.*

LE museau de cet animal est plus court, & ses oreilles sont plus grandes que dans l'adulte; sa description & ses dimensions sont partie de la description du chevrotain.

N.<sup>o</sup> MCXCII.

*Un chevrotain.*

On n'a laissé sous la peau de cet animal que les os de la tête & des jambes; il a été apporté des Indes par M. le Commandeur Godeheu; la bouche est ouverte de façon que l'on y voit les dents incisives, les deux canines & plusieurs des mâchoières. Il a été

H ij

fait mention des couleurs du poil de cet animal, & ses principales dimensions ont été rapportées dans la description du chevrotain.

### N.<sup>o</sup> MCXCIII.

#### *Autre chevrotain.*

Ce chevrotain a été apporté de Mergui dans l'Inde ; il est de la même grandeur & dans le même état que le précédent, mais son poil a moins de couleur brune & plus de fauve ; il paroît plus jeune, car ses dents canines sont très-courtes.

### N.<sup>o</sup> MCXCIV.

*Le canon & le pied d'une jambe de devant ( pl. XLIII, fig. 3, qui est de grandeur naturelle comme les autres figures de cette planche ) & d'une jambe de derrière ( fig. 4 ) d'un chevrotain.*

Ces parties sont un peu plus longues & plus grosses que celles qui leur correspondent dans le chevrotain, rapporté sous le n.<sup>o</sup> MCXCII.

### N.<sup>o</sup> MCXCV.

*Le canon & le pied d'une jambe de devant ( fig. 5 ) & d'une jambe de derrière ( fig. 6 ) d'un autre chevrotain.*

Il paroît par les dimensions de ces parties,

qu'elles viennent d'un chevrotain de même grandeur que celui qui est rapporté sous le n.<sup>o</sup> MCXCII; elles sont revêtues d'une petite plaque d'or (*AA*, fig. 5 & 6) à l'extrémité supérieure des canons; les Nègres s'en servent comme d'un refouloir pour leurs pipes.

N.<sup>o</sup> MCXCVI.

*Le canon & le pied d'une jambe de devant (fig. 7) & d'une jambe de derrière (fig. 8).*

Ces parties viennent d'un chevrotain encore plus petit que celui qui est rapporté sous le n.<sup>o</sup> MCXC I; la circonférence des canons n'est que de cinq à six lignes.

N.<sup>o</sup> MCXCVII.

*Une très-petite corne qui s'est trouvée au cabinet dans un bocal avec les pieds de chevrotains, rapportés sous les trois numéros précédens.*

Il y a tout lieu de croire que cette corne (*pl. XLIII, fig. 2*) vient de l'espèce de chevrotain appelé *Guevei* \*, elle n'a qu'un pouce de longueur & onze lignes de circonférence à la base, elle est creuse, un peu courbe, fort pointue & de couleur noirâtre,

\* Voyez l'histoire des chevrotains par M. de Buffon, page 82. de ce volume.

elle a près de la base trois ou quatre anneaux faillans & transversaux, irréguliers dans leur direction, & très-peu apparens sur l'un des côtés de la corne; elle m'a paru avoir plus de rapports à celles des gazelles qu'aux cornes d'aucun autre animal.

### N.<sup>o</sup> M C X C V I I I.

#### *Le squelette d'un cariacou.*

La description & les principales dimensions de ce squelette font partie de la description du cariacou.

### N.<sup>o</sup> M C X C I X.

#### *Corne de coudous.*

Cette corne (*pl. X L V I, fig. 1* où la corne est vue par le côté antérieur; & *fig. 2*, où la même corne est vue par le côté postérieur) vient du côté droit de l'animal; elle a environ deux pieds & demi dans sa plus grande longueur (*A B*), & près d'un pied de circonférence à la base; elle est un peu courbe & elle a une forte arête (*A C D E*), qui fait deux tours de spirale autour de la corne jusqu'aux deux tiers de la longueur, il me paroît que cette arête commence comme celle des cornes du buffle, sur le côté antérieur de la base. Il y a quelques rides transversales près de la base de la corne dont il s'agit ici, le reste est lisse; elle est en entier de couleur brune.



Fig. 1.






Fig. 3.



Fig. 2.





## N.º M C C.

*Les deux cornes du coudous.*

Ces cornes (*pl. XLVI, fig. 3 & 4*) sont moins grandes que la précédente, car elles n'ont que deux pieds de longueur; au reste elles lui ressemblent, elles tiennent toutes les deux à la peau & à l'os frontal qui est cassé.

## N.º M C C I.

*Des poches de musc.*

Ces poches de musc (*pl. XLVII, fig. 1, 2 & 3*) sont desséchées & déformées, cependant il m'a paru que dans l'état naturel elles étoient aplaties, elles ont environ deux pouces de diamètre, & un pouce un quart d'épaisseur; l'une de leurs faces (*fig. 1 & 2*) est revêtue de poil & percée dans le milieu par un orifice (*A, fig. 2*) qui est entouré d'un poil fin & jaunâtre (*BC*); les bords (*DEF*) de la poche sont revêtus d'un poil plus gros, mais de même couleur. Il y a sur la face de ces poches qui tenoit au corps de l'animal, une pellicule qui recouvre la matière du musc, dont la poche est remplie; en enlevant la pellicule, on voit cette matière à découvert (*A, fig. 3*).



## LE BABIROUSSA\*.

**Q**UOIQUE nous n'ayons au Cabinet du Roi que la tête de cet animal, il est trop remarquable pour que nous

\* *Babiroussa* ou *Babiroesa*. Nom de cet animal aux Indes orientales, & que nous avons adopté.

*Babiroussa seu porcus Indicus. Iconem animalis in insulâ Java novæ Bataviæ, Janu. 1650, depictam & cranii quod Hafniæ vidi naturæ studiosorum in gratiam addendam existimavi. Th. Bartholini, Hist. anat. cent. 11. Hist. 96, fig. ibid.*

*Babiroussa. Pison. Comment. & append. in Bont. pag. 61, fig. ibid.*

*The Horned Hog. Babiroussa. Grew's. Mus. R. soc. pag. 27.*

*Porcus Indicus Babiroussa dictus. Ray. Syn. anim. quad. pag. 96.*

*Babiroesa. Description des Indes orientales par François Valentin, en Hollandois. Amsterdam, 1726, vol. III, page 268.*

*Aper Indicus Orientalis, Babiroesa dictus. Seba, vol. 1, pag. 80. Tab. 50, fig. 2.*

*Sus caudatus, dentibus caninis superioribus ab origine sursum versis, arcuatis, caudâ floccosâ. . . . . Aper orientalis. Le sanglier des Indes. Brisson, Regn. anim. pag. 110.*

*Babiroussa sus dentibus duobus caninis fronti innatis, Linn. Syst. nat. edit. X, pag. 70.*

puissions le passer sous silence. Tous les Naturalistes l'ont regardé comme une espèce de cochon, & cependant il n'en a ni la tête, ni la taille, ni les soies, ni la queue; il a les jambes plus hautes & le museau moins long, il est couvert d'un poil court & doux comme de la laine, & sa queue est terminée par une touffe de cette laine; il a aussi le corps moins lourd & moins épais que le cochon; son poil est gris, mêlé de roux & d'un peu de noir; ses oreilles sont courtes & pointues: mais le caractère le plus remarquable, & qui distingue le babiloussa de tous les autres animaux, ce sont quatre énormes défenses ou dents canines, dont les deux moins longues sortent comme celles des sangliers, de la mâchoire inférieure; & les deux autres qui sont beaucoup plus grandes, partent de la mâchoire supérieure en perçant les joues, ou plutôt les lèvres du dessus, & s'étendent en courbe jusqu'au-dessous des yeux; & ces défenses sont d'un très-bel ivoire, plus net, plus fin, mais moins dur que celui de l'éléphant.

La position & la direction de ces deux défenses supérieures qui percent le

muséum du babiroussa, & qui d'abord se dirigent droit en haut, & ensuite se recourbent en cercle, ont fait penser à quelques Physiciens, même habiles, tels que Grew \*, que ces défenses ne devoient point être regardées comme des dents, mais comme des cornes; ils fonderoient leur sentiment sur ce que toutes les alvéoles des dents de la mâchoire supérieure ont dans tous les animaux l'ouverture tournée en bas; que dans le babiroussa comme dans les autres, la mâchoire supérieure a toutes ses alvéoles tournées en bas tant pour les machelières que pour les incisives, tandis que les seules alvéoles de ces deux grandes défenses sont au contraire tournées en haut (voyez la figure, planche XLVIII); & ils concluient de-là que le caractère essentiel de toutes les dents de la mâchoire

\* On his upper jaw, he has two Horns. . . .  
*Bartholine* calls them teeth yet are they not teeth, but *Horns*; because they are not, as all teeth, even the tusks of an *elephant*, fixed in the jaw, with their roots upward, but downward: and so their *alveoli* are not open downward within the mouth, upward upon the top of the snout, &c. *Grew's Mus. Reg. soc. pag. 28,*

supérieure étant de se diriger en bas , on ne pouvoit pas mettre ces défenses qui se dirigent en haut au nombre des dents , & qu'il falloit les regarder comme des cornes ; mais ces Physiciens se sont trompés : la position ou la direction ne sont que des circonstances de la chose & n'en sont pas l'essence ; ces défenses , quoique situées d'une manière opposée à celle des autres dents , n'en sont pas moins des dents , ce n'est qu'une singularité dans la direction qui ne peut changer la nature de la chose , ni d'une vraie dent canine en faire une fausse corne d'ivoire.

Ces énormes & quadruples défenses donnent à ces animaux un air formidable , cependant ils sont peut-être moins dangereux que nos sangliers ; ils vont de même en troupe , & ont une odeur forte qui les décèle & fait que les chiens les chassent avec succès ; ils grognent \* terriblement , se défendent & blessent des défenses de dessous , car celles du dessus leur nuisent plutôt qu'elles ne servent ; quoique grossiers &

\* *Mus. Worm. pag. 340. — Pison Append. in Bour. pag. 61.*

féroces comme les sangliers, ils s'appri-voient aisément, & leur chair qui est très-bonne à manger, se corrompt en assez peu de temps : comme ils ont aussi le poil fin & la peau mince, ils ne résistent pas à la dent des chiens qui les chassent de préférence aux sangliers & en viennent facilement à bout, ils s'accrochent<sup>a</sup> à des branches avec les défenses d'en haut, pour reposer leur tête ou pour dormir debout. Cette habitude leur est commune avec l'éléphant, qui pour dormir sans se coucher, soutient sa tête en mettant le bout de ses défenses dans des trous qu'il creuse à cet effet dans le mur de sa loge<sup>b</sup>.

Le babiroussa diffère encore du sanglier par ses appétits naturels; il se nourrit d'herbes & de feuilles d'arbres, & ne cherche point à entrer dans les jardins pour manger des légumes, au lieu que dans le même pays, le sanglier vit de fruits sauvages, de racines, & dévaste

<sup>a</sup> Description des Indes orientales par François Valentin, vol. III. page 268.

<sup>b</sup> Voyez ce fait dans l'histoire de l'éléphant, tome XXII. de cet ouvrage.



souvent les jardins. D'ailleurs ces animaux qui vont également en troupe ne se mêlent jamais, les sangliers vont d'un côté, & les baboroussas de l'autre; ceux-ci marchent plus légèrement, ils ont l'odorat très-fin, & se dressent souvent contre des arbres pour éventer de loin les chiens & les chasseurs; lorsqu'ils sont poursuivis long-temps & sans relâche, ils courent se jeter à la mer, où nageant avec autant de facilité que des canards & se plongeant de même, ils échappent très-souvent aux chasseurs, car ils nagent très-long-temps & vont quelquefois à d'assez grandes distances & d'une île à une autre.

Au reste, le baboroussa se trouve non-seulement à l'île de Bouro ou Boero, près d'Amboine, mais encore dans plusieurs autres endroits\* de l'Asie méridionale & de l'Afrique, comme aux Celebes, à

\* On trouve les Baboroussas en grande quantité dans l'île de Boero, ainsi qu'à Cajely, dans les îles de Xoelatche, sur-tout à Xoela Mangoli, comme aussi dans l'île de Bangay, sur la côte d'ouest des Celebes, & encore plus à Manado. *Description des Indes orientales par François Valentin, tome III, page 369.* Traduction communiquée par M. le marquis de Montmirail. *Nota.* La plupart des faits que nous avons rapportés ci-dessus au sujet des

Estrila<sup>a</sup>, au Sénégal<sup>b</sup>, à Madagascar : car il paroît que les sangliers de cette île dont parle Flaccourt<sup>c</sup>, & dont il dit *que les mâles principalement ont deux cornes à côté du nez* sont des babirouffas. Nous n'avons pas été à portée de nous assurer que la femelle manque en effet de ces deux défenses si remarquables dans le mâle, la plupart des Auteurs qui ont parlé de ces animaux, semblent s'accorder sur ce fait que nous ne pouvons ni confirmer ni détruire.

habitudes naturelles du babirouffa, sont tirés de ce même ouvrage de Valentin.

<sup>a</sup> Entre plusieurs marchandises que les Hollandois tirent de la côte d'Estrila, ils en rapportent des dents de sangliers qui les ont plus belles que les éléphants. *Voyage de Robert Lade, traduit de l'Anglois. Paris, 1744, tome I, page 121.*

<sup>b</sup> J'aperçus enfin un de ces énormes sangliers particuliers à l'Afrique. . . . Il étoit noir comme les sangliers d'Europe, mais d'une taille infiniment plus haute. Il avoit quatre grandes défenses, dont les deux supérieures étoient recourbées en demi-cercle, vers le front où elles imitoient les cornes que portent d'autres animaux. *Voyage au Sénégal, par M. Adanson, page 76.*

<sup>c</sup> Voyage à Madagascar par Flaccourt, pag. 152.



# LE CABIAI\*.

CET animal d'Amérique n'avoit jamais paru en Europe, & c'est aux bontés de M. le duc de Bouillon que nous en devons la connoissance ; comme ce Prince est curieux d'animaux étrangers, il m'a quelquefois fait l'honneur de m'appeler pour les voir, & par

\* Cabiai, mot dérivé de *Cabionara*, nom de cet animal à la Guiane, & que nous avons adopté.

*Capybara Brasiliensibus*. Marcgrave. *Hist. nat. Bras.* pag. 230, fig. *ibidem*.

*Capybara*. Pison. *Hist. Brasil.* pag. 99. Nota. La figure est la même que celle de Marcgrave.

*Capybara Brasiliensibus porcus fluvialitidis* Marcgravi. Ray. *Syn. quad.* pag. 126 & 127.

Cochon d'eau. *Voyage de Desmarchais*, par le P. Labat, tome III, page 315 & suivantes.

Capivard. *Voyage de Froger*, Amsterdam, 1715, page 127, fig. *ibid.*

*Sus maximus palustris*. *Porcus fluvialitidis Brasiliensis* Jonston. *Capybara Brasiliensibus* Marcgrave. Le Cabiai que l'on nomme aussi *Cabionara*. Barrère. *Hist. nat. de la Fr. Equin.* pages 160 & 161.

*Hydrocharus*. Le Cabiai. Brisson. *Regn. anim.* page 117.

amour pour le bien, il nous en a donné plusieurs; celui-ci lui avoit été envoyé jeune, & n'étoit pas encore tout-à-fait adulte lorsque le froid l'a fait mourir: nous avons donc été à portée de le connoître & de le décrire, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce n'est point un cochon, comme l'ont prétendu les Naturalistes & les Voyageurs, il ne lui ressemble même que par de petits rapports, & en diffère par de grands caractères; il ne devient jamais aussi grand, le plus gros Cabiai est à peine égal à un cochon de dix-huit mois; il a la tête plus courte, la gueule beaucoup moins fendue, les dents & les pieds tout différens, des membranes entre les doigts, point de queue ni de défenses; les yeux plus grands, les oreilles plus courtes; & il en diffère encore autant par le naturel & les mœurs, que par la conformation: il habite souvent dans l'eau, où il nage comme une loutre, y cherche de même sa proie & vient manger au bord le poisson qu'il prend & qu'il saisit avec la gueule & les ongles; il mange aussi des grains, des fruits &

des cannes de sucre ; comme ses pieds sont longs & plats , il se tient souvent assis sur ceux de derrière. Son cri est plutôt un braiement comme celui de l'âne , qu'un grognement comme celui du cochon ; il ne marche ordinairement que la nuit , & presque toujours de compagnie , sans s'éloigner du bord des eaux ; car comme il court mal à cause de ses longs pieds & de ses jambes courtes , il ne pourroit trouver son salut dans la fuite ; & pour échapper à ceux qui le chassent , il se jette à l'eau , y plonge & va sortir au loin , ou bien il y demeure si long-temps , qu'on perd l'espérance de le revoir. Sa chair est grasse & tendre ; mais elle a plutôt , comme celle de la loutre , le goût d'un mauvais poisson que celui d'une bonne viande ; cependant on a remarqué que la hure n'en étoit pas mauvaise , & cela s'accorde avec ce que l'on fait du castor , dont les parties antérieures ont le goût de la chair , tandis que les parties postérieures ont le goût du poisson. Le cabiai est d'un naturel tranquille & doux , il ne fait ni mal ni querelle aux autres animaux , on l'appri-

voise sans peine, il vient à la voix & fuit assez volontiers ceux qu'il connoît & qui l'ont bien traité. On ne le nourrissoit à Paris qu'avec de l'orge, de la salade & des fruits, il s'est bien porté tant qu'il a fait chaud; il paroît, par le grand nombre de ses mamelles, que la femelle produit des petits en quantité. Nous ignorons le temps de la gestation, celui de l'aceroissement, & par conséquent la durée de la vie de cet animal: nos habitans de Cayenne pourront nous en instruire, car il se trouve assez communément à la Guiane aussi-bien qu'au Bresil, aux Amazones & dans toutes les terres basses de l'Amérique méridionale.



# DESCRIPTION

## DU CABIAI.

**L**E Cabiai (*pl. XLIX*) a quelques rapports avec le cochon par la qualité du poil & par la forme du corps, de la croupe & des jambes; ces caractères lui ont fait donner le nom de *cachon*; & parce qu'il se plaît dans l'eau, qu'il plonge & qu'il nage avec d'autant plus de facilité, qu'il a des nageoires entre les doigts, on l'a nommé *cochon d'eau* pour le distinguer du vrai cochon, mais les caractères distinctifs sont en grand nombre entre ces deux animaux; on en trouve dans la forme de la tête, du museau, des yeux, des oreilles, du cou; il y a aussi des grandes différences dans les dents & dans les pieds; la plus grande est par rapport à la queue, car le cabiai n'en a point; cette partie manque aussi au pecari, à l'agouti, au cochon d'inde, &c. ce dernier me paroît jusqu'à présent avoir plus de rapport au cabiai que tout autre animal.

La tête du cabiai est longue, ses côtés sont aplatis, le museau a beaucoup plus d'épaisseur que de largeur; la lèvre du dessous est moins avancée que le nez, celle du dessus a une échancrure au-dessous du nez & laisse les dents incisives supérieures à

découvert, quoique la bouche soit fermée; l'ouverture de la bouche est fort petite. Cet animal a le nez rond & de couleur cendrée noirâtre, les ouvertures des narines éloignées l'une de l'autre & presque rondes, les yeux noirs & beaucoup plus grands que ceux du cochon, les cartilages des paupières noirs, les oreilles courtes, droites, nues, échanerées à l'extrémité & de même couleur que le nez, le cou gros & très-court, le corps étoffé, la croupe ravalée, les jambes courtes, principalement à l'endroit du métacarpe; le pied de derrière portoit sur la terre le plus souvent jusqu'au jarret, c'est-à-dire, jusqu'au talon. Le poignet & les pieds étoient presque entièrement nus & de couleur cendrée noirâtre; il y avoit quatre doigts aux pieds de devant, le second doigt étoit le plus gros & le plus avancé, le premier & le troisième étoient moins gros & placés un peu en arrière, le quatrième étoit le plus petit & le plus reculé; les pieds de derrière n'avoient que trois doigts, ils étoient à proportion plus grands que ceux des pieds de devant, le doigt du milieu étoit le plus grand de tous, ceux des côtés étoient moins avancés, les ongles étoient plats & noirâtres. Il se trouvoit entre les doigts une petite nageoire formée par un prolongement de la peau, semblable à celui qui est entre les doigts des coqs, des poules, &c. il n'y avoit qu'un petit tubercule à l'endroit de la queue.



Le poil étoit rare & de même qualité que les soies du cochon, mais plus fin; celui du dessus de la tête & du corps & de la face externe des jambes étoit noir sur la plus grande partie de sa longueur depuis son origine; il y avoit au-dessus du noir une couleur fauve, & il étoit noir à la pointe; le poil du tour des yeux, du dessous de la tête & celui du corps & de la face interne des jambes n'avoit qu'une couleur fauve; les plus longues soies étoient sur le dos & avoient environ deux pouces & demi de longueur, les crins des moustaches étoient noirs & en partie détruits.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	2.	8.	8.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	8.	8.	8.
Circonférence du bout du museau..	9.	9.	9.
Circonférence du museau prise au-dessous des yeux.....	1.	1.	1.
Contour de l'ouverture de la bouche.	3.	3.	3.
Distance entre les deux naseaux...	1.	1.	1.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	4.	4.	4.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	1.	1.	1.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	10.	10.	10.
Ouverture de l'œil.....	5.	5.	5.

	pieds.	pouc.	lignes
Distance entre les angles antérieurs des yeux.....	#	2.	10.
Circonférence de la tête entre les yeux & les oreilles.....	1.	2.	8.
Longueur des oreilles.....	#	1.	7.
Longueur de la base, mesurée sur la courbure extérieure.....	#	2.	1.
Distance entre les deux oreilles, prise dans le bas.....	#	1.	9.
Longueur du cou.....	#	1.	9.
Circonférence du genou.....	1.	2.	3.
Circonférence du corps prise derrière les jambes de devant.....	1.	10.	#
La même circonférence à l'endroit le plus gros.....	2.	5.	#
La même circonférence devant les jambes de derrière.....	1.	11.	#
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	#	5.	6.
Circonférence du poignet.....	#	3.	11.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.....	#	3.	9.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	#	7.	8.
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	#	6.	11.
Largeur des pieds.....	#	2.	2.
Longueur des plus grands ongles...	#	4	11.
Largeur à la base.....	#	#	8.

Ce cabiai pesoit quarante-six livres & demie ; à l'ouverture de l'abdomen il s'est trouvé beaucoup de graisse ; l'épiploon étoit très-court & placé avec l'estomac sur les intestins grêles ; le foie s'étendoit autant à gauche qu'à droite ; l'estomac étoit en entier du côté gauche avec le duodenum.

Le jejunum faisoit ses circonvolutions dans l'hypocondre droit, & dans une partie de la région épigastrique ; les circonvolutions de l'ileum étoient aussi dans la région épigastrique & dans l'hypocondre gauche ; cet intestin aboutissoit au cœcum dans le côté gauche. Le cœcum étoit dirigé transversalement de gauche à droite, & si volumineux, qu'il occupoit la partie moyenne & la partie postérieure de l'abdomen presque en entier ; le colon faisoit quelques circonvolutions concentriques & un grand arc qui s'étendoit de gauche à droite sous l'estomac, & se prolongeoit en arrière le long du côté droit jusque dans la région iliaque, avant de se joindre au rectum qui étoit fort court.

L'estomac étoit oblong, il avoit presque autant de grosseur dans la partie droite que dans la partie gauche ; le grand cul-de-sac étoit fort ample, il n'y avoit point d'angle entre l'œsophage & le pylore, ni d'appendice au fond du grand cul-de-sac, comme dans le cochon ; les parois internes de l'œsophage étoient revêtues par une membrane plissée longitudinalement, qui se ter-

minoit comme dans le cochon d'inde, sur le bord de l'orifice supérieur de l'estomac; il y avoit près de cet orifice, sous la petite courbure, une sorte de réseau formé par des plis de la membrane veloutée. Les membranes de l'estomac étoient très-minces & très-foibles aux endroits du grand cul-de-sac & des faces de l'estomac; elles avoient plus d'épaisseur dans les autres endroits, & principalement au pylore, où elles formoient un pli très-fort.

Les intestins grêles avoient tous à peu près la même grosseur, le cœcum étoit très-grand en comparaison de la taille de l'animal, il avoit trois fortes bandes tendineuses, il étoit de figure conique, courbé en forme de crosse & arrondi par le bout, comme le cœcum du cochon d'inde, il avoit aussi de grosses boursofflures; le colon ressembloit au cœcum à son origine, sur la longueur de trois ou quatre pouces; à cette distance du cœcum, les bandes tendineuses cessoient, le colon se rétrécissoit au point de n'avoir qu'environ trois pouces de diamètre; au lieu de boursofflures, il formoit une poche en forme de cœcum, longue de deux pouces, de figure conique & arrondie à l'extrémité, ensuite le colon diminuoit peu à peu de grosseur, & n'avoit plus qu'un pouce & demi de diamètre, à un pied de distance de la poche, & il étoit encore plus mince dans quelques endroits du reste de sa longueur; le rectum

le rectum avoit moins de diamètre près de l'anus que dans ses autres parties.

Le foie étoit très-grand, il avoit quatre lobes, un dans le milieu, un à droite, & deux petits à gauche; le lobe du milieu avoit deux scissures qui le divisoient en trois parties, celle du milieu étoit la plus petite; la vésicule du fiel se trouvoit au-dessus de la scissure droite, & le ligament suspensoir au-dessus de la gauche. Le lobe gauche étoit à peu près aussi grand que celui du milieu; le foie avoit une couleur rouge-obscur au dehors & noirâtre en dedans, il pesoit une livre cinq onces.

La vésicule du fiel étoit très-grande, & avoit la forme d'un œuf peu allongé.

La rate étoit courte, très-large à son extrémité inférieure, & fort étroite à son extrémité supérieure, qui se recourboit en forme de crochet; il y avoit contre cette extrémité une sorte de petite rate de la grosseur & de la forme d'une lentille; le côté antérieur de la grande rate étoit court & concave, le côté postérieur avoit beaucoup plus de longueur, il étoit convexe & festonné: ce viscère étoit au dehors d'un rouge livide, & au dedans d'un rouge noirâtre, il pesoit une once trois gros & demi.

Le rein droit étoit un peu plus avancé que le gauche, ils avoient une forme différente de celle des reins de la plupart des animaux, car ils étoient fort allongés,

presqu'aussi larges aux deux bouts que dans le milieu, & fort minces sur le côté externe, ils n'avoient point d'enfoncement, le bassin étoit fort étroit & presque nul, on n'y voyoit point de mamelons.

Les capsules atrabilaires étoient grandes & placées au côté interne de la partie antérieure du rein; elles avoient un pouce & demi de longueur, neuf lignes de largeur & trois d'épaisseur, elles étoient de couleur jaunâtre.

Le diaphragme étoit épais & le centre nerveux avoit beaucoup d'étendue.

Il n'y avoit qu'un lobe dans le poumon gauche, le droit étoit composé de deux lobes, un grand & un petit qui se trouvoit placé près de la base du cœur comme le quatrième lobe de la plupart des autres animaux. Le grand lobe du poumon droit du cabiai ressembloit au lobe gauche, ils avoient chacun deux grandes échancrures sur le bord inférieur de leur partie antérieure; le cœur étoit placé dans le milieu de la poitrine, il avoit la pointe dirigée en arrière, il étoit court, l'endroit de la cloison interne étoit fort apparent au dehors jusque sur la pointe; je n'ai vu aucun vestige du trou oval, quoique le cabiai soit souvent dans l'eau; il ne sortoit qu'une branche de la crosse de l'aorte.

La langue étoit fort étroite dans sa partie antérieure & dans sa partie moyenne antérieure, le reste avoit beaucoup plus de largeur

& d'épaisseur, de sorte qu'il sembloit que la langue y étoit double, & qu'il y avoit une petite langue collée sur l'autre; le milieu de cette petite langue étoit lisse, on n'y voyoit point de papilles, même avec la loupe, mais on en apercevoit de très-petites sur les bords, & il y avoit près de la racine deux glandes à calice fort irrégulières, une de chaque côté, elles n'étoient apparentes que par deux fentes dirigées sur chaque glande obliquement de devant en arrière, & de dehors en dedans; la partie étroite de la langue étoit couverte de très-petites papilles couchées en arrière, excepté celles qui se trouvoient près du bord antérieur de la petite langue, & qui étoient inclinées en avant, il paroissoit que ce rebord leur avoit fait prendre cette direction.

L'épiglotte étoit petite & échancrée d'une manière peu symétrique, car l'angle que l'échancrure formoit à droite étoit plus saillant que celui qui étoit à gauche, il n'y avoit point de sillons sur le palais.

Le cerveau avoit des anfractuosités, & le cervelet des cannelures comme dans la plupart des autres animaux; le cerveau pesoit une once six gros & demi, & le cervelet trois gros.

Le cabiai qui fait le sujet de cette description étoit femelle, il avoit douze mamelles, six de chaque côté, quatre sur le ventre, & deux sur la poitrine.

On ne voyoit au dehors qu'un orifice

pour la vulve & pour l'anús ; mais au dedans de cet orifice , il s'en trouvoit quatre qui paroissoient être aussi grands les uns que les autres , celui de la vulve étoit en avant , celui de l'anús en arrière , & il y en avoit un de chaque côté ; ces deux orifices latéraux pénétoient dans des poches qui se trouvoient à côté de l'anús , elles avoient neuf lignes de longueur & cinq de diamètre ; leur orifice étoit une fente longue d'un demi-pouce ; elles avoient aussi un demi-pouce de profondeur , elles contenoient une matière jaunâtre qui répandoit une odeur très-mauvaise & très-pénétrante lorsqu'on l'approchoit d'un charbon ardent , ces poches étoient revêtues au dedans par un prolongement de la peau de l'anús qui tenoit à un corps glanduleux.

Le vagin étoit plus gros à ses deux extrémités que dans le milieu ; le gland du clitoris se trouvoit placé près du bord de la vulve , il étoit gros & il avoit la figure d'un trèfle large de six lignes , long de trois & épais de deux ; l'orifice de l'urètre se trouvoit derrière le gland du clitoris ; il y avoit autour des parois internes du vagin de grosses rides longitudinales qui commençoient au-delà de l'orifice de l'urètre , & qui s'étendoient jusqu'au milieu de la longueur du vagin , le reste étoit lisse jusqu'à l'orifice de la matrice , qui étoit entouré d'un gros bourrelet ; le corps de la matrice étoit presque nul , car les cornes tenoient au bourrelet de l'orifice



par leur base, à l'exception de leur côté interne, qui ne commençoit qu'à cinq lignes de distance de l'orifice, ainsi la matrice n'avoit que cinq lignes de profondeur; les cornes adhéroient l'une à l'autre dans la longueur d'un pouce neuf lignes, elles étoient très-longues & presque cylindriques; les trompes aboutissoient à un pavillon fort ample; elles avoient jusqu'à une ligne un tiers de diamètre dans le milieu de leur longueur, elles étoient moins grosses à leur origine, & l'orifice par lequel elles communiquoient dans les cornes de la matrice étoit fort étroit & placé à l'extrémité des trompes; les testicules avoient la forme d'un ovoïde aplati sur sa longueur.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur des intestins grêles depuis le pylore jusqu'au cœcum.....	27.	6.	11
Circonférence du duodenum dans les endroits les plus gros.....	11	3.	9.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	11	2.	3.
Circonférence du jejunum dans les endroits les plus gros.....	11	3.	9.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	11	2.	6.
Circonférence de l'ileum dans les endroits les plus gros.....	11	3.	11
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	11	2.	6.
Longueur du cœcum.....	1.	5.	11

	pieds.	pouc.	lignes
Circonférence à l'endroit le plus-gros.	1.	9.	»
Circonférence à l'endroit le plus mince.	1.	»	»
Circonférence du colon dans les endroits les plus gros.....	1.	9.	»
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	»	2.	»
Circonférence du rectum près du colon.....	»	5.	»
Circonférence du rectum près de l'anus.....	»	3.	9.
Longueur du colon & du rectum pris ensemble.....	8.	»	»
Longueur du canal intestinal en entier, non compris le cœcum...3	5.	6.	»
Grande circonférence de l'estomac..	1.	11.	»
Petite circonférence.....	1.	2.	6.
Longueur du foie.....	»	7.	»
Largeur.....	»	9.	»
Sa plus grande épaisseur.....	»	»	11.
Longueur de la vésicule du fiel....	»	2.	4.
Son plus grand diamètre.....	»	1.	10.
Longueur de la rate.....	»	4.	»
Largeur de l'extrémité supérieure..	»	»	8.
Largeur de l'extrémité inférieure...	»	1.	11.
Épaisseur de l'extrémité inférieure..	»	»	6.
Longueur des reins.....	»	3.	7.
Largeur.....	»	1.	5.

	pieds.	pouc.	lign.
Épaisseur.....	"	"	10 $\frac{1}{2}$
Longueur du centre nerveux du dia- phragme depuis la veine-cave jus- qu'à la pointe.....	"	1.	"
Largeur.....	"	3.	"
Circonférence de la base du cœur..	"	6.	9.
Hauteur depuis la pointe jusqu'à la naissance de l'artère pulmonaire..	"	2.	9.
Hauteur depuis la pointe jusqu'au sac pulmonaire. ....	"	2.	1.
Diamètre de l'aorte pris de dehors en dehors.....	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la langue.....	"	4.	4.
Longueur du cerveau.....	"	2.	5.
Largeur.....	"	2.	2.
Épaisseur.....	"	1.	"
Longueur du cervelet.....	"	"	11.
Largeur.....	"	1.	3.
Épaisseur.....	"	"	9.
Distance entre l'anus & la vulve...	"	"	3.
Diametre de la vulve.....	"	"	6.
Longueur du vagin.....	"	8.	"
Circonférence à l'endroit le plus gros.	"	3.	3.
Circonférence à l'endroit le plus mince.	"	2.	9.
Grande circonférence de la vessie...	1.	5.	"
Petite circonférence.....	1.	"	"
Longueur de l'urètre.....	"	2.	"
Circonférence. ....	"	1.	3.

	pieds.	poûc.	liges.
Longueur des cornes de la matrice.	10.		
Circonférence dans les endroits les plus gros.....	1.		
Longueur de la ligne courbe que parcourt la trompe.....	3.	6.	
Longueur des testicules.....		10.	
Largeur.....			4 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur.....			3.

Le cabiai a autant de rapport au cochon d'inde par le nombre & la figure des os & des dents que par les autres parties du corps : cependant en comparant les os de ces deux animaux , j'ai reconnu que les os propres du nez sont moins saillans en avant dans le squelette (*pl. L*) du cabiai ; l'apophyse du contour des branches de la mâchoire inférieure a moins de longueur. Au reste , il m'a paru que les os de la tête du cabiai diffèrent peu de ceux de la tête du cochon d'inde \*.

Ces deux animaux ont chacun vingt dents , il y a dans chaque mâchoire deux longues incisives & huit mâchelières , les incisives ont chacune une cannelure sur leur face antérieure , les mâchelières ont plus de cannelures dans le cabiai que dans le cochon d'inde. Ces dents sont aussi différentes par leur grandeur , car celles du cochon d'inde sont toutes à peu près de même volume ; au contraire

\* Voyez le tome XVI, page 36 , planche IV, fig. 2 & 3, & planche V.

dans le cabiai, la dernière dent de la mâchoire du dessus est plus grande elle seule que les trois premières prises ensemble. Marcgrave a rapporté que chacune des dents mâchelières du cabiai sembloit être composée de trois dents adhérentes les unes aux autres, de sorte qu'il y avoit dans chaque mâchoire l'apparence de vingt-quatre dents mâchelières; d'après cette observation de Marcgrave, je m'attendois à trouver les dents du cabiai conformées d'une manière toute particulière; mais je n'y ai rien vu d'extraordinaire que la grandeur de la dernière mâchelière du dessus qui est excessive en comparaison de la grandeur des autres dents, comme je l'ai déjà fait remarquer; il y a de très-profondes cannelures sur les côtés de ces dents, mais bien d'autres animaux ont les dents profondément cannelées, sans que l'on se méprenne sur le compte de leurs dents; cependant pour que ces cannelures pussent causer quelque méprise sur le nombre des dents du cabiai, il faudroit les regarder comme des joints qui séparent les dents; mais dans cette supposition, il n'y auroit que la première dent du dessous qui eût l'apparence de trois dents, parce que c'est la seule qui n'ait que deux cannelures sur le côté externe, & il y en a cinq sur l'interne; les autres dents ont un plus grand nombre de cannelures, la dernière du dessus en a douze sur chaque côté, suivant Marcgrave, elle pourroit donc elle seule avoir

l'apparence de treize dents réunies ; mais elle seroit bien mince, car les stries qui séparent les cannelures sont très-petites, & les cannelures sont fort étroites, elles ont beaucoup plus de largeur sur le côté externe de la première dent du dessous ; c'est sans doute cette première dent que Marcgrave a trouvée ressemblante à trois dents réunies. Les dents du cabiai sont inclinées comme celles du cochon d'inde \*.

Je n'ai vu dans l'os hyoïde du cabiai qui a servi de sujet pour cette description, qu'une base & deux cornes comme dans celui du cochon d'inde, mais l'os hyoïde du cabiai n'étoit pas encore ossifié en entier.

L'apophyse épineuse de la seconde vertèbre cervicale est plus alongée en arrière que celle du cochon d'inde, car elle s'étend jusqu'au-dessus de l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre.

Il y a treize vertèbres dorsales & treize côtes de chaque côté, sept vraies & six fausses, toutes les apophyses épineuses des vertèbres dorsales étoient inclinées en arrière, à l'exception des deux dernières qui étoient droites & plus larges que les autres. Il y avoit six os dans le sternum ; les premières côtes, une de chaque côté, s'articuloient avec la partie moyenne du premier os du sternum, l'articulation des secondes côtes étoit entre le premier & le second os, celles des troisièmes

\* Voyez le tome XVI de cet ouvrage, page 27.

côtes entre le second & le troisième os, & ainsi de suite jusqu'aux sixièmes & septièmes côtes qui s'articuloient entre le cinquième & le sixième os du sternum.

Les vertèbres lombaires sont au nombre de six ; il y a quatre fausses vertèbres dans le sacrum, & sept au-delà, dont il n'y avoit que les deux dernières qui sortissent au dehors du corps où elles formoient sous la peau un petit tubercule à l'endroit de la queue. Les trois vertèbres qui s'étendoient entre les os ischions ressembloient à celle d'une queue, les quatre dernières avoient plus de rapport à celles d'un coccix par leur forme, elles étoient inclinées à gauche, l'animal leur avoit sans doute fait prendre cette direction en s'appuyant sur la partie postérieure de son corps.

L'os de la hanche, l'omoplate, les os du bras, de l'avant-bras, de la cuisse & de la jambe, différoient peu de ces mêmes os vus dans le cochon d'inde ; cependant le péroné du cabiai n'adhéroit pas au tibia par sa partie inférieure comme le péroné du cochon d'inde.

Je n'ai vu que trois os dans le premier rang du carpe, il n'y en avoit point qui correspondît au premier os du premier rang du carpe du cochon d'inde ; le second rang étoit composé de six os, les trois premiers étoient placés comme dans le cochon d'inde, le quatrième se trouvoit en partie au-dessus du troisième, & en partie au-dessus du cinquième,

qui étoit en partie au-dessus du premier os du métacarpe, & en plus grande partie au-dessus du second; le sixième os du second rang du carpe étoit placé comme celui du cochon d'inde.

Le métacarpe est composé de quatre os, le quatrième est beaucoup plus court que les autres, le second est le plus long.

Il n'y a que trois os dans le métatarse, celui du milieu est le plus long.

Chaque doigt est terminé par un sabot qui enveloppe la dernière phalange.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur de la tête depuis le bout des mâchoires jusqu'à l'occiput...	#	7.	#
La plus grande largeur de la tête...	#	3.	7 $\frac{1}{2}$
Longueur de la mâchoire inférieure depuis son extrémité, jusqu'au bord postérieur de l'apophyse condyloïde.	#	4.	7 $\frac{1}{2}$
Largeur de la mâchoire inférieure à l'endroit des dents incisives.....	#	#	10 $\frac{1}{2}$
Largeur de la mâchoire supérieure à l'endroit des dents incisives.....	#	#	11 $\frac{1}{2}$
Distance entre les orbites & l'ou- verture des narines.....	#	2.	9.
Longueur de cette ouverture.....	#	1.	1.
Largeur.....	#	1.	#
Longueur des os propres du nez..	#	2.	5.
Largeur des orbites.....	#	1.	4.
Hauteur.....	#	1.	6 $\frac{1}{2}$



pieds, pouc. lign.

Longueur des dents incisives.....	#	1.	2.
Hauteur de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre du cou.....	#	#	6.
Largeur.....	#	1	5.
Longueur de la septième côte qui est la plus longue.....	#	5.	4.
Longueur du sternum.....	#	5.	2.
Longueur du corps des plus longues vertèbres lombaires.....	#	1.	#
Longueur des plus longues fausses vertèbres du coccix.....	#	#	9.
Largeur de la partie supérieure de l'os de la hanche.....	#	1.	4.
Hauteur de l'os, depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'au milieu du côté supérieur.....	#	4.	#
Largeur du bassin.....	#	1.	11.
Hauteur.....	#	2.	6.
Longueur de l'omoplate.....	#	5.	11.
Longueur de l'humérus.....	#	4.	11.
Longueur de l'os du coude.....	#	4.	9.
Hauteur de l'olécrane.....	#	1.	1.
Longueur de l'os du rayon.....	#	3.	6.
Longueur du fémur.....	#	5.	6.
Longueur du tibia.....	#	5.	6.
Hauteur du carpe.....	#	#	8.
Longueur du calcaneum.....	#	2.	1.

	pieds.	pouc.	lignes
Hauteur du premier os cunéiforme & du scaphoïde pris ensemble.....	//	//	4.
Longueur du second os du métacarpe, qui est le plus long.....	//	1.	9.
Longueur du quatrième, qui est le plus court.....	//	//	11.
Longueur du second os du métatarse qui est le plus long.....	//	1.	10.
Longueur du troisième, qui est le plus court. ....	//	1.	8.
Longueur de la première phalange du second doigt des pieds de devant..	//	//	8.
Longueur de la seconde.....	//	//	4.
Longueur de la troisième.....	//	//	6.
Longueur de la première phalange du second doigt des pieds de derrière..	//	//	11.
Longueur de la seconde.....	//	//	6.
Longueur de la troisième.....	//	//	9.



## LE PORC-ÉPIC \*.

**I**L ne faut pas que le nom de Porc-épineux qu'on a donné à cet animal, dans la plupart des langues de l'Europe, nous induise en erreur, & fasse imaginer

\* Porc-épic en Grec & en Latin, *Hystrix*; en Arabe, *Tzur-ban*; selon le Docteur Shaw, en Anglois, *Porcupine*; en Allemand, *Stachelschwein*; en Italien, *Porco-spinoso*; en Espagnol, *Puerco-espino*.

*Hystrix*. Gesner. *Hist. quad. fig.* pag. 563. *Nota.* Quoique Gesner dise que la figure qu'il donne du porc-épic a été faite d'après l'animal vivant, elle pêche cependant en plusieurs choses, & singulièrement par les dents. Le porc-épic n'a que deux dents incisives à chaque mâchoire, & point de dents canines; & dans la figure de Gesner, il a huit dents incisives ou canines.

*Porc-épic*. Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, partie II, page 33, fig. pl. XLI.

*Hystrix, the porcupine*. Ray. *Syn. quad.* pag. 206.

*Hystrix Orientalis cristata*. Seba, vol. I, pag. 79, fig. 1, Tab. 1. *Nota.* 1.<sup>o</sup> L'épithète *Orientalis* est ici mal appliquée, car le porc-épic se trouve en Afrique & dans tous les pays chauds de l'Europe & de l'Asie. *Nota.* 2.<sup>o</sup> La figure & la description de Seba pèchent en ce qu'elles n'indiquent que trois ongles aux pieds de derrière, tandis que cet

que le porc-épic soit en effet un cochon chargé d'épines , car il ne ressemble au cochon que par le grognement ; par tout le reste il en diffère autant qu'aucun autre animal , tant pour la figure que pour la conformation intérieure ; au lieu d'une tête alongée , surmontée de longues oreilles , armée de défenses & terminée par un boutoir ; au lieu d'un pied fourchu & garni de sabots comme le cochon , le porc-épic a comme le castor la tête courte , deux grandes dents incisives en avant de chaque mâchoire , nulles défenses ou dents canines , le museau fendu comme le lièvre , les oreilles rondes & aplaties , & les pieds armés d'ongles : au lieu d'un grand estomac avec un appendice en forme de capuchon , qui dans le cochon semble faire la nuance entre les ruminans & les autres animaux ,

animal en a cinq. M. Linnæus qui avoit adopté cette erreur dans ses premières éditions , l'a reconnue & corrigée dans les dernières.

*Hystrix capite cristato* . . . *Hystrix* , le porc-épic. Briffon. *Regn. anim.* pag. 125.

*Cristata. Hystrix palmis tetradactylis , plantis pentadactylis , capite cristato , caudâ abbreviatâ.* Linn. *Syst. nat.* edit. x , pag. 56.

le porc-épic n'a qu'un simple estomac & un grand cœcum ; les parties de la génération ne sont point apparentes au dehors comme dans le cochon mâle ; les testicules du porc-épic sont recelés au dedans & renfermés sous les aines ; la verge n'est point apparente ; & l'on peut dire que par tous ces rapports aussi-bien que par la queue courte, la longue moustache, la lèvre divisée, il approche beaucoup plus du lièvre ou du castor que du cochon. Le hérisson qui comme le porc-épic est armé de piquans, ressembleroit plus au cochon, car il a le museau long & terminé par une espèce de grouin en boutoir ; mais toutes ces ressemblances étant fort éloignées, & toutes les différences étant présentes & réelles, il n'est pas douteux que le porc-épic ne soit d'une espèce particulière & différente de celle du hérisson, du castor, du lièvre ou de tout autre animal auquel on voudroit le comparer.

Il ne faut pas non plus ajouter foi à ce que disent presque unanimement les Voyageurs & les Naturalistes, qui donnent à cet animal la faculté de lancer

ses piquans à une assez grande distance & avec assez de force pour percer & blesser profondément, ni s'imaginer avec eux que ces piquans tout séparés qu'ils sont du corps de l'animal, ont la propriété très-extraordinaire & toute particulière de pénétrer d'eux-mêmes & par leurs propres forces plus avant dans les chairs, dès que la pointe y est une fois entrée : ce dernier fait est purement imaginaire & dénué de tout fondement, de toute raison, le premier est aussi faux que le second ; mais au moins l'erreur paroît fondée sur ce que l'animal lorsqu'il est irrité ou seulement agité, redresse ses piquans, les remue ; & que comme il y a de ces piquans qui ne tiennent à la peau que par une espèce de filet ou de pédicule délié, ils tombent aisément. Nous avons vu des porcs-épics vivans, & jamais nous ne les avons vus, quoique violemment excités, darder leurs piquans : on ne peut donc trop s'étonner que les auteurs les plus graves, tant anciens \*

\* *Arist. Hist. anim. lib. IX, cap. XXXIX. — Plin. Hist. nat. lib. VIII, cap. LIII. — Opius, de venatione.*

que modernes<sup>a</sup>, que les Voyageurs les plus sentés<sup>b</sup> soient tous d'accord sur un fait aussi faux : quelques-uns d'entre eux disent avoir eux-mêmes été blessés de cette espèce de jaculation, d'autres assurent qu'elle se fait avec tant de roideur, que le dard ou piquant peut percer une

<sup>a</sup> M.<sup>rs</sup> les Anatomistes de l'Académie des Sciences. Ceux des piquans, disent-ils, qui étoient les plus forts & les plus courts étoient aisés à arracher de la peau, n'y étant pas attachés fermement comme les autres, aussi sont-ee ceux que ces animaux (les Porcs-épics) ont accoutumé de lancer contre les chasseurs, en secouant leur peau comme font les chiens lorsqu'ils sortent de l'eau. Claudien dit élégamment que le porc-épic est lui-même l'arc, le carquois & la flèche dont il se sert contre les chasseurs. *Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, tome III, page 114.* *NOTA.* La fable est le domaine des Poètes, & il n'y a point de reproches à faire à Claudien : mais les Anatomistes de l'Académie ont eu tort d'adopter cette fable, apparemment pour citer Claudien ; car on voit par leur propre exposé, que le porc-épic ne lance point ses piquans, & que seulement ils tombent lorsque l'animal se secoue. — *Wormius. Mus. Wormian. pag. 235.* — *Wotton, pag. 56.* — *Aldrov. de quadr. Digit. pag. 473,* & plusieurs autres Auteurs célèbres ont adopté cette erreur.

<sup>b</sup> Tavernier, tome II, pages 20 & 21. — Kolbe, tome III, page 46. — Barbot. *Histoire générale des Voyages, tom. IV, pag. 237.*

planche <sup>a</sup> à quelques pas de distance. Le merveilleux, qui n'est que le faux qui fait plaisir à croire, augmente & croît à mesure qu'il passe par un plus grand nombre de têtes; la vérité perd au contraire en faisant la même route; & malgré la négation positive que je viens de graver au bas de ces deux faits, je suis persuadé qu'on écrira encore mille fois après moi, comme on l'a fait mille fois auparavant, que le porc-épic darde ses piquans, & que ces piquans séparés de l'animal, entrent d'eux-mêmes dans les corps où leur pointe est engagée <sup>b</sup>.

<sup>a</sup> Lorsque le porc-épic est en furie, il s'élance avec une extrême vitesse, ayant ses piquans dressés, qui sont quelquefois de la longueur de deux empan, sur les hommes & sur les bêtes, & il les darde avec tant de force, qu'ils pourroient percer une planche. *Voyage en Guinée par Bosman. Utrecht, 1705, page 253.*

<sup>b</sup> *Nota. 1.* Il faut cependant excepter du nombre de ces voyageurs crédules, le docteur Shaw. « De » tous les porc-épics, dit-il, que j'ai vus en grand » nombre en Afrique, je n'en ai rencontré aucun » qui, quelque chose que l'on fît pour l'irriter, » dardât aucune de ses pointes; leur manière ordi- » naire de se défendre, est de se pencher d'un côté; » & lorsque l'ennemi s'est approché d'assez près, de se relever fort vite & de le piquer de l'autre. »



Le porc-épic , quoiqu'originairé des climats les plus chauds de l'Afrique & des Indes , peut vivre & se multiplier dans des pays moins chauds , tels que la Perse , l'Espagne & l'Italie. Agricola dit que l'espèce n'a été transportée en Europe que dans ces derniers siècles ; elle se trouve en Espagne , & plus communément en Italie , sur-tout dans les montagnes de l'Appennin , aux environs de Rome ; c'est de-là que

*Voyage de Shaw , traduit de l'Anglois , tome I , page 323. NOTA. 2.º* Le P. Vincent-Marie ne dit point du tout que le porc-épic lance des piquans , il assure seulement que quand il rencontre des serpens , avec lesquels il est toujours en guerre , il se met en boule , cachant ses pieds & sa tête , & se roule sur eux avec ses piquans jusqu'à leur ôter la vie sans courir risque d'être blessé. Il ajoute un fait que nous croyons très-vrai , c'est qu'il se forme dans l'estomac du porc-épic des bézoards de différentes sortes , les uns ne sont que des amas de racines enveloppées d'une croûte , les autres plus petits paroissent être pétris de petites pailles & de poudre de pierre ; & les plus petits de tous , qui ne sont pas plus gros qu'une noix , paroissent pétrifiés en entier ; ces derniers sont les plus estimés. Nous ne doutons pas de ces faits , ayant trouvé nous-mêmes un bézoard de la première sorte , c'est-à-dire , une égagropile dans l'estomac du porc-épic , qui nous a été envoyé d'Italie.

M. Mauduit, qui par son goût pour l'Histoire naturelle, a bien voulu se charger de quelques-unes de nos commissions, nous a envoyé celui qui a servi à M. Daubenton pour sa description. Nous avons cru devoir donner la figure de ce porc-épic d'Italie (*pl. LI*), aussi-bien que celle du porc-épic des Indes (*pl. LII*); les petites différences qu'on peut remarquer entre les deux, sont de légères variétés dépendantes du climat, ou peut-être même ne sont que des différences purement individuelles.

Pline & tous les Naturalistes ont dit, d'après Aristote, que le porc-épic, comme l'ours, se cachoit pendant l'hiver, & mettoit bas au bout de trente jours, nous n'avons pu vérifier ces faits; & il est singulier qu'en Italie, où cet animal est commun, & où de tout temps il y a eu de bons Physiciens & d'excellens Observateurs, il ne se soit trouvé personne qui en ait écrit l'histoire. Aldrovande n'a fait sur cet article, comme sur beaucoup d'autres, que copier Gesner; & M.<sup>rs</sup> de l'Académie des Sciences qui ont décrit & disséqué huit de ces animaux,

ne disent presque rien de ce qui a rapport à leurs habitudes naturelles : nous savons seulement par le témoignage des Voyageurs & des gens qui en ont élevé dans des ménageries, que dans l'état de domesticité, le porc-épic n'est ni féroce ni farouche, qu'il n'est que jaloux de sa liberté; qu'à l'aide de ses dents de devant, qui sont fortes & tranchantes comme celles du castor, il coupe le bois & perce aisément la porte de sa loge \*. On sait aussi qu'on le nourrit aisément avec de la mie de pain, du fromage & des fruits; que dans l'état de liberté, il vit de racines & de graines sauvages; que quand il peut entrer dans un jardin, il y fait un grand dégât & mange les légumes avec avidité; qu'il devient gras comme la plupart des autres

\* Nous avons en Guinée des porc-épics. Ils croissent jusqu'à la hauteur de deux pieds ou de deux pieds & demi, & ils ont les dents si fortes & si affilées, qu'aucun bois ne peut leur résister; j'en mis une fois un dans un tonneau, m'imaginant qu'il seroit bien gardé, mais dans l'espace d'une nuit il le rongea si bien, qu'il le perça & en sortit, il le perça même dans le milieu, où les douves sont les plus courbées en dehors. *Voyage de Bolinan, page 253.*

animaux , vers la fin de l'été ; & que sa chair , quoiqu'un peu fade , n'est pas mauvaise à manger.

En considérant la forme , la substance & l'organisation des piquans du porc-épic , on reconnoît aisément que ce sont de vrais tuyaux de plumes auxquels il ne manque que les barbes pour être de vraies plumes ; par ce rapport , il fait la nuance entre les quadrupèdes & les oiseaux ; ces piquans , sur-tout ceux qui sont voisins de la queue , sonnent les uns contre les autres lorsque l'animal marche ; il peut les redresser par la contraction du muscle peucier , & les relever à peu près comme le paon ou le coq d'inde relèvent les plumes de leur queue ; ce muscle de la peau a donc la même force , & est à peu près conformé de la même façon dans le porc-épic & dans certains oiseaux. Nous saisissons ces rapports , quoiqu'assez fugitifs ; c'est toujours fixer un point dans la Nature qui nous fuit & qui semble se jouer par la bizarrerie de ses productions , de ceux qui veulent la connoître.



## DESCRIPTION

# DESCRIPTION

## DU PORC-ÉPIC.

**L**E Porc-épic (*pl. LI*) a beaucoup de rapport au Hérisson, parce que ces deux animaux sont couverts de piquans; mais ils diffèrent beaucoup l'un de l'autre pour la forme de plusieurs parties du corps, & même pour les piquans.

La tête du porc-épic est longue & aplatie sur les côtés; le museau est gros, il a beaucoup plus d'épaisseur que de largeur, il ressemble au museau du lièvre \*, en ce que la lèvre supérieure est fendue presque jusqu'aux narines, dont les ouvertures sont oblongues & parallèles à l'ouverture de la bouche; les yeux sont petits & les oreilles larges & courtes, elles ressemblent en quelque manière à celles des singes par leur contour, parce qu'elles sont appliquées contre la tête, & qu'elles ont des cavités & des éminences. Les dents incisives ressemblent à celles des rats, des écureuils, du castor, &c. celles du dessous percent la lèvre inférieure qui les enveloppe comme un fourreau; le cou est gros, le corps renflé & la queue courte & de figure conique; il y a cinq doigts bien formés aux pieds de derrière, & seulement quatre aux pieds de

\* Voyez le *Tome XIII* de cet Ouvrage, page 26.

devant , avec un tubercule revêtu d'un ongle à l'endroit du pouce , les ongles sont presque cylindriques & un peu courbes.

Les plus grands piquans du porc-épic sont sur la partie postérieure du dos , ils avoient jusqu'à neuf pouces de longueur sur l'individu qui a servi de sujet pour cette description , mais peut-être en avoit-il perdu de plus grands , car il avoit été tué aux environs de Rome au milieu de l'été , & peut-être aussi lui avoit-on arraché les piquans les plus saillans ; ceux qui restoient sur la partie postérieure du dos n'étoient pas tous de même grandeur ni de même grosseur , les plus petits n'avoient que quatre pouces de longueur , le diamètre varioit depuis deux jusqu'à trois lignes. Tous ces piquans étoient pointus aux deux bouts & colorés de noirâtre & de blanc jaunâtre par grands anneaux qui se succédoient jusqu'à cinq fois d'un bout à l'autre des piquans ; ceux qui étoient sur la croupe , sur les cuisses & sur les flancs , ne différoient de ceux du dos qu'en ce qu'ils étoient plus petits ; il y en avoit de blancs de chaque côté de l'origine de la queue ; parmi les gros piquans du dos il s'en trouvoit d'autres moins gros & beaucoup plus longs ; mais la queue étoit hérissée de tuyaux que l'on ne peut pas nommer des piquans , car ils semblent avoir été coupés transversalement par le bout , ils sont creux , ils sont ouverts à leur extrémité , ils n'ont qu'environ deux lignes de

diamètre & près d'un pouce & demi de longueur ; ils tiennent à un pédicule très-délié & long de trois quarts de pouce , qui s'implante dans la peau , ces tuyaux sont placés tout le long de la queue à des distances les unes des autres , ils sont colorés de brun & de blanc jaunâtre , leurs parois sont très-minces & sonores , car ils font un bruit semblable à un cliquetis , en heurtant les uns contre les autres , lorsque l'animal agite sa queue.

Le derrière de la tête , le cou , la partie antérieure du dos , les épaules , la poitrine , le ventre & les quatre jambes étoient couverts de petits piquans de couleur brune-noirâtre , de différentes longueurs , pointus ou terminés par un filament très-flexible ; il y avoit des piquans déliés sur le sommet de la tête , ils avoient plus d'un pied de longueur , ils étoient en partie bruns & en partie blancs ; le bout du museau & les pieds étoient couverts de petites soies brunes & roides ; les moustaches étoient composées de soies noires & luisantes qui avoient plus d'un demi-pied de longueur. Entre les piquans , il se trouvoit de longues soies brunes ou jaunâtres ; l'animal redressoit les longues soies de sa tête en forme de panache , il élevoit & abaissoit à son gré les piquans de son corps ; & lorsqu'il étoit irrité , il frappoit des pieds de derrière contre terre ; & en agitant sa queue , il faisoit sonner les piquans dont elle étoit revêtue.

Longueur du corps entier , mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	1.	11.	6.
Longueur de la tête , depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	II	5.	6.
Circonférence du bout du museau...	II	6.	9.
Circonférence du museau prise au-dessous des yeux.....	II	9.	10.
Contour de l'ouverture de la bouche..	II	2.	6.
Distance entre les deux naseaux.....	II	II	5.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	II	3.	1.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	II	1.	5.
Longueur de l'œil d'un angle à l'autre.	II	II	6.
Ouverture de l'œil.....	II	II	3.
Distance entre les angles antérieurs des yeux en suivant la courbure du chanfrein.....	II	3.	3.
La même distance en ligne droite...	II	2.	3.
Circonférence de la tête entre les yeux & les oreilles.....	II	10.	6.
Longueur des oreilles.....	II	II	7.
Largeur de la base , mesurée sur la courbure extérieure.....	II	2.	4.
Distance entre les deux oreilles , prise dans le bas.....	II	1.	9.
Longueur du cou.....	II	1.	6.
Circonférence du cou.....	II	8.	6.



Circonférence du corps, prise derrière les jambes de devant.....	1.	5.	11
La même circonférence à l'endroit le plus gros.....	1.	9.	11
La même circonférence devant les jambes de derrière.....	1.	6.	11
Longueur du tronçon de la queue..	11	3.	11
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon.....	11	6.	9 1/2
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet.....	11	4.	11
Circonférence du poignet.....	11	3.	6 1/2
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles.....	11	2.	6 1/2
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon.....	11	5.	4 1/2
Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles.....	11	3.	10 1/2
Largeur du pied de devant.....	11	1.	6.
Largeur du pied de derrière.....	11	1.	4.
Longueur des plus grands ongles...	11	11	8.
Largeur à la base.....	11	11	2 1/2.

Ce porc-épic ( *pl. LI* ) nous a été envoyé de Rome dans de l'eau-de-vie ; mais cette liqueur ayant coulé par les joints du baril durant le transport, cet animal s'étoit corrompu au point qu'il a été impossible d'en faire une dissection suivie.

Le duodenum s'étendoit jusqu'au milieu

du côté droit, où il se reploioit avant de se joindre au jejunum, dont les circonvolutions étoient dans la région ombilicale & dans le côté droit; celles de l'ileum étoient dans le côté gauche dans la région ombilicale, dans l'iliaque gauche, dans l'hipogastrique, & enfin dans l'iliaque droite, où l'ileum se joignoit au cœcum, qui étoit situé transversalement dans l'hipogastre & dans la région iliaque gauche; le colon s'étendoit dans l'ombilicale, ensuite dans l'iliaque gauche, & il revenoit dans la région ombilicale avant de se joindre au rectum.

Les intestins grêles avoient dix-sept pieds de longueur depuis le pylore jusqu'au cœcum, qui étoit long de dix pouces, & fort gros à son origine; le colon & le rectum pris ensemble avoient cinq pieds huit pouces; ainsi la longueur du canal intestinal en entier, non compris le cœcum, étoit de vingt-deux pieds huit pouces, le rein droit étoit plus avancé que le gauche d'un quart de sa longueur.

L'estomac étoit percé, je n'y ai vu aucune apparence des rétrécissemens ni des poches dont M. Perrault a fait mention dans la description de ses porc-épics\*; j'ai trouvé dans l'estomac du nôtre une petite égagropile sans croûte; elle est composée de poils très-fins, très-souples & pelotonnés comme du feutre.

Il y avoit sur la partie antérieure de la

\* Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des animaux, *partie II, page 40.*

langue des papilles courtes, larges & découpées par les bords; les plus grandes avoient une ligne de largeur; il me paroît que ces papilles correspondoient aux corps durs en forme de dents qui étoient sur la langue du porc-épic, décrit par M. Perrault<sup>b</sup>; mais les papilles de notre porc-épic n'étoient pas dures, elles étoient parsemées sur la partie antérieure de la langue, & non pas rangées par files sur les côtés, comme sur la figure donnée par M. Perrault.

L'orifice du prépuce se trouvoit à un pouce quatre lignes de distance de l'anus; la verge & le gland étoient dirigés en arrière, le gland avoit un pouce & demi de longueur, il étoit cylindrique & terminé par une sorte de champignon, il renfermoit un os.

La tête du squelette (*pl. LIII*) du porc-épic est longue & étroite, cependant les os propres du nez sont très-larges, les orbites des yeux ont peu d'étendue, l'occiput a une arête transversale fort saillante; l'apophyse coronôide des branches de la mâchoire inférieure est très-petite, il y a une autre apophyse plus grande sur le contour de chaque branche, au-dessous de l'apophyse condyloïde.

Les dents ne sont qu'au nombre de vingt, chaque mâchoire en a deux longues incisives semblables à celles du castor, & de chaque côté quatre mâchelières qui sont

\* *Idem*, page 37.

presque cylindriques , la plupart ont un sillon longitudinal sur leur côté externe , l'émail rentre au dedans de la dent à l'endroit de ce sillon ; on voit sur la table des dents ce pli de l'émail & plusieurs autres , de sorte que l'on y distingue la substance osseuse & l'émail qui forment différentes sinuosités.

L'apophyse épineuse de la seconde vertèbre cervicale est très-longue & un peu recourbée en arrière.

Il y a quatorze vertèbres dorsales & quatorze côtes de chaque côté , huit vraies & six fausses. Le sternum est composé de six os ; les premières côtes , une de chaque côté , s'articulent avec la partie moyenne antérieure du premier os du sternum , l'articulation des secondes côtes est entre le premier & le second os , celle des troisièmes côtes entre le second & le troisième os , & ainsi de suite , jusqu'aux sixièmes , septièmes & huitièmes côtes qui s'articulent entre le cinquième & le sixième os du sternum.

Les vertèbres lombaires sont au nombre de cinq , l'apophyse transverse du côté gauche de la première de ces vertèbres est beaucoup plus longue que la droite & pointue , elle ressemble en quelque façon à une fausse côte.

Il y a quatre fausses vertèbres dans le sacrum & dix dans la queue ; celles-ci ont de longues apophyses en haut , en bas & sur les côtés.

La partie antérieure de l'os de la hanche

est large & terminée en bas par une pointe recourbée en arrière, les trous ovalaires sont très-grands.

Le côté antérieur de l'omoplate est très-convexe en dehors, & forme un quatrième angle qui donne à la partie moyenne & supérieure de l'omoplate une figure approchant d'un carré long, l'épine est très-élevée & terminée par une apophyse longue & large.

L'os du bras a au-devant de sa partie moyenne une arête saillante & tranchante; à l'endroit de cette arête & au-dessus, l'os a beaucoup plus d'épaisseur que de largeur.

Je n'ai vu que trois os dans le premier rang du carpe, il y en a quatre dans le second rang; le premier os du premier rang étoit au-dessous de l'os du coude & au-dessus des trois premiers os du second rang.

Le tarse est composé de huit os, dont sept sont placés comme dans la plupart des autres animaux, le huitième se trouve au côté interne du tarse, sur le joint qui sépare l'astragale & le scaphoïde, le second os cunéiforme est très-petit.

Le premier os du métacarpe est très-court en comparaison des quatre autres, les deux phalanges du pouce sont aussi beaucoup plus courtes que les phalanges des doigts.

Le premier os du métatarse & les phalanges du pouce des pieds de derrière sont aussi beaucoup plus petits & plus courts que

les autres os du métatarse & que les phalanges des autres doigts.

	pieds.	pouc.	lignes
Longueur de la tête depuis le bout des os du nez jusqu'à l'occiput. . .	"	4.	9 $\frac{1}{4}$ .
La plus grande largeur de la tête. . .	"	2.	5 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de la mâchoire inférieure jusqu'au bord postérieur de l'apophyse condyloïde. . . . .	"	3.	"
Largeur de la mâchoire inférieure à l'endroit des dents incisives. . . . .	"	"	8.
Largeur de la mâchoire supérieure à l'endroit des dents incisives. . . . .	"	"	9.
Distance entre les orbites & l'ouverture des narines. . . . .	"	1.	11.
Longueur de cette ouverture. . . . .	"	1.	"
Largeur. . . . .	"	"	10.
Longueur des os propres du nez. . .	"	2.	5.
Largeur. . . . .	"	"	8.
Longueur des plus longues dents incisives au dehors de l'os. . . . .	"	1.	3.
Hauteur de l'apophyse épineuse de la seconde vertèbre du cou. . . . .	"	"	9 $\frac{1}{2}$ .
Largeur. . . . .	"	"	5 $\frac{1}{4}$ .
Longueur de la huitième côte qui est la plus longue. . . . .	"	4.	4.
Longueur du sternum. . . . .	"	5.	2.
Longueur du corps de la cinquième vertèbre lombaire, qui est la plus longue. . . . .	"	"	8 $\frac{1}{2}$ .

pieds. pouc. ligne

Longueur de l'os sacrum.....	"	2. 11.
Largeur de la partie antérieure....	"	1. 10.
Largeur de la partie postérieure....	"	1. 3.
Longueur de la première fausse vertèbre de la queue, qui est la plus longue.....	" "	6 $\frac{1}{2}$ .
Largeur de la partie antérieure de l'os de la hanche.....	"	1. 7.
Hauteur de l'os depuis le milieu de la cavité cotyloïde jusqu'à l'extrémité antérieure.....	"	2. 10.
Longueur des trous ovalaires.....	"	1. 4.
Largeur.....	" "	10.
Largeur du bassin.....	"	1. 10.
Hauteur.....	"	2. 3.
Longueur de l'omoplate.....	"	3. 6.
Largeur à l'endroit le plus large....	"	1. 6 $\frac{1}{2}$ .
Longueur des clavicules.....	"	1. 2.
Longueur de l'humérus.....	"	3. 2.
Longueur de l'os du coude.....	"	3. 3.
Hauteur de l'olécrane.....	" "	9 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de l'os du rayon.....	"	2. 4.
Longueur de l'os de la cuisse.....	"	3. 9 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du tibia.....	"	3. 3.
Longueur du péroné.....	" "	3.
Hauteur du carpe.....	" "	4.
Longueur du calcaneum,.....	" "	11 $\frac{1}{2}$ .

K vj

	pieds.	pouc.	lign.
Hauteur du troisieme os cunéiforme & du scaphoïde pris ensemble. . .	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du premier os du méta- carpe qui est le plus court. . . . .	"	"	3.
Longueur du troisieme os qui est le plus long. . . . .	"	"	10 $\frac{1}{2}$ .
Longueur du premier os du méta- tarso qui est le plus court. . . . .	"	"	3.
Longueur du quatrieme os qui est le plus long. . . . .	"	"	11.
Longueur de la première phalange du doigt du milieu des pieds de devant. "	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la seconde phalange. . .	"	"	3.
Longueur de la troisieme. . . . .	"	"	5.
Longueur de la première phalange du pouce. . . . .	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la seconde. . . . .	"	"	1 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la première phalange du quatrieme doigt des pieds de derrière. "	"	"	4 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la seconde phalange. . .	"	"	2 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la troisieme. . . . .	"	"	3 $\frac{1}{2}$ .
Longueur de la première phalange du pouce. . . . .	"	"	5.
Longueur de la seconde phalange. . .	"	"	3.





## LE COENDOU\*.

DANS chaque article que nous avons à traiter , il se présente toujours plus d'erreurs à détruire que de vérités à exposer : cela vient de ce que l'histoire des animaux n'a , dans ces derniers temps , été traitée que par des gens à

\* *Coendou* , nom de cet animal à la Guiane , & que nous avons adopté. *Cuandu* ( qui se doit prononcer *Couandou* ) au Bresil & dans quelques autres parties de l'Amérique méridionale , *Hoitztlacuatzin* ou *Hoitzlaquatzin* par les Indiens du Mexique & de la nouvelle Espagne ; *Ourico-cacheiro* par les Portugais qui habitent en Amérique.

*Coendou*. Mission du P. d'Abbeville au Maragnon. Paris , 1614 , feuillet 249 , verso.

*Hoitztlacuatzin* , seu *Tlacuatzin* , *Spinoso Hystrice novæ Hispaniæ*. Hernand. *Hist. Mex.* fig. pag. 322.

*Hoitzlaquatzin*. Nieremberg , fig. pag. 154. *Nota*. La figure dans Nieremberg est la même que dans Hernandès , & la description a été copiée comme la figure.

*Cuandu Brasiliensibus*. Marcgrav. *Hist. nat. Bras.* fig. pag. 233.

*Cuandu*. Pison. *Hist. Bras.* fig. pag. 99. *Nota*. La figure de cet animal dans Pison est la même que dans Marcgrave.

préjugés , à méthodes , & qui prénoient la liste de leurs petits systêmes pour les registres de la Nature. Il n'existe en Amérique aucun des animaux du climat chaud de l'ancien continent , & réciproquement il ne se trouve sous la zone brûlante de l'Afrique & de l'Asie aucun de ceux de l'Amérique méridionale. Le porc-épic est , comme nous l'avons dit , originaire des pays chauds de l'ancien monde ; & ne l'ayant pas trouvé dans le nouveau , on n'a pas laissé de donner son nom aux animaux qui ont paru lui ressembler , & particulièrement à celui dont il est ici question. D'autre côté , l'on a transporté le Coendou d'Amérique aux Indes orientales ; & Pison qui vraisemblablement ne connoissoit point le porc-épic , a fait graver dans Bontius \* qui ne parle que des animaux du midi de l'Asie , le coendou d'Amérique , sous le

*Hystrix Americanus* , *Cuandu Brasiliensibus*. Marcgrav. *Tlaquatzin spinosum*. Hernandès , Ray , *synops. quad.* pag. 208.

*Chat épineux*. Voyage de Desmarchais , tome III, page 303.

\* Jac. Bontii. *Hist. India Orient.* pag. 54.

nom & la description du vrai porc-épic ; en sorte qu'à la première vue , on seroit tenté de croire que cet animal existe également en Amérique & en Asie ; cependant il est aisé de reconnoître avec un peu d'attention , que Pison qui n'est ici , comme presque par - tout ailleurs , que le plagiaire de Marcgrave , a non-seulement copié sa figure du coendou , pour l'insérer dans son histoire du Bresil , mais qu'il a cru devoir la copier encore pour la transporter dans l'ouvrage de Bontius , dont il a été le rédacteur & l'éditeur ; ainsi quoiqu'on trouve dans Bontius la figure du coendou , l'on ne doit pas en conclure qu'il existe à Java ou dans les autres parties de l'Asie méridionale , ni prendre cette figure pour celle du porc-épic , auquel en effet le coendou ne ressemble que parce qu'il a comme lui des piquans.

C'est à Ximénès , & ensuite à Hernandès , auxquels on doit la première connoissance de cet animal , ils l'ont indiqué sous le nom de *Hoitztlacuatzin* que lui donnoient les Mexicains : le *Tlacuatzin* est le Sarigue , & *Hoitztlacuatzin*

doit se traduire par Sarigue - épineux. Ce nom avoit été mal appliqué, car ces animaux se ressembtent assez peu; aussi Marcgrave n'a point adopté cette dénomination Mexicaine, & il a donné cet animal sous son nom Brasilien, *Cuandu*, qui doit se prononcer *Couandou*; la seule chose qu'on puisse reprocher à Marcgrave, c'est de n'avoir pas reconnu que son cuandu du Bresil étoit le même animal que l'hoitztlacuatzin du Mexique, d'autant que sa description & sa figure s'accordent assez avec celles de Hernandès, & que de Laët qui a été l'éditeur & le commentateur de l'ouvrage de Marcgrave, dit expressément<sup>a</sup> que le tlacuatzin épineux de Ximénès & le cuandu, ne sont vraisemblablement que le même animal. Il paroît en rassemblant le peu de notices éparfes que nous ont données les Voyageurs sur ces animaux, qu'il y en a deux variétés que les Naturalistes ont, d'après Pison<sup>b</sup>, insérées dans leurs listes comme

<sup>a</sup> *Videtur esse idem animal aut saltem simile quod Fr. Ximenès describit sub nomine Tlaquatzin spinosi. De Laët, annotatio in cap. IX, lib. VI, Marcgr. p. 233.*

<sup>b</sup> *Cuandu major, Pison. Hist. Bras. pag. 324, fig.*

deux espèces différentes, le grand \* & le petit cuandu; mais ce qui prouve d'abord l'erreur ou la négligence de Pison, c'est que quoiqu'il donne ces coendous dans deux articles séparés & éloignés l'un de l'autre, & qu'il paroisse les regarder comme étant de deux espèces différentes, il les représente cependant tous deux par la même figure, ainsi nous nous croyons bien fondés à prononcer que ces deux n'en font qu'un. Il y a aussi des Naturalistes qui non-seulement ont fait deux espèces du grand & du petit coendou, mais en ont encore séparé l'hoitztlacuatzin en les donnant tous trois pour des ani-

pag. 325. — *Cuandu seu Cuandu minor*. Pison. *Id.* pag. 99, fig. *ibid.*

\* *Hystrix longius caudatus, brevioribus aculeis*. Barrère. *Hist. nat. de la Fr. équinox.* Porc-épic, page 153. . . . *Hystrix minor*. Leucopheus, Gouandou, *id. ibid.*

*Hystrix caudâ longissimâ tenui, medietate extremâ aculeorum experte. Hystrix Americanus major*. Le grand Porc-épic d'Amérique. Brissl. *Regn. anim.* p. 130. . . . *Hystrix caudâ longissimâ, tenui medietate extremâ aculeorum experte. Hystrix Americanus*. Le porc-épic d'Amérique *Id.* page 129. . . . *Hystrix aculeis apparentibus, caudâ brevi & crassâ. Hystrix novæ Hispaniæ*. Le Porc-épic de la nouvelle Espagne. *Id.* p. 127.

maux différens , & j'avoue que quoiqu'il soit très-vraisemblable que le coendou & l'hoitztlacuatzin sont le même animal, cette identité n'est pas aussi certaine que celle du grand & du petit coendou.

Quoi qu'il en soit, le coendou n'est point le porc-épic ; il est de beaucoup plus petit ; il a la tête à proportion moins longue & le museau plus court, il n'a point de panache sur la tête, ni de fente à la lèvre supérieure ; ses piquans sont trois ou quatre-fois plus courts & beaucoup plus menüs ; il a une longue queue, & celle du porc-épic est très-courte ; il est carnassier plutôt que frugivore, & cherche à surprendre les oiseaux, les petits animaux, les volailles<sup>a</sup>, au lieu que le porc-épic ne se nourrit que de légumes, de racines & de fruits. Il dort pendant le jour comme le hérisson, & court pendant la nuit ; il monte sur les arbres<sup>b</sup> & se retient aux branches avec

<sup>a</sup> Ce fait assuré par Marcgrave & Pison n'est pas certain, car Hernandès dit au contraire que l'hoitztlacuatzin se nourrit de fruit.

<sup>b</sup> *Scandit arbores sed rardo gressu quia pollice caret ; descendens autem caudam circumvolvit ne labatur, admodum enim metuit lapsum, nec salire potest.* Marcgr.

sa queue , ce que le porc-épic ne fait ni ne pourroit faire ; sa chair\* , disent tous les Voyageurs , est très-bonne à manger ; on peut l'apprivoiser ; il demeure ordinairement dans les lieux élevés , & on le trouve dans toute l'étendue de l'Amérique , depuis le Bresil & la Guiane jusqu'à la Louisiane & aux parties méridionales du Canada ; au lieu que le porc-épic ne se trouve que dans les pays chauds de l'ancien continent

En transportant le nom du porc-épic au coendou , on lui a supposé & transmis

*Hist. nat. Bras.* pag. 233. — Nous vîmes un Porc-épic sur un petit arbre que nous coupâmes pour avoir le plaisir de voir tomber cet animal. . . . Il est fort gras & on en mange la chair. *Voyage de la Hontan*, tome 1, page 82.

\* *Carnem habet bonam & pergratam ; nam assatam sæpe comedi , & ab incolis valde æstimatur.* *Marcgr.* pag. 233. — Il est bon à manger , on le met au feu pour le faire griller comme un cochon ; mais auparavant les femmes Sauvages en arrachent tous les poils de dessus le dos ( c'est-à-dire , tous les piquans ) qui sont les plus grands , & elles font de beaux ouvrages. . . . Étant brûlé , bien rôti , lavé & mis à la broche , il vaut un cochon de lait ; il est très-bon bouilli , mais moins bon que rôti. *Description de l'Amérique par Denis.* Paris , 1672, tome II, page 324.

les mêmes facultés, celle sur-tout de lancer les piquans; & il est étonnant que les Naturalistes & les Voyageurs s'accordent sur ce fait, & que Pison qui devoit être moins superstitieux qu'un autre, puisqu'il étoit Médecin, dise gravement que les piquans du coendou entrent d'eux-mêmes & par leur propre force dans la chair, & percent le corps jusqu'aux viscères les plus intimes. Ray est le seul qui ait nié ces faits, quoiqu'ils paroissent évidemment absurdes: Mais que de choses absurdes ont été niées par des gens sensés, & qui cependant sont tous les jours affirmées par d'autres gens qui se croient encore plus sensés!





## DESCRIPTION DU COENDOU.

**L**E Coendou (*pl. LIV*) diffère du Porc-épic, en ce qu'il a le museau plus court, en ce que sa lèvre supérieure n'est pas fendue, que ses narines sont rondes, & principalement en ce qu'il a une longue queue couverte de piquans. Le coendou qui a servi de sujet pour cette description, étoit plus petit que le porc-épic, car il n'avoit que seize ou dix-sept pouces de long depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, dont la longueur étoit de neuf pouces; le bout du museau, les jambes & les pieds avoient des poils roides comme du crin; ils étoient bruns, excepté quelques-uns de ceux des jambes qui avoient une couleur jaunâtre; la peau du ventre & de la poitrine avoit été déchirée; tout le reste du corps étoit couvert de piquans, entremêlés de longs poils, les piquans les plus longs n'avoient que deux pouces & demi, les plus gros se trouvoient sur la partie postérieure du dos, sur la croupe & sur le dessus de la queue; ils avoient environ une ligne de diamètre, ils étoient pointus aux deux bouts & de couleur blanche jaunâtre dans la plus grande partie de leur longueur, la pointe avoit une couleur noirâtre qui se mêloit avec le jaunâtre par des

teintes de brun & de rouffâtre ; les autres piquans ne différoient de ceux-ci qu'en ce qu'ils étoient plus petits & plus serrés les uns contre les autres , de sorte que l'on ne voyoit que leur pointe noirâtre , excepté sur la tête & sur le dessus du cou , où le jaunâtre des piquans étoit fort apparent : cet animal étoit non-seulement hérissé de piquans , mais encore de longues soies qui sortoient d'entre les piquans & qui étoient en assez grand nombre pour les cacher sur le dos , sur les côtés du corps , sur les côtés & sur le dessous de la tête ; elles étoient plus rares sur le cou & sur la tête , les plus longues de ces soies avoient quatre ou cinq pouces , elles étoient en partie brunes ou noirâtres , & en partie jaunâtres ; celles des côtés de la queue étoient en entier de cette couleur ; les moustaches avoient moins de longueur que celles du porc-épic ; leurs crins étoient plus déliés & noirs ; il y avoit cinq doigts aux pieds de derrière , & seulement quatre à ceux de devant , avec un tubercule à l'endroit du pouce ; les ongles étoient grands , crochus , très-pointus & de couleur noire & jaunâtre , ceux des pieds de derrière avoient plus de longueur que ceux des pieds de devant.



## L'URSON\*.

CET animal n'a jamais été nommé : placé par la Nature dans les terres désertes du nord de l'Amérique, il existoit indépendant, éloigné de l'homme, & ne lui appartenoit pas même par le nom, qui est le premier signe de son empire. Hudson ayant découvert la terre où il se trouve, nous lui donnerons un nom qui rappelle celui de son premier maître, & qui indique en même temps sa nature poignante & hérissée ; d'ailleurs il étoit nécessaire de le nommer pour ne le pas confondre avec le Porc-épic ou le

\* *The Porcupine from Hudson's Bay.* Edwards. *Hist. of Birds*, fig. pag. 52.

Le Porc-épic de la baie de Hudson. *Voyage à la baie de Hudson*, par Ellis. Paris, 1749, tome 1, page 56, fig. page 58.

*Hystrix aculeis sub pilis occultis, caudâ brevi & crassâ.... Hystrix Hudsonis.* Le porc-épic de la baie de Hudson. Briss. *Reg. anim.* pag. 128.

*Dorsata. Hystrix palinis tetradactylis, plantis pentadactylis caudâ elongatâ, dorso solo spinoso.* Linn. *Syst. nat.* edit. x, pag. 57.

Coendou , auxquels il ressemble par quelques caractères , mais dont cependant il diffère assez à tous autres égards , pour qu'on doive le regarder comme une espèce particulière & appartenante au climat du nord , comme les autres appartiennent à celui du midi.

M.<sup>rs</sup> Edwards , Ellis & Catesby ont tous trois parlé de cet animal : les figures données par ces deux premiers auteurs s'accordent avec la nôtre ( *pl. LV* ), & nous ne doutons pas que ce ne soit le même animal ; nous sommes même très-portés à croire que celui dont Seba donne la figure <sup>a</sup> & la description sous le nom de *Porc-épic singulier des Indes orientales* , & qu'ensuite M.<sup>rs</sup> Klein <sup>b</sup> , Briffon <sup>c</sup> & Linnæus <sup>d</sup> ont chacun indiqué

<sup>a</sup> *Porcus aculeatus sylvestris sive Hystrix orientalis singularis*. Seba, vol. 1, pag. 84, Tab. 52, fig. 1.

<sup>b</sup> *Acanthion caudâ prolongâ acutis pilis horridâ, in exitu quasi panniculatâ*. Klein, de quad. pag. 67.

<sup>c</sup> *Hystrix caudâ longissimâ aculeis undique obsitâ in extremo panniculata*. *Hystrix orientalis*. Le Porc-épic des Indes. Briff. Reg. anim. pag. 131.

<sup>d</sup> *Macroua*. *Hystrix pedibus pentadactylis, caudâ elongatâ, aculeis clavatis*. Linn. syst. nar. edit. x, pag. 57.

dans leurs listes par des caractères tirés de Seba, pourroit être le même animal que celui dont il est ici question : ce ne seroit pas, comme on l'a vu, l'unique & première fois que Seba auroit donné pour Orientaux des animaux d'Amérique; cependant nous ne pouvons pas l'assurer pour celui-ci comme nous l'avons fait pour plusieurs autres animaux; tout ce que nous pouvons dire, c'est que les ressemblances nous paroissent grandes, & les différences assez légères, & que comme l'on a peu vu de ces animaux, il se pourroit que ces mêmes différences ne fussent que des variétés d'individu à individu, ou même du mâle à la femelle.

L'Urson auroit pu s'appeler le *Castor épineux*, il est du même pays, de la même grandeur & à peu près de la même forme de corps; il a, comme lui, à l'extrémité de chaque mâchoire, deux dents incisives, longues, fortes & tranchantes : indépendamment de ses piquans qui sont assez courts & presque cachés dans le poil, l'urson a, comme le castor, une double fourrure, la première de poils longs & doux, & la seconde d'un

duvet ou feutre encore plus doux & plus mollet. Dans les jeunes, les piquans sont à proportion plus grands, plus apparens & les poils plus courts & plus rares que dans les adultes ou les vieux.

Cet animal fuit l'eau & craint de se mouiller, il se retire & fait sa bauge sous les racines des arbres creux\* ; il dort beaucoup & se nourrit principalement d'écorce de genièvre ; en hiver, la neige lui sert de boisson ; en été, il boit de l'eau & lappe comme un chien. Les Sauvages mangent sa chair, & se servent de sa fourrure après en avoir arraché les piquans qu'ils emploient au lieu d'épingles & d'éguilles.

\* Voyez la lettre de M. Alexandre Light à M. Edwards. *Hist. of Birds*, pag. 52.



# DESCRIPTION

## DE L'URSON.

**L'**URSON (*pl. LV*) diffère principalement du porc-épic, en ce qu'il a les piquans plus petits, & en grande partie cachés sous de longs poils; il a aussi le museau moins gros & plus court, les oreilles sont très-petites & entièrement recouvertes par le poil.

Les plus grands piquans de cet animal ont deux pouces & demi de longueur & une ligne de diamètre, ils sont en partie blancs ou jaunâtres, & en partie bruns ou noirâtres; ils se trouvent sur la croupe & sur la queue, & y sont apparens, tandis que ceux du reste du corps sont couverts par des poils longs, fermes & noirs qui ont jusqu'à six pouces de longueur sur les lombes; leur pointe est de couleur blanche-jaunâtre; il y a entre ces longs poils & les piquans, une sorte de duvet de couleur cendrée brune qui a quatre ou cinq pouces de longueur sur les lombes; il est fort épais & presque droit, il se trouve sur toutes les parties du corps, excepté sur les pieds; les piquans manquent aussi sur les pieds, sur les jambes, sur le ventre & sur la queue; ces parties n'ont que des poils ferrés comme des brosses, & de couleur brune-noirâtre ou noire; il y a quelques teintes de bai sous la queue.

L ij

	pieds, pouc. lignes		
Longueur depuis le bout du museau jusqu'à la queue. . . . .	2.	1.	11
Circonférence du bout du museau..	11	6.	6.
Contour de l'ouverture de la bouche.	11	3.	11
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil. . . . .	11	1.	6.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille. . . . .	11	1.	8.
Longueur de l'œil. . . . .	11	11	6.
Distance entre les yeux, en suivant la courbure du chanfrein. . . . .	11	2.	1.
La même distance en ligne droite..	11	1.	8.
Circonférence de la tête à l'endroit des oreilles. . . . .	11	10.	6.
Longueur des oreilles. . . . .	11	11	5.
Circonférence du cou. . . . .	1.	3.	11
Circonférence du corps prise derrière les jambes de devant. . . . .	2.	11	11
La même circonférence au milieu du corps. . . . .	2.	2.	6.
La même circonférence devant les jambes de derrière. . . . .	2.	3.	11
Longueur de la queue. . . . .	11	8.	11
Circonférence du tronçon de la queue à son origine. . . . .	11	8.	6.
Longueur des plus grands ongles. . . .	11	1.	3.
Largeur à la base. . . . .	11	11	2.





DESCRIPTION  
DE LA PARTIE DU CABINET  
*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*  
DU BABIROUSSA,  
DU CABIAI, DU PORC-ÉPIC,  
DU COENDOUE ET DE L'URSON.  
N.<sup>o</sup> MCCII.

*La tête offeufe d'un babirouffa.*

LA plus grande différence qui soit entre la tête décharnée (*planche XLVIII*) du Babirouffa & celles du Sanglier & des Cochons que j'ai observées, est dans la direction des défenses supérieures (*ABCD*); mais il y a aussi d'autres différences qui se trouvent dans la forme des os & dans le nombre des dents incisives & des mâchelières. Le museau (*EF*) du babirouffa est à proportion moins allongé que celui des cochons; l'ouverture (*GF*) des narines est plus courte & le nez plus large; le front (*H*) & le sommet de la tête ne diffèrent de ces mêmes parties vues dans le cochon de Siam \*, qu'en

\* Voyez le volume IX de cet ouvrage, page 178. & suivantes.

ce que le front est plus convexe ; les bords osseux (*E*) des orbites du babiroussa ne sont interrompus que dans une huitième partie (*I*) de leur circonférence , parce que l'apophyse orbitaire supérieure (*K*) de l'os de la pomette est plus longue que dans le sanglier & les cochons.

Il n'y a que trente-quatre dents , savoir , quatre incisives à la mâchoire du dessus , & six à celle du dessous , deux canines & dix machelières à chaque mâchoire ; les incisives & les machelières m'ont paru avoir beaucoup de ressemblance avec celles du sanglier & des cochons ; les défenses du babiroussa ont aussi des rapports avec celles des cochons & des sangliers , même par leur direction. Pour reconnoître ces rapports , il faut remarquer que les alvéoles de la mâchoire supérieure de presque tous les animaux sont dirigés perpendiculairement au bord de la mâchoire , ainsi leur fond est en haut & leur orifice en bas ; dans les cochons & les sangliers , les alvéoles des défenses de cette mâchoire sont dirigés obliquement , de façon que leur fond est en arrière & l'orifice en avant , & que le fond est placé un peu plus haut que l'orifice , par conséquent la racine de la défense entre dans la mâchoire obliquement de devant en arrière & de bas en haut , tandis que les racines des dents canines qui correspondent à ces défenses dans la plupart des autres animaux , sont dirigées en ligne à peu

près verticale ; cette différence est encore plus grande dans le babiroussa , car non-seulement le fond de l'alvéole est en arrière , & l'orifice en avant comme dans les cochons & dans les sangliers , mais l'orifice est placé plus haut que le fond , & par conséquent la racine de la défense entre dans la mâchoire obliquement de devant en arrière & de haut en bas ; la différence de direction qui est entre les défenses du babiroussa & celles des cochons & des sangliers , vient de ce que les défenses du babiroussa sont dirigées en haut contre la mâchoire au sortir de l'alvéole , & que les défenses des cochons & des sangliers s'écartent en dehors , de manière que l'orifice de l'alvéole reste placé plus bas que dans le babiroussa ; mais la partie supérieure des défenses des cochons & des sangliers se prolonge en haut & un peu en arrière ; & si le museau de ces animaux n'étoit pas plus long que celui du babiroussa , & si leurs défenses avoient autant de longueur que les siennes , elles approcheroient aussi près des yeux : les défenses supérieures de la tête du babiroussa qui sert de sujet pour cette description , s'étendent en haut & se courbent en arrière ; leur extrémité est recourbée en bas , & même en avant & un peu en dehors ; elles approchent des yeux à la distance d'un pouce & demi ; les défenses (*CD*) de la mâchoire inférieure sont courbées en arrière , & s'étendent obliquement en haut & un peu en

dehors , de sorte qu'elles ne touchent pas à celles du dessus : toutes ces défenses ont beaucoup de longueur ; celles du dessus sont les plus longues , elles sortent de sept pouces un quart hors de l'alvéole , elles ont un pouce huit lignes de circonférence à la base ; celles du dessous sont plus grosses , leur base a deux pouces de circonférence , mais leur longueur n'est que de trois pouces neuf lignes ; ces quatre défenses sont un peu aplaties sur les côtés , leur substance est une sorte d'ivoire qui prend un très-beau poli.

N.° M C C I I I.

*Une peau de cabiai bourrée.*

N.° M C C I V.

*Le squelette d'un cabiai.*

N.° M C C V.

*L'os hyoïde d'un cabiai.*

Les pièces rapportées sous les trois numéros précédens , ont été tirées du cabiai qui a servi de sujet pour la description de cet animal. Il nous a été donné par M. le prince de Bouillon , qui avoit bien voulu nous permettre de faire dessiner ce cabiai , tandis qu'il étoit vivant dans sa ménagerie.

N.° M C C V I.

*Une peau de porc-épic bourrée.*

.Ce porc-épic étoit de même espèce & à

peu près de même grandeur que celui qui nous a été envoyé de Rome, & qui a servi de sujet pour la description de cet animal ; il ne reste qu'un petit nombre de piquans sur le dos, où sont les plus grands ; ils tombent plus aisément que les autres, car j'ai vu un porc-épic vivant qui les avoit presque tous perdus au milieu de l'été ; tandis que les autres tenoient encore à la peau ; ils tiennent aussi à celle dont il s'agit ; on y voit des soies & des piquans de diverses grandeurs & de différentes formes, les plus remarquables sont ceux de la queue \*, on peut les faire sonner comme si l'animal étoit vivant ; les os de la tête & les dents ont été conservés avec la peau.

N.º M C C V I I.

*Plusieurs soies des moustaches d'un porc-épic.*

Les plus grandes n'ont guère plus d'un demi-pied de longueur, elles sont pointues à la racine qui est blanche ; la partie qui se trouvoit près de la peau est de même couleur & a une demi-ligne de diamètre ; elle est dure & de même nature que les piquans, mais à mesure que ces soies s'allongent, elles deviennent flexibles & plus ressemblantes à des soies qu'à des piquans.

\* Voyez la description de ces piquans, page 218 de ce volume.

## N.º M C C V I I I.

*Des soies & des piquans du porc-épic  
qui nous a été envoyé de Rome.*

Ces soies & ces piquans sont en assez grand nombre pour que l'on puisse y voir les caractères dont il a été fait mention, relativement à ces parties, dans la description du porc-épic.

## N.º M C C I X.

*Piquans de porc-épic.*

Ces piquans sont plus longs & à proportion plus menus que ceux du porc-épic qui a servi de sujet pour la description de cet animal, car ils ont plus d'un pied de longueur sur environ une ligne & demie de diamètre; il me paroît qu'ils viennent d'un porc-épic semblable à ceux qui ont été décrits par M. Perrault\*, & à celui qui est représenté (*pl. LII*) de ce volume.

## N.º M C C X.

*Une égagropile de porc-épic.*

J'ai trouvé cette égagropile dans l'estomac du porc-épic qui nous a été envoyé de Rome; elle n'a point de croûte, elle est à peu près ronde, elle a douze à quatorze lignes de diamètre, elle a au dehors & au dedans

\* Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, partie II, page 40.

une couleur grise, elle est composée de poils fort serrés & très-fins; elle pèse un gros & vingt grains.

N.° M C C X I.

*Le squelette d'un porc - épic.*

C'est le squelette qui a servi de sujet pour la description & les dimensions des os du porc-épic, il y manque trois dents molaires qui sont, la première de chaque côté de la mâchoire du dessus, & la troisième du côté gauche de la même mâchoire. Il paroît par l'état de ce squelette, que l'animal dont il a été tiré étoit adulte, ainsi il y a lieu de croire que les dents qui manquent sont tombées, il n'y a même aucun doute par rapport à la troisième dent, l'os de la mâchoire a rempli l'alvéole; mais les alvéoles des premières dents sont restés vides, & sont seulement recouverts & fermés par une lame osseuse, très-mince & convexe; après avoir enlevé cette lame, j'ai trouvé l'alvéole vide en entier; peut-être les germes de ces deux dents avoient-ils été détruits sans avoir percé leurs alvéoles.

N.° M C C X I I.

*La tête d'un porc - épic.*

Toutes les dents sont bien conservées dans cette tête, qui peut suppléer à celle du squelette rapporté sous le n.° précédent, pour les dents qui y manquent.

## N.º M C C X I I I.

*L'os hyoïde d'un porc - épic.*

Cet os est composé de sept pièces, il n'y en a que deux de chaque côté, les secondes sont très-petites, & les premières sont les plus longues de toutes; les branches de la fourchette sont fort larges & plus longues que la pièce du milieu.

## N.º M C C X I V.

*L'os de la verge d'un porc - épic.*

Cet os a un pouce de longueur, & quatre lignes de largeur par le bout le plus gros.

## N.º M C C X V.

*Un coendou desséché.*

Ce coendou a servi de sujet pour la description de cet animal; quoiqu'il soit racorné par le desséchement, on reconnoît aisément ses principaux caractères, principalement celui qui consiste dans la conformation de la lèvre supérieure; elle est entière, sans avoir aucune apparence du bec de lièvre, comme celle du porc-épic; les poils, les soies & les piquans de ce coendou sont assez bien conservés, pour que l'on puisse juger de leur différence & de la figure étrange de cet animal.













De Seve del.

P. F. Tardieu Sculp.


LE CABIAI.





Seve del

L. Legrand Scul.






De Seve inv.

LE PORC - EPIC

Baron Sculp










de Seve del.

AUTRE PORC -EPIC

Barren sculp.









*Dore del*

LE COENDOU.

*H. de V. del J. de S. sculp.*





See d

L' URSON.

Chevillet f





# LE TANREC\*

## ET LE TENDRAC\*\*.

**L**ES *Tanrecs* ou *Tenracs* (planche *LVI* & *LVII*) sont de petits animaux des Indes orientales, qui ressemblent un peu à notre Hérisson, mais qui cependant en diffèrent assez pour constituer des espèces différentes; ce qui le prouve indépendamment de l'inspection & de la comparaison, c'est qu'ils ne se mettent point en boule comme le hérisson, & que dans les mêmes endroits où se trouvent les tanrecs, comme à Madagascar, on y trouve aussi des hérissons.

\* *Tanrec* & *Tendrac*, noms de ces animaux, & que nous avons adoptés.

\*\* *Erinaceus Americanus albus*. Seba, vol. 1, pag. 78, Tab. 49, fig. 3. *Nota.* Ce Hérisson que Seba, dit lui avoir été envoyé de Surinam, ressemble si fort au Tendrac, qu'on ne peut pas douter que ce ne soit le même animal; & s'il est natif de Madagascar il ne doit pas se trouver en Amérique. Cet Auteur l'a mal indiqué à tous égards, car il n'est ni Américain ni blanc, il est seulement un peu moins brun que notre hérisson d'Europe.

de la même espèce que les nôtres , qui ne portent pas le nom de tanrec , mais qui s'appellent *Sora*<sup>a</sup>.

Il paroît qu'il y a des tanrecs de deux espèces , ou peut-être de deux races différentes ; le premier qui est à peu près grand comme notre hérisson , a le museau à proportion plus long que le second , il a aussi les oreilles plus apparentes & beaucoup moins de piquans que le second , auquel nous avons donné le nom de tendrac pour le distinguer du premier ; ce tendrac n'est que de la grandeur d'un gros rat , il a le museau & les oreilles plus courtes que le tanrec , celui-ci est couvert de piquans plus petits , mais aussi nombreux que ceux du hérisson ; le tendrac au contraire n'en a que sur la tête , le cou & le garrot , le reste de son corps est couvert d'un poil rude assez semblable aux soies du cochon.

Ces petits animaux qui ont les jambes très-courtes , ne peuvent marcher que fort lentement ; ils grognent<sup>b</sup> comme

<sup>a</sup> Voyage à Madagascar par Flaccourt , p. 152.

<sup>b</sup> Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement

les pourceaux , ils se vautrent comme eux dans la fange , ils aiment l'eau & y séjournent plus long - temps que sur terre ; on les prend dans les petits canaux d'eau salée <sup>a</sup> & dans les lagunes de la mer ; ils sont très-ardens en amour & multiplient beaucoup <sup>b</sup> ; ils se creusent des terriers , s'y retirent & s'engourdissent pendant plusieurs mois ; dans cet état de torpeur , leur poil tombe & il renaît après leur réveil ; ils sont ordinairement fort gras , & quoique leur chair soit fade , longue & mollasse , les Indiens la trouvent de leur goût , & en sont même fort friands.

de la Compagnie des Indes de Hollande, *pag.* 412.

<sup>a</sup> Relation de Fr. Cauche. *Paris*, 1651, *p.* 127.

— Voyage de la Compagnie des Indes de Hollande, *page* 412.

<sup>b</sup> Voyage à Madagascar par Flaccourt. *Paris*, 1661, in-4.<sup>o</sup> *page* 152.



## DESCRIPTION

## DU TENDRAC ET DU TANREC.

**L**E Tendrac (*pl. LVII*) ressemble au Hérifson, mais il est beaucoup plus petit, si celui qui a servi de sujet pour cette description avoit pris toute sa grandeur, car il n'étoit guère plus gros qu'une taupe; le nez ressembloit à celui du hérifson, autant que j'ai pu en juger sur un individu desséché; les yeux m'ont paru plus petits que ceux du hérifson, mais le tendrac étoit ressemblant à cet animal par le museau mince & alongé, par les oreilles courtes & arrondies, les jambes courtes, &c. il étoit couvert de piquans semblables à ceux du hérifson, les plus longs avoient sept lignes; ils étoient tous de couleur blanchâtre vers la racine & à la pointe, le reste avoit une couleur roussâtre foncée; le museau, le front, les côtés de la tête, la gorge, le dessous du cou, la poitrine, les aisselles, le ventre, les aines, les fesses & les quatre jambes étoient couverts d'un poil blanchâtre, rare, fin & dur. Il se trouvoit sur le museau quelques poils jaunâtres qui avoient jusqu'à deux pouces deux lignes; il y avoit cinq doigts à chaque pied, la queue étoit très-courte & couverte de piquans; la longueur de ce tendrac étoit de cinq pouces dix lignes depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue; il y avoit



De Sève del.

M<sup>re</sup> Rousselet f<sup>me</sup> Tardieu sculp.

LE TANREC.






del

LE TENDRAC.


Herisot file Jculp.





onze lignes de distance entre le bout du museau & l'œil, & trois lignes entre l'œil & l'oreille.

Le Tanrec (*pl. LVI*) étoit plus grand que le Tendrac ; il avoit le museau à proportion plus long, les oreilles moins courtes ; je ne lui ai point trouvé de queue, il étoit desséché & bourré ; il n'avoit de vrais piquans que sur le front, sur les tempes, sur le sommet & le derrière de la tête, sur le dessus & les côtés du cou, sur les épaules & sur le garrot ; ils étoient jaunâtres vers la racine & à la pointe, le reste étoit noir ; les plus longs avoient plus d'un pouce, & formoient une sorte de huppe au-dessus de la tête ; le dos, la croupe & les côtés du corps étoient couverts de soies qui avoient les mêmes couleurs que les piquans ; les plus longues étoient sur le dos & avoient plus d'un pouce ; il se trouvoit parmi ces soies des poils jaunâtres, & d'autres plus gros & noirs, dont quelques-uns avoient au moins deux pouces de longueur. Le museau, la gorge, le dessous du cou, la poitrine, le ventre & les jambes étoient couverts de poils durs, fins & de couleur jaunâtre & même roussâtre sur les pieds ; il y avoit sur le museau quelques longs poils de cette couleur. La longueur de ce tanrec étoit de sept pouces neuf lignes depuis le bout du museau jusqu'à la partie postérieure du corps ; il y avoit un pouce & demi de distance entre le bout du museau & l'œil, & un demi-pouce entre l'œil & l'oreille.



## S U I T E

DE LA DESCRIPTION  
DU CARACAL.

**I**L y a dans le dix-neuvième volume de cet ouvrage <sup>a</sup> une description incomplète du Caracal, faite en été sur un individu (*pl. XXIV, tome XIX*) qui étoit vivant à la ménagerie de Versailles, & que l'on ne pouvoit pas approcher : cet animal étant mort l'hiver suivant, je l'ai disséqué & décrit en entier. Je l'ai trouvé déformé par une maigreur extrême, & en partie épilé ; le poil qui restoit n'avoit pas exactement les mêmes couleurs qui avoient paru lorsque l'animal étoit à la ménagerie, dans une loge obscure.

En comparant le caracal au chat, comme je lui ai comparé le Lynx <sup>b</sup>, j'ai reconnu que le caracal a la tête plus longue que celle du chat, le chanfrein plus concave, le front plus élevé & les oreilles plus pointues. Quant aux couleurs du poil, celle du bout du museau, du tour des yeux, des coins de la bouche & du front n'étoit que blanchâtre teinte de jaunâtre ; la couleur brune des épaules & du dessous du cou & du dos étoit mêlée de

<sup>a</sup> Page 266.

<sup>b</sup> Voyez le tome XIX de cet ouvrage, page 80.

fauve, parce que chaque poil avoit une couleur fauve sur la plus grande partie de sa longueur, & étoit brun à la pointe; il se trouvoit beaucoup de poils gris sur tout le corps; les taches brunes noirâtres de la poitrine n'étoient formées que par de la crasse collée sur le poil; la couleur fauve des côtés du corps étant vue de près, s'est trouvée mêlée d'une teinte de couleur isabelle qui ne paroissoit qu'au grand jour; le poil du corps avoit environ un pouce trois lignes de longueur, les pinceaux des oreilles deux pouces, & les crins des moustaches deux pouces & demi, ils étoient presque tous blancs; il y avoit cinq doigts aux pieds de devant, & seulement quatre à ceux de derrière.

pieds. pouc. lign.

Longueur du corps entier, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus.....	2.	2.	6.
Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput.....	"	5.	3.
Circonférence du bout du museau..	"	5.	3.
Circonférence du museau prise au-dessous des yeux.....	"	7.	9.
Contour de l'ouverture de la bouche.	"	4.	4.
Distance entre les deux naseaux...	"	"	4.
Distance entre le bout du museau & l'angle antérieur de l'œil.....	"	1.	8.
Distance entre l'angle postérieur & l'oreille.....	"	2.	6.

Longueur de l'œil d'un angle à l'autre. # #	11.	
Ouverture de l'œil..... # #	7.	
Distance entre les angles antérieurs des yeux..... #	1.	5.
Circonférence de la tête entre les yeux & les oreilles..... #	10.	4.
Longueur des oreilles..... #	3.	6.
Largeur de la base mesurée sur la courbure extérieure..... #	3.	5.
Distance entre les deux oreilles prise dans le bas..... #	2.	#
Longueur du cou..... #	3.	#
Circonférence du cou..... #	7.	#
Circonférence du corps prise derrière les jambes de devant..... #	11.	6.
La même circonférence à l'endroit le plus gros.....	1.	3. #
La même circonférence devant les jambes de derrière..... #	11.	6.
Longueur du tronçon de la queue.. #	10.	6.
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon..... #	2.	4.
Longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au poignet..... #	6.	9.
Circonférence du poignet..... #	3.	2.
Longueur depuis le poignet jusqu'au bout des ongles..... #	4.	4.
Longueur de la jambe depuis le genou jusqu'au talon..... #	7.	8.

pieds. pouc. lign.

Longueur depuis le talon jusqu'au bout			
des ongles.....	#	7.	2.
Largeur du pied de devant.....	#	1.	7.
Largeur du pied de derrière.....	#	1.	5.
Longueur des plus grands ongles...	#	#	11.
Largeur à la base.....	#	#	2.

Ce caracal étoit mâle, il ne pesoit que douze livres onze onces à cause de son extrême maigreur ; l'épiploon étoit très-mince, s'étendoit jusqu'au pubis & remontoit en avant sous les intestins, comme celui du lynx ; l'estomac étoit à gauche & le foie à droite presque en entier.

Le duodenum alloit jusqu'au milieu du côté droit où il se replioit en avant ; le jejunum faisoit ses circonvolutions dans la région ombilicale, dans les côtés & dans la région hippogastrique ; les circonvolutions de l'ileum étoient dans les mêmes régions & en grande partie dans l'iliaque droite ; ensuite cet intestin s'étendoit en avant dans le côté droit où il se joignoit au cœcum qui étoit dirigé de devant en arrière. Le colon formoit un arc qui s'étendoit de droite à gauche derrière l'estomac, & qui se prolongeoit dans le côté droit, avant de se joindre au rectum.

L'estomac & le pancréas ressembloient à l'estomac & au pancréas du lynx ; le velouté de l'estomac étoit fort apparent ; le cœcum avoit plus d'étendue que celui du lynx, & la

pointe étoit recourbée du côté de l'ileum , les membranes de l'estomac & des intestins étoient fort épaissies.

Le foie avoit six lobes , les deux plus grands se trouvoient placés , l'un dans le milieu , & l'autre à gauche ; celui du milieu étoit divisé en trois parties par deux scissures ; le ligament suspensoir passoit dans la scissure gauche , & la vésicule du fiel étoit dans la scissure droite ; il y avoit trois lobes à droite , l'inférieur étoit plus grand que les deux autres. Le foie avoit au dehors une couleur rougeâtre pâle , & au dedans une couleur brun rougeâtre , il pesoit dix onces six gros ; la vésicule du fiel étoit grande , oblongue & presque cylindrique.

La rate étoit beaucoup plus large à son extrémité inférieure , qu'à l'extrémité supérieure ; elle avoit au dehors & au dedans une couleur rougeâtre assez vive , elle pesoit trois gros & demi.

Le rein droit étoit un peu plus avancé que le gauche , ils n'avoient presque point d'enfoncement ; le bassinet étoit assez grand , mais on n'y voyoit point de mamelons distincts ; les capsules atrabilaires étoient grandes , oblongues & de couleur jaunâtre.

Le centre nerveux du diaphragme étoit peu étendu ; il y avoit dans le poumon droit quatre lobes , dont trois étoient rangés comme dans la plupart des autres quadrupèdes : le quatrième avoit plus de volume que le second , & à peu près autant que le premier. Le poumon

gauche n'étoit composé que de deux lobes ; le cœur avoit la pointe grosse , arrondie & un peu tournée à gauche , il ne sortoit que deux branches de la crosse de l'aorte.

La langue du caracal ressembloit à celle du lynx en tout , excepté les glandes à calice qui n'étoient qu'au nombre de quatre , trois à droite & une à gauche ; les trois du côté droit se trouvoient rangées sur une file dirigée obliquement de devant en arrière , & de dehors en dedans ; la glande du côté gauche étoit placée vis-à-vis la glande postérieure du côté droit. L'épiglotte étoit plus alongée & plus pointue que celle du lynx ; le palais étoit traversé par six ou sept sillons à peu près semblables à ceux du palais du lynx.

Le cervelet étoit placé comme celui du lynx , il pesoit deux gros & cinquante grains , & le cerveau une once quatre gros & douze grains.

Il y avoit huit mamelons , quatre de chaque côté , deux sur la poitrine , & deux sur le ventre ; les deux premiers du ventre étoient sur le milieu de l'abdomen , les deux autres se trouvoient près des cartilages des fausses côtes ; les deux premiers de la poitrine étoient peu éloignés des mêmes cartilages , les derniers mamelons se trouvoient placés près des aisselles.

Le gland de la verge étoit petit & de figure conique comme celui du chat ; mais on n'y voyoit point de papilles , on y apercevoit seulement quelques inégalités avec la loupe ; il

n'y avoit point de vésicules féminales ; les testicules étoient fort petits & ronds , leur substance intérieure étoit de couleur jaunâtre , la vessie avoit une forme ovoïde.

	pieds. pouc. lign.		
Longueur des intestins grêles depuis le pylore jusqu'au cœcum.....	5.	9.	■
Circonférence du duodenum dans les endroits les plus gros.....	■	2.	6.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	■	2.	■
Circonférence du jejunum dans les endroits les plus gros.....	■	2.	■
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	■	1.	9.
Circonférence de l'iléum dans les en- droits les plus gros.....	■	3.	■
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	■	2.	3.
Longueur du cœcum.....	■	1.	5.
Circonférence à l'endroit le plus gros. ■	2.	6.	
Circonférence à l'endroit le plus mince. ■	1.	■	
Circonférence du colon dans les endroits les plus gros.....	■	3.	7.
Circonférence dans les endroits les plus minces.....	■	3.	■
Circonférence du rectum près du colon.....	■	3.	7.
Circonférence du rectum près de l'anus.....	■	3.	8.
			Longueur



Longueur du colon & du rectum pris ensemble.....	II.	8.	II
Longueur du canal intestinal en entier, non compris le cœcum..	7.	5.	II
Grande circonférence de l'estomac..	I.	6.	II
Petite circonférence.....	II	II.	6.
Longueur du foie.....	II	6.	3.
Largeur.....	II	6.	4.
Sa plus grande épaisseur.....	II	II	10.
Longueur de la vésicule du fiel....	II	2.	6.
Son plus grand diamètre.....	II	II	II.
Longueur de la rate.....	II	4.	II.
Largeur de l'extrémité inférieure...	II	I.	I.
Largeur de l'extrémité supérieure...	II	II	8.
Épaisseur dans le milieu.....	II	II	2 $\frac{1}{4}$ .
Longueur des reins.....	II	I.	II.
Largeur.....	II	I.	4.
Épaisseur.....	II	II	II.
Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave jusqu'à la pointe...	II	I.	II
Largeur.....	II	I.	4.
Circonférence de la base du cœur.	II	4.	9.
Hauteur depuis la pointe jusqu'à la naissance de l'artère pulmonaire.	II	2.	2.
Hauteur depuis la pointe jusqu'au sac pulmonaire.....	II	I.	6.
Diamètre de l'aorte, pris de dehors en dehors.....	II	II	5.

	pieds.	pouc.	lign.
Longueur de la langue.....	II	2.	9.
Longueur du cerveau.....	II	2.	4.
Largeur.....	II	1.	10.
Épaisseur.....	II	1.	II
Longueur du cervelet.....	II	1.	II
Largeur.....	II	1.	5.
Épaisseur.....	II	II	8.
Longueur du gland.....	II	II	5.
Circonférence.....	II	II	6.
Longueur de la verge depuis la bifur-			
cation des corps caverneux jusqu'à			
l'insertion du prépuce.....	II	1.	4.
Circonférence.....	II	II	10.
Longueur des testicules.....	II	II	5.
Largeur.....	II	II	4 $\frac{1}{2}$ .
Épaisseur.....	II	II	3.
Longueur des canaux déférens.....	II	8.	II
Diamètre dans la plus grande partie			
de leur étendue.....	II	II	II $\frac{1}{2}$ .
Grande circonférence de la vessie..	II	9.	3.
Petite circonférence.....	II	7.	6.
Longueur de l'urètre.....	II	4.	9.
Longueur des prostates.....	II	II	5 $\frac{1}{2}$ .
Largeur.....	II	II	2 $\frac{1}{2}$ .

Quoique le caracal ait beaucoup de rapport avec le chat, cependant sa tête décharnée est plus large, relativement à sa longueur, que

celle du chat ; au contraire le museau a un peu plus de longueur relativement à sa largeur. Le caracal a le front plus convexe que celui du chat , & plus élevé par sa partie antérieure , les os propres du nez sont moins avancés vers le bout du museau , & par conséquent l'ouverture des narines a plus de longueur à proportion que dans le chat. Il y a sur l'occiput & le sommet de la tête des arêtes osseuses plus fortes & plus saillantes. Au reste , il se trouve peu de différences entre ces deux animaux pour le nombre , la figure & la position des os de la tête.

Le caracal n'a que trente dents comme le chat , le cougar , la panthère & le lion , & ces dents ressemblient à tous égards à celles du chat.

Tous les autres os du squelette du chat ressemblent aussi aux os qui leur correspondent dans le squelette du caracal ; cette ressemblance se soutient jusque dans le nombre des fausses vertèbres de la queue.

\* Voyez la description du squelette du chat , *tom. XI.*



---

DESCRIPTION  
DE LA PARTIE DU CABINET  
*qui a rapport à l'Histoire Naturelle*  
DU TANREC, DU TENDRAC  
ET DU CARACAL.

N.º MCCXVI.

*Le Tanrec.*

N.º MCCXVII.

*Le Tendirac.*

**L**E Tendirac & le Tanrec rapportés sous les numéros précédens, sont les individus qui ont servi de sujets pour la description de ces deux espèces d'animaux ; quoique ces individus soient desséchés, on y voit la figure de l'animal, parce qu'on a laissé sous la peau les os de la tête, des jambes & des pieds. On aperçoit aussi la plupart des dents, mais je ne les ai pas vues assez distinctement pour les décrire ; d'ailleurs je ne sais pas si les individus dont il s'agit avoient atteint l'âge où toutes les dents sont formées, je ferai seulement observer qu'à quelques égards elles m'ont paru différentes de celles de nos hérissons. Ce tanrec

& ce tendrac ont été apportés de Madagascar par M. Poivre, négociant à Lyon.

N.º M C C X V I I I.

*Le squelette d'un Caracal.*

C'est le squelette qui a servi de sujet pour la description & les dimensions des os du caracal ; l'angle postérieur du côté gauche de la gouttière formée par la réunion des os pubis & des ischions , est un peu incliné en bas , cette difformité semble avoir été causée par une fracture de l'os ischion. Il y a une grosse exostose qui enveloppe la partie moyenne supérieure du fémur droit , on voit aussi des marques de carie sur le côté droit de la mâchoire supérieure au-devant de l'orbite & à l'extrémité de la mâchoire inférieure à l'endroit des deux incisives du milieu & de la seconde du côté droit qui manquent dans le squelette dont il s'agit. Les exostoses & les caries arrivent souvent aux animaux que l'on renferme dans des ménageries ; la privation du grand air & le défaut d'exercice leur causent encore plusieurs autres maladies , & il y a beaucoup de ces animaux qui en meurent.

N.º M C C X I X.

*L'os hyoïde d'un Caracal.*

N.º M C C X X.

*L'os de la verge d'un Caracal.*

L'os hyoïde & l'os de la verge du caracal ressemblent à ceux du chat ; l'os de la verge du caracal est long de trois lignes & demie.

*Fin du vingt-cinquième volume.*















